




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/2

A XVII a
1400^(?)

Althun 20 d. 11 p. 11 m. 11 d. 11
L. 11 d. 11 p. 11 m. 11 d. 11
11 d. 11 p. 11 m. 11 d. 11

11 d. 11 p. 11 m. 11 d. 11
11 d. 11 p. 11 m. 11 d. 11

42 a 9312

ov

km

lv

5


W
Bordeaux
1891 Mar 07

unde superbi homo cuius co
p'tio culpa

nasci parva labor vita neque mor

post hominem venia post hominem
factor et horror

hic in non hominem creditur
ois hoo



AVRELII
COR. CELSI
DE RE MEDI-
CA LIBRI
OCTO.

*

ITEM

Q. SERENI Liber de Medicina.

Q. RHEMNII Fannii Palæmonis
de Ponderibus & Mensuris Liber.

*Omnia ex diuersorum codicum diligen-
tissima collatione castigata.*

Leban

Remoyne



LVGDVNI,
Apud Ioan. Tornæsum, & Gu-
lielmu Gazeium.

1549.

COR. CELSI

DE RE MEDICA

LIB. I.


DE RE MEDICA

LIB. II.

DE RE MEDICA

LIB. III.

LIB. IV.



APOLLINIS

LIBRARIUS

1742

LECTORI.

NVIDIT profecto Fortuna populo Romano integrā, absolutamq; felicitatē. Nam cum bellicis artibus, & reipublice administrandæ peritia, ea ciuitas omnibus omnino præstiterit nationibus, quæ vel antecesserūt, vel sequutæ sunt Romanum imperium: deerat illi certè nihil ad cumulum virtutum omnium, nisi vt doctrinis, atq; literis excoleret: quarū iamdiu tamen gloriam ingeniosissima, ac disertissima Græcia cum scribendo, tum dicendo occupasse videbatur. Verum etsi serò Eloquentiam, Philosophiamq; attigerit: tantos tamē in vtraq; progressus fecit, vt multos Roma habuerit nobilissimos homines postremis temporibus, non solum Philosophiæ deditos, sed in ea iam excellentes atq; perfectos. Eloquentia verò tantū in ea vrbe sibi paucissimis annis uendicauit, ut eloquentissimas Athenas vel æquarit, uel paruo illis proxima interuallo fuerit: id quod probare esset aut facile, aut necessarium, si præclarissima extarent illorū monumenta, qui plurimum dicendo potuerunt, Antoniorū scilicet, & Catonum, & Crassi, & Caesarum, & Bruti, & aliorū propè innumerabilium: aut nisi vnus esset Cicero, quē omnibus aut præferre, aut comparare saltem, opponereq; valeamus. Itaq; in Astrologia, in Geometria, in Dialecticis, omnibusq; ijs artibus, quæ in veri inuestigatione versantur,

a 2 legim

legimus dignū conatibus suis pręstitisse Roma-
 na ingenia: sola autem Medicina ars, maxime
 salutaris, neglecta ab illis, inculta iacuit, ac dere-
 licta: eam enim vnam Gręcarū artium non exer-
 cuisse Romanam grauitatem, testis est Plinius:
 quinimmo idem ipse scribit, Pop. Romanū medi-
 cine auidum expertum demum damnaſſe: itaq;
 caruisse medicis ad annum sexcentimum: quod
 voluisse eos credendum est non artis odio, sed ar-
 tificum: idq; Marcus Cato ad Marcum filium
 scribens manifestissime docet. Quod si aut Hip-
 pocratē habuisset Roma, cui ciuium suorum salu-
 tem commendaret, aut Galeni interpretis monu-
 menta cognouisset: quemadmodum & in re mi-
 litari, & in rebus ceteris aut superauit omnes
 alias nationes, aut illis proxima fuit, & inter-
 dum equalis: verisimile est, in Medicina quoque
 excellentē futuram fuisse industriam suam. Hanc
 tamen partē vt ostenderet Cornelius Celsus non
 esse supra vires Romanas, eam eloquentissime et
 peritissime tractauit octo libris: in quibus non so-
 lum eius partis, quę victu, & eius quę medica-
 mentis, sed illius etiam, quę manu medetur, prę-
 cepta copiosissime dedit. A plerisq; autē dubita-
 ri video, an artē Cornelius exercuerit, alijs exi-
 stimantibus caruisse illum usu: vel quia quedam
 prodidit artem coarguentia, qualia sunt, quę de
 venarū pulsu, et vrine indicijs, ac de imparibus
 diebus, Asclepiadem sequutus, tradidit: uel quia
 in ponendis constituendisq; pręceptis longissime
 abiit.

abijt à consuetudine eorū, qui de re medica ante illum scripserunt: alijs verò credentibus, non potuisse eum tam multa, tamq; insigniter & articulatè nouisse, tamq; postremò appositè ad usum, vt interdum multus sit in describenda via, & ratione exercendi artificis actus: nisi eam aliter quàm cogitando & audiendo, & legendo didicisset. Quamuis autem eorū, qui Cornelium fuisse medicum negant, & ratio, et autoritas me parū moueat: constat enim & Asclepiadem, & Themisonē eius discipulum, & Thessalum tam sepe, tamq; vehemēter à Galeno damnatū, aberrasse à placitis & à doctrina maiorū, cum tamē omnes medicinam usu ipso professi fuerint: quamobrem mirū non est, si in tam erratica disciplina, vixq; tandem autore Galeno consistente, idq; non tam certitudine rei, quàm imbecillitate eorū, qui post Galenū fuerunt, libuit Cornelio modo ingenioq; suo potius, quàm ex aliorū consuetudine scribēti, eorum mutare præcepta, quibus superiorum delere placita, & medendo & scribendo licuerat. Quamuis, inquam, me parū illi moueant: adducor tamen, nisi fallor, certissimis ad suspicandum argumentis, idem molitū fuisse Cornelium, quod Empedoclem, & Democritum fecisse legimus: scilicet, vt eam artem non ueluti purus medicus, atq; ad quæstū omnibus expositus, sed tanquam sapiens, ceu partē Philosophiæ explicaret, eam cum studio sapientiæ coniungens. Nam cum Plinius naturalis hystorie libros digesserit, indicans qui

a 3 bus

bus autoribus, testibusq; niteretur: libro primo, quem indicis loco esse voluit, separatim autorum meminit & medicorum. neq; unquam retulit Cornelium in medicos, sed in autores: Ex autoribus, inquit, C. Valgio, Cornelio Celso, M. Varro, & c. deinde subiicit externos: post remò numerat medicos, in quibus nusquam Cornelij nomē legitur. Quòd si aut ille se medicum fuisset professus, aut alij in numerum medicorum Cornelium recepisset, Plinius illum certè non separasset in singulorum librorum indice à medicis. Constat præterea, uixisse Cornelium aut Augusti, aut Tiberij temporibus, aut C. Caesaris: cum Columella, qui Claudio potente rerum scripsit de re Rustica libros, mentionē fecerit eius, tanquam superioris: qua etate, si Plinio credimus, paucissimi Quiritum artē medicam profitebantur, delegata ea cura ac meditatione vel Græcis hominibus, vel libertis, aut seruis: quales fuerunt Sallustius, Dionysius, & Curio, & ij, quos supra nominavi: quamobrem occidenti medicum, quòd plerumq; serui essent, pœna erat ex constitutionibus non valde magna pecunia: liberi enim hominis nulla est aestimatio. Cornelium verò fuisse ingenuum Romanum satis indicant tria nomina: cum libertos constet duobus, seruos autē vno tantum nomine fuisse demonstratos. Ceterum qualis qualis ille fuerit, dignus est profectò vel doctrina vel elegantiā non solum qui legatur, sed qui semper habeatur in manibus. Quamuis autem ubiq; illum reprehendat Fabius

Quint

Quintilianus, itaq; interdum leniter, vt studio id
 eum efficere cognoscas & emulatione (scripsit
 enim vterq; Rhetoricos libros) tamē veritate ita
 cogente, eruditū virum eum appellat, lib. I X. &
 lib. sequenti: Scripsit, inquit, non parum multa
 Cornelius Celsus, Scepticos sequutus, nō sine cul-
 tu, ac nitore. Columella verò lib. I I. De re rusti-
 ca, eum fuisse tradit non solum agricolationis, sed
 vniuersę naturę prudentē. Cum autē Cornelius
 & ius ciuile, & philosophiam monumentis illu-
 strauerit, suis & rei militaris, & rustica etiam
 & medicine pręcepta reliquerit: dignus (ut ait
 idem Fabius) vel ipso proposito, vt eum scissē o-
 mnia illa credamus: quis erit qui se satis putet
 eruditum, cui ea, quę supersunt, reliquię uigilia-
 rum tam elaboratarum ignotę fuerint? Quedam
 tamen ab eo fateor esse prodita, quę vel insolē-
 tia, vel nouitate detertere lectorē possunt: quale
 illud est, quod de aqua frigida libro primo tradi-
 tur: quā infusa, putat ille sanari possē infirmitatē
 capitis, & pręterea uitari grauedines, ac destil-
 lationes: quibus intemperantia victus, et incon-
 tinētia voluptatū pręcipuē etas hęc nostra gra-
 uissimē torquetur. Caterū si balneis nunc ute-
 remur, vbi calida sordes mundarētur capitis, &
 sudor vapores iam itinere patefacto emitteret,
 itaq; quotidie quasi caput purgaretur: non esset
 fortasse usus aquę frigide tam periculosus, quā
 vulgō creditur. Neq; etiam ille simpliciter infun-
 di frigidam iubet, sed calidariū proponit, in quo
 a 4 sudet

sudetur: & calida aqua perfundi precipit, tum tepida, deinde frigida. Plin. item lib. XXVIII. capite IIII. Perfundere, inquit, caput aqua calida ante balnearum vaporacionem, et postea frigida, saluberrimum intelligitur. Quæ res profecto nisi esset valde salutaris, neque imperite eam & imprudenter tum precise laudasset Cornelius: neq; Plinius ita manifestè idem probaret: cum præsertim Senecam eo remedio semper usum fuisse legamus: cuius rei certè rationem reddere possem à re medica non abhorrentem, si aut id mihi ab initio proposuissem, cum epistolam hanc scribere institui: aut esset hoc muneris partiumq; mearum. Illud equidem animaduerti, sequutū esse Cornelium in plerisq; Hippocratem, quem lib. VII. parentem omnis medicinæ appellat: quamobrem non potest hic noster Latinus Hippocrates reprehendi, quin alteri quoq; idem vitij tribuatur. nam si dixerimus, nimis generaliter, & nulla reddita causa hunc frequenter præcepta dedisse medicinæ: cum eadē sit ratio atq; uia Hippocratis, interpretandus potius, & distinctionibus explicandus erat Cornelius, quàm improbatus, atq; reiiciendus: id quod uidemus in Hippocrate factum fuisse à Galeno, non tam, quàm isti sunt, delicato & moroso, certè tamē doctiore atq; peritiore: ita enim didicissent medici, à Cornelio de rebus ad artē suam pertinentibus proprijs, suisq; Latinis vocibus loqui: & hunc grauißimum in primis autorem loco suo, suisq; sedibus posuissent: & post

postremo planū fecissent hominibus, non abhor-
rere penitus à uero, quod à Cicerone scriptū fuit,
Omnia Latinos inuenisse melius, quā Græcos:
aut ab illis accepta fecisse meliora. Sed inuidit (ut
dixi) Fortuna cunctam Romanis hominibus se-
licitatē. Nos verò, qui aliquid nostrā cura prae-
stare posse fortasse credimur Cornelio, quòd eo
iamdiu utamur magistro scribendi, atq; uiuendi
(quamuis illi ignauia fortē nostra non aequē sty-
lum ac salutē debeamus) nonnihil temporis con-
sumpsimus in recognoscēdo hoc eruditissimo au-
tore: eumq; emendatissimū, quantum ipsi efficere
potuimus, excudendū dedimus Sebastiano Gry-
phio Typographo nobilissimo, ut tam culto, &
tam nitido scriptore uti commode possint omnes,
quibus bonae artes curae sunt: & ut Medicis,
quorum etas nostrā maximē ferax est, animum
faciamus ad Cornelium legendum, interpretan-
dum, illustrandum: ita enim futurum facile spe-
ramus, ut omnes paulatim planē Latine de me-
dicina loquentes audiamus: & aliquis apud no-
stros eam laudē consequi curet, quam apud Græ-
cos consequutus est Galenus: cuius nisi labor &
industria tantum luminis addidisset Hippocrati,
is fortē malo magno publico turpius extinctus
fuisset, quā iacet Cornelius: cuius laudi dignae
immortalitate si uitio ingenij Medici horū tem-
porum, & posteriores inuidebunt, suus tamē ni-
tor & elegantia, vel illis contrā nitentibus, eum
à tenebris & ab interitu vindicabunt.

A V R E L I I

C O R N E L I I

C E L S I

D E

M E D I C I N A

L I B E R P R I -

M V S .

*



V T ALIMENTA sanis corporibus Agricultura, sic sanitatem aegris Medicina promittit. Hec nusquam quidem non est. Siquidem etiam imperitissimæ gentes herbas, aliâq; prompta in auxilium vulnerum, morborumq; nouerunt. Veruntamen apud Græcos aliquanto magis, quàm in cæteris nationibus excolta est: ac ne apud hos quidem à prima origine, sed paucis ante nos seculis, utpote cum vetustissimus autor Aesculapius celebretur. Qui quoniam adhuc rudem & vulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in deorum numerum receptus est. Huius deinde duo filij Podalyrius & Machaon bello Troiano ducem Agamemnonem secuti, non mediocrem opem commilitonibus suis attulerunt. Quos tamen Homerus non in pestilentia, neq; in uarijs generibus morborum aliquid attulisse auxilij, sed vulneribus tantummodo ferro, & medicamentis mederi solitos

solitos esse proposuit. Ex quo apparet, has par-
 tes medicinae solas ab his esse tentatas, easq; esse
 vetustissimas. Eodemq; autore disci potest, mor-
 bos, tum ad iram deorum immortalium relatos
 esse, & ab iisdem opem posci solita. Veriq; simile
 est, inter nonnulla auxilia aduersae valetudinis,
 plerunq; tamen eam bonam contigisse ob bonos
 mores, quos neque desidia, neq; luxuria * vitia-
 rant. Siquidem haec duo, corpora prius in Grae-
 cia, deinde apud nos affligerunt. Ideoq; multi-
 plex ista medicina, neq; olim apud Graecos, ne-
 que apud alias gentes necessaria, vix aliquos
 ex bonis ad senectutis principia perducit. Ergo
 etiam post eos (de quibus retuli) nonnulli clari
 viri medicinam exercuerunt, donec maiore stu-
 dio literarum disciplina agitari coepit: quae ut
 animo praecipue omnium necessaria, sic corpori
 inimica est. Primoq; medendi scientia, sapientiae
 pars habebatur, ut & morborum curatio, &
 rerum naturae contemplatio sub iisdem autori-
 bus nata sit. Scilicet his hanc maxime requiren-
 tibus, qui corporum suorum robora * inquieta * quieta
 cogitatione, nocturnaq; vigilia minuerat. Ideoq;
 multos ex sapientiae professoribus, peritos eius
 fuisse accepimus. Clarissimos vero ex his Pytha-
 goram, & Empedoclem, & Democritum. Hu-
 ius autem (ut quidam crediderunt) discipulus
 Hippocrates Cous, primus quidem ex omnibus
 memoria dignis ab studio sapientiae disciplinam
 hanc separauit, vir & arte & facundia insti-
 gnis.

Disciplina
corpori ini-
mica.

Hippocra-
tes.

gnis. Post quem Diocles Carystius, deinde Praxagoras, & Chrysippus, tum Herophilus & Erasistratus, sic artem hanc exercuerunt, ut etiā in diuersas curandi vias processerint. Iisdemq; temporibus, in tres parteis medicina diducta est, ut vna esset quæ victu, altera quæ medicamento, tertia quæ manu mederetur. Primam διαιτητικὴν, secundam φαρμακευτικὴν, tertiā χειρουργικὴν, Græci nominauerunt. Eius autem, quæ victu morbos curat, longè clarissimi autores etiam altius quædam agitare conati, rerum quoque naturæ sibi cognitionem vendicauerunt, tanquam sine ea trunca & debilis medicina esset. post quos Serapion primus omnium, nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam professus, in usu & experimentis eam posuit. Quem Apollonius & Glaucias, & aliquanto post Heraclides Tarentinus, & aliqui non mediocres viri secuti, ex ipsa professione, se Empiricos appellauerunt. Sic in duas parteis ea quoque quæ victu curat, medicina diuisa est, alijs rationalem artem, alijs usum tantum sibi vendicantibus, nullo verò quicquam post eos, qui suprā comprehensi sunt, agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades medendi rationem ex magna parte mutauit. Ex cuius successoribus Themison nuper ipse quoque quædam in senectute deflexit. Et per os quidem maximè viros salutaris ista nobis professio increuit. Quoniam autem ex tribus medicine partibus, ut
diffic

difficilima, sic etiam clarissima est ea, quæ mor-
bis medetur, ante omnia de hac dicendum est. Et
quia prima in ea dissensio est, quod alij sibi ex-
perimentorum tantummodo notitiam necessa-
riam esse contendunt, alij nisi corporum rerumq;
ratione comperta, non satis potentem usum esse
proponunt: indicandum est, quæ maxime ex
utraq; parte dicantur, quò facilius nostra quo-
que opinio interponi possit. Igitur hi, qui ratio-
nalem medicinam profitentur, hæc necessaria
esse proponunt, Abditarum, & morbos conti-
nentium caussarum notitiam, deinde Euiden-
tium, post hæc etiam Naturalium actionum, no-
uissimè partiū Interiorum. Abditas caussas vo-
cant, in quibus requiritur, ex quibus principijs
nostra corpora sint, quid secundam, quid aduer-
sam valetudinem faciat. Neque enim credunt
posse eum scire, quomodo morbos curare conue-
niat, qui vnde hi sint, ignoret. Neque esse dubiū,
quin alia curatione opus sit, si ex quatuor prin-
cipijs, vel superans aliquid, vel deficiens aduer-
sam valetudinem creat, ut quidam ex sapien-
tiæ professoribus dixerunt, alia, si in humidis
omne vitium est, ut Herophilo visum est: alia,
si in spiritu, ut Hippocrati: alia, si sanguis in
eas venas, quæ spiritui accommodatæ sunt, transfunditur, & inflammationē, quàm Græci φλε-
γμονήν, nominant, excitat, eaq; inflammatio,
talem motum efficit, qualis in febre est, ut Era-
sistrato placuit: alia, si manantia corpuscula, per
inuisib

invisibilia foramina subsistendo, iter claudunt,
 ut Asclepiades contendit. Eum verò recte cu-
 raturus, quem prima origo causæ non fefellerit.
 Neq; verò inficiantur, experimenta quoque esse
 necessaria. Sed ne ad hæc quidē aditum fieri po-
 tuisse, nisi ab aliqua ratione contendunt. Non
 enim quidlibet antiquiores viros ægris inculcas-
 se: sed cogitasse, quid maxime conveniret, & id
 usu explorasse, quod antè coniectura aliqua du-
 * an ini- xissent. Neq; interesse, * an nunc iā pleraq; explo-
 tia plera- rata sint, si à consilio tamē cæperunt. Et id qui-
 que dem in multis ita se habere. Sæpe verò etiā noua
 incidere genera morborum, in quibus nihil ad-
 huc usus ostenderit. Et ideo necessarium sit ani-
 madvertere, unde ea cæperint: sine quo nemo
 mortalium reperire possit, cur hoc, quàm illo po-
 tius utatur. Et ob hæc quidem in obscuro positas
 causas persequuntur. Evidentes verò has appel-
 lant, in quibus quærunt initium morbi calor attu-
 lerit, an frigus: fames, an satietas: & quæ simi-
 lia sunt. Occursurum enim vitio dicunt eum, qui
 originem non ignorarit. Naturales verò corporis
 actiones appellant, per quas spiritum trahimus,
 & emittimus cibum, potionemq; et assumimus,
 & concoquimus. Itemq; per quas eadem hæc in
 omnes membrorum partes digeruntur. Tum requi-
 runt etiā, quare venæ nostræ modò submittāt se,
 modò attollant: quæ ratio somni, quæ vigiliæ sit.
 Sine quorum notitia neminem putant vel occurre-
 re, vel mederi morbis inter hæc nascētibus posse.
 Ex

Ex quibus quammaxime pertinere ad rem concoctio videtur. Huic potissimum insistent, & ducere alij Erasistrato, atteri cibum in ventre contedunt: alij Plistonico, Praxagoræ discipulo, putrescere: alij credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui. Acceduntq; Asclepiadis æmuli, qui omnia ista vana & superuacua esse proponunt. Nihil enim concoqui, sed crudam materiã (sicut assumpta est) in corpus omne diduci. Et hæc quidē inter eos parum constant. Illud verò conuenit, aliud dandum cibum laborantibus, si hoc: aliud, si illud verum est. Nam si teritur intus, eum querendum esse, qui facillimè teri possit. Si putrescit, eum in quo hoc expeditissimum est. Si calor concoquit, eum qui maxime calorem moueat. At nihil ex his esse querendum, si nihil concoquitur. Ea verò sumenda quæ maxime manent, qualia assumpta sunt. Eademq; ratione cum spiritus grauis est, cum somnus, aut vigilia vrgent, eum mederi posse arbitratur, qui prius illa ipsa qualiter eueniant perceperit. Præter hæc cum in interioribus partibus & dolores, & morborum varia genera nascantur, neminem putant his adhibere posse remedia, quæ ipse ignoret. Necessarium ergo esse incidere corpora mortuorum, corumq; viscera atque intestina scrutari: longeq; optime fecisse Herophilum, & Erasistratum, qui nocentes homines à regibus ex carcere acceptos, viuos inciderint, considerarintq; etiam spiritu remanente, ea quæ natura antè clausisset, eorumq; posita

Per lauo-
rē, & con-
tactū, aspe-
ritatem in-
telligit, &
quod illi
est cōtra-
rium.

posituram, colorem, figuram, magnitudinē, ordi-
nem, duriciem, molliciem, leuorem, contactum:
processus deinde singulorum, & recessus: & si-
ue quid inseritur alteri, siue quid partē alterius
in se recipit. Neq; enim cum dolor intus incidit,
scire quid doleat, eum, qui qua parte quodque
viscus, intestinum'ue sit, non cognouerit. Neque
curari id quod aegrum est posse, ab eo, qui quid
sit, ignoret. Et cum per vulnus alicuius viscera
patefacta sunt, eum qui sanæ cuiusquam colorem
partis ignoret, nescire quid integrum, quid cor-
ruptum sit. Ita ne succurrere quidem posse corru-
ptis, aptiusq; extrinsecus imponi remedia, com-
pertis interiorum & sedibus & figuris, cogni-
taq; eorum magnitudine: similesq; omnia, quæ
posita sunt, rationes habere. Neq; esse crudele (si-
cut pleriq; proponunt) hominum nocentium, &
horum quoq; paucorum supplicij, remedia popu-
lis innocentibus seculorum omnium quæri. Con-
trà, hi qui se Empiricos ab experientia nomi-
nant, euidentes quidem causas, vt necessarias
amplectuntur: obscurarum verò causarum, &
naturalium actionum questionem ideo supernua-
cuam esse contendunt, quoniam incomprehensi-
bilis natura sit. Non posse verò comprehendere, pa-
tere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia:
cū de ista re, neque inter sapientiæ professo-
res, neq; inter ipsos medicos conueniat. Cur enim
potius aliquis Hippocrati credat, quàm Hero-
philo? Cur huic potius, quàm Asclepiadi? Si ra-
tione.

tiones sequi velit, omnium posse videri non improbabiles: si curationes, ab omnibus his egros perductos esse ad sanitatem. Ita neque disputationi, neque auctoritati cuiusquam fidem derogari oportuisse. Etiam sapientie studiosos maximos medicos esse, si ratiocinatio hoc faceret: nunc illis verba superesse, deesse medendi scientiam. Differre quoque pro natura locorum genera medicinae, & aliud opus esse Romae, aliud in Aegypto, aliud in Gallia. Quod si morbos eadem causae facerent ubique, remedia quoque ubique eadem esse debuissent. Saepe etiam causas apparere, ut puta lippitudinis, vulneris, neque ex his patere medicinam. Quod si scientiam hanc non subiiciat evidens causa, multominus eam posse subicere, quae in dubio est. Cum igitur illa incerta, incomprehensibilisque sit, à certis potius, & exploratis petendum esse praesidium, id est his, quae experientia in ipsis curationibus docuerit, sicut in ceteris omnibus artibus. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri. Ac nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere; eò quoque disci, quod qui diversa de his senserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint. Id enim fecisse, quia non ab obscuris causis, neque à naturalibus actionibus, quae apud eos diversa erant, sed ab experimentis, prout cuique responderant, medendi vias traxerint. Ne inter initia quidem ab istis questionibus
b deduct

deductam esse medicinam, sed ab experimentis. Aegrorum enim, qui sine medicis erant, alios propter auiditatem primis diebus, protinus cibum assumpsisse, alios propter fastidium abstinuisse, leuatumque magis eorum morbum esse, qui abstinerant: itemque alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulo ante eam, alios post remissionem eius, optime deinde his cessasse, qui post finem febris id fecerint. Eademque ratione, alios inter principia protinus vsos esse cibo pleniore, alios exiguo, grauiioresque eos factos, qui se implerent. Hac, similiaque, cum quotidie inciderent, diligentes homines notasse, quae plerumque melius responderent: deinde agrotantibus ea precipere coepisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, aliorum interitu, perniciose discernentem à salutaribus. Repertis deinde iam medicinae remedijs, homines de rationibus eorum differere coepisse, nec post rationem medicinam esse inuentam, sed post inuentam medicinam, rationem esse quaesitam. Requiritur etiam, si ratio idem doceat, quod experientia, an aliud. Si idem, superuacuum esse: Si aliud, esse contrariam. Primò tamen remedia exploranda summa cura fuisse, nunc verò iam explorata esse, neque vlla aut noua genera morborum reperiri, aut nouam desiderari medicinam. Quòd si iam incidat mali generis aliquod ignotum, non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris: sed eum protinus visurum, cui morbo id proximum sit, tentatur

taturumq; remedia similia illis, quæ vicino malo sæpe succurrerint, & per eius similitudinem opem reperturum. Neque enim se dicere consilio medicum non egere, & irrationale animal hanc artem posse præstare: sed has latentium rerum coniecturas ad rem non pertinere: quia non intersit, quid morbum faciat, sed quid tollat. Neq; ad rem pertineat, quomodo, sed quid optimè digeratur. Siue hac de causa concoctio *interci- *incidat, siue de illa: &, siue concoctio sit illa, siue tantum digestio. Neque querendum esse quomodo spiremus: sed quid grauem, tardumq; spiritum expediat. Neque quid venas moueat, sed quid quæq; motus genera significant. Hæc autem cognosci experimentis, & in omnibus eiusmodi cogitationibus in vtranque partem differi posse. Itaque ingenium & facundiam vincere, morbos autem non eloquentia, sed remedijs curari. Quæ si quis elinguis, vsu *discreta bene norit, *discre- hunc aliquanto maiorem medicum futurum, quam tuus si sine vsu linguam suam excoluerit. Atque ea quidem, de quibus est dictum, superuacua esse tantummodo. Id verò quod restat, etiam crudele, vinorum hominum aluum atq; præcordia incidi, & salutis humane præsidem artē, non solum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimā inferre, cum præsertim ex his, quæ tanta violentia querantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere. Nam colorem, leuorem, mollitiē, duritiem, similiaq; omnia non esse
b 2 talia

talía inciso corpore, qualia integro fuerint : quia
cum corporibus inuiolatis, hac tamen metu, do-
lore, inedia, cruditate, lassitudine, mille alijs me-
diocribus affectibus, saepe mutetur: multo magis
verisimile est, interiora, quibus maior mollities,
lux ipsa noua sit, sub grauissimis vulneribus, &
ipsa trucidatione mutari. Neque quicquam esse
stultius, quam quale quicquam viuo homine est,
tale existimare esse moriente, imò iam mortuo.
Nam vterum quidem, qui minus ad rem perti-
neat, spirante homine posse diduci? Simul atque
verò ferrum ad praeordia accessit, & discis-
sum transversum septum est, quod membrana
quadam superiores partes ab inferioribus didu-
cit (διασπαραγναι Græci vocant) hominem proti-
nus animam amittere. Ita demum mortui praeor-
dia, & viscus omne in conspectum latrocinan-
tis medici dari: quod necesse sit tale esse, quale
mortui sit, non quale viui fuit. Itaque cōsequi me-
dicum, vt hominē crudeliter iugulet: non vt sciat
qualia viui viscera habeamus. Si quid tamē sit,
quod adhuc spirante homine conspectui subijcia-
tur, id saepe casum offerre curantibus. Interdum
enim gladiatorem in harena, vel militē in acie,
vel viatorem à latronibus exceptum, sic vul-
nerari, vt eius interior aliqua pars aperiat, &
in alio alia sita, ita sedem, positū, ordinem, fi-
guram, similiaq; cognoscere prudentem medi-
cum, non cadem, sed sanitatem molientē, idq; per
misericordiam discere, quod alij dira crudelitate
cognos-

cognouerint. Ob hæc ne mortuorum quidem lace-
 rationem necessariam esse. Quæ etsi non crudelis,
 tamen fœda sit, cum aliter pleraque in mortuis
 se habeant. Quantum verò in viuis cognosci po-
 test, ipsa curatio ostendat. Cum hæc per multa vo-
 lumina, perq; magna contentionis disputationes
 à medicis sæpe tractata sint, atq; tractentur: subij-
 ciendum est quæ proxima vero videri possint.
 Ea neq; addicta alterutri opinioni sunt, neq; ab
 vtraque nimium abhorrentia, media quodam-
 modo inter diuersas sententias. Quod in plurimis
 cōtentionibus deprehendere licet, sine ambitione
 verum scrutantibus, vt in hac ipsa re. Nam quæ
 demum caussæ vel secundam valetudinem præ-
 stent, vel morbos excitent: quomodo spiritus, aut
 cibus, vel detrahatur, vel digeratur, ne sapientiæ
 quidem professores scientia comprehendunt, sed
 coniectura persequuntur. Cuius autem rei non est
 certa notitia, eius opinio certum reperire reme-
 dium non potest. Verumq; est, ad ipsam curan-
 di rationem nihil plus conferre, quam experien-
 tiam. Quanquàm igitur multa sint ad ipsas ar-
 tes propriè non pertinentia, tamen eas adiuuat
 excitando artificis ingenium. Itaq; ista quoq; natu-
 ræ rerum contēplatio,* quamuis non faciat medi-
 cum aptiorem, tamen medicinæ reddit profectū.
 Veriq; simile est, & Hippocratem, & Erasistra-
 tum, & quicumque alij non contenti febres &
 vlcera agitare, rerum quoq; naturam ex aliqua
 parte scrutati sunt, nō ideo quidē medicos fuisse,

* Alias :
 quāuis nō
 faciat me-
 dicū: aptio-
 rem tamē
 medicinæ
 reddit, atq;
 perfectū.

b 3

verum

verū ideo quoq; maiores medicos extitisse. Ratione verò opus est ipsi medicinæ, etsi non inter obscuras causas, neq; inter naturales actiones, tamen sæpe. *Est enim hæc ars cōiecturalis: neq; respondet ei plerunq; non solum coniectura, sed etiam experientia. Et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur sicut assuevit. Rarius, sed aliquando tamen morbus quoque ipse nouus est, quem non incidere, manifeste falsum

Caro ex
naturalib;
prolapsa.

est: cū etate nostra quedam ex naturalibus partibus carne prolapsa, et arente, intra paucas horas expirauerit: sic vt nobilissimi medici, neq; genus mali, neq; remedium inuenerint. Quos ego nihil ideo tentasse iudico, quia nemo in splendida persona periclitari coniectura sua voluerit: ne occidisse, nisi seruasset, videretur. Veri tamen simile est, potuisse aliquid cogitare, detracta tali verecundia, et fortasse responsurū fuisse id, quod aliquis esset expertus. Ad quod medicinæ genus neq; semper similitudo aliquid cōfert, etsi quando confert, tamen id ipsum rationabile est inter multa similia genera, & morborum, & remedium cogitare, quo potissimū medicamento sit vtendum. Cū igitur talis res incidit, medicus aliquid oportet inueniat, quod non vtiq; fortasse, sed sæpius tamen etiam respondeat. Petet autem nouum quoq; cōsiliū, non à rebus latentibus (istæ enim dubiæ, & incertiæ sunt) sed ab his, quæ explorari possunt, id est euidentibus causis. Interest enim fatigatio morbi, an sitis, an frigus, an calor,

lor, an vigilia, an fames fecerit, an cibi, viniq;
abundantia, an intemperantia libidinis. Neq; igno-
rare huc oportet, quæ sit ægri natura, humidum
magis, an magis siccū corpus eius sit: validi ner-
ui, an infirmi: frequēs aduersa valetudo, an ra-
ra: eaq; cum est, vehemens esse soleat, an levis:
brevis, an longa. Quod is vitæ genus sit secutus,
laboriosum, an quietum: cū luxu, an cum frugali-
tate. Ex his enim, similibusq; sepe curandi noua
ratio ducēda est. Quamuis ne hæc quidē sic præ-
teriri debent, quasi nullam cōtrouersia recipiant.
Nam & Erasistratus non ex his fieri morbos
dixit, quum & alij, et ijdem aliàs post ista non
febricitarent: et quidem medici seculi nostri sub
autore (vt ipsi videri volūt) Themisone conten-
dunt, nullius causse notitiā quicquā ad curatio-
nes pertinere, satisq; esse quadam cōmunia mor-
borum intueri. Siquidem horum tria genera esse,
vnum adstrictū, alterū fluens, tertium mixtum.
Nam modo parū excernere ægros, modò nimis:
modò alia parte parum, alia nimis. Hæc autem
genera morborum, modò acuta esse, modò longa:
& modò increscere, modò cōsistere, modò minui
consueuerunt. Cognito igitur eo quod ex his est, si
corpus adstrictum est, digerēdum esse: si proflu-
uio laborat, cōtinendum: si mixtum vitium habet,
occurrendum subinde vehementiori malo: & a-
liter acutis morbis medendum, aliter vetustis,
aliter increscientibus, aliter subsistentibus, aliter
iam ad sanitatem inclinantibus. Horum obser-

b 4 uatio

uationem medicinam esse, quam ita finiunt, et
 quasi viam quandam, quam μέθοδος Græci no-
 minant, eorumque quæ in morbis communia sunt,
 contemplatricem esse contendunt. ac neque ratio-
 nalibus se, neque experimenta tantum spectanti-
 bus annumerari volunt, cum ab illis eo nomine
 * nolunt dissentiant, quod in cōiectura rerū latentium* vo-
 lunt esse medicinam ab his, eò quod parum artis
 esse in obseruatione experimētorum credūt. Quod
 ad Erasistratum pertinet, primum ipsa eviden-
 tia eius opinioni repugnat, quia raro, nisi post
 horum aliquid morbus venit. Deinde nō sequi-
 tur, ut quod aliud nō afficit, aut eundem aliās,
 id ne alteri quidē, aut eidem tēpore alio noceat.
 Possunt enim quadā subesse corpori, vel ex in-
 firmitate eius, vel ex aliquo affectu, quæ vel in
 alio nō sunt, vel in hoc aliās nō fuerunt, eaque per
 se non tāta vi concitant morbum, tamē obnoxium
 magis alijs iniurijs corpus efficiūt. Quod si con-
 templationē rerū naturæ (quā temere medici sibi
 vendicant) satis cōprehendisset, etiā illud scisset,
 nihil omnino ob vnā causā fieri, sed id pro
 causā apprehēdi, quod cōtulisse plurimum vide-
 tur. Poteſt autē id dum solū est, nō mouere, quod
 iunctum alijs maxime mouet. Accedit ad hæc,
 quod ne ipse quidē Erasistratus, qui trāsuso in
 arterias sanguine febrē fieri dicit, idque nimis re-
 pleto corpore incidere reperit, cur ex duobus æquē
 repletis, alter in morbum inciderit, alter omni pe-
 riculo vacarit (quod quotidie fieri apparet) non
 discre

discreuerit. Ex quo disci potest, ut vera sit illa transfusio, tamen illā non per se (cum plenus corpus est) fieri: sed cum horum aliquid accesserit. Themisonis verò æmuli, si perpetua quæ promittunt habēt, magis etiā quam ulli rationales sunt. Neq; enim si q̄s non oīa tenet, quæ rationalis alius probat, protinus alio nouo nomine artis indiget: si modò, quod primū est, non memoriæ soli, sed rationi quoq; insīstīt. Si verò, quod proprius est, vix vlla perpetua præcepta medicinalis ars recipit: q̄dē sunt quod ū, quos experimēta sola sustinent. Eo magis, quoniā si cōpresserit aliquē morbus, an fuderit, quilibet etiā imperitisimus videt. Quid aut̄ compressum corpus resoluat, quid solutū teneat, si à ratione tractum est, rationalis est medicus. Si (ut ei, qui se rationalem negat, confiteri necesse est) ab experientia Empiricus est. Ita apud eū morbi cognitio extra artē, medicina intra vsum est. Neq; adiectū quicquā Empiricorum professioni, sed dēptum est: quoniā illi multa circūspiciunt, hi tantū facilima, & non plus quā vulgaria. Nā & qui pecoribus ac iumentis medētur, cum propria cuiusq; ex multis animalibus nosse non possint, cōmunibus tantummodo insīstunt. Et extera gentes, cum subtilē medicinæ rationē non nouerint, communia tantum vident. Et qui amplē valetudinarios nutriūt (quia singulis summa cura consulere non sustinent) ad cōmunia ista cōfugiunt. Neq; Hercules istud, & antiqui medici nescie-

Hinc me-
dicina, ars
interpollis
à Plinio dā
cta est.

b 5 runt,

runt, sed his cōtenti non fuerunt. Ergo etiā vetustissimus autor Hippocrates dixit, mederi oportere & communia, & propria intuentē. Ac ne isti quidem ipsi intra suā professionē consistere vllō modo possunt. Siquidē et compressorum & fluentiū morborū genera diuersa sunt, faciliusq; id in his quæ fluūt, inspicī potest. Aliud est enim sanguinem, aliud bilem, aliud cibū vomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri, aliud tabe cōsumi. Atq; in partes quoq; humor erumpit, vt in oculos auresq;. Quo periculo nullum humanū membrum vacat. Nihil autem horum sic, vt aliud curatur. Ita protinus in his à cōmuni fluentis morbi cōtemplatione, ad propriā medicina descendit. Atq; in hac quoq; rursus alia proprietatis notitia sæpe necessaria est: quia non eadem omnibus, etiā in similibus casibus opitulant. Siquidē certæ quædā res sunt, quæ in pluribus vētem aut adstringūt, aut resoluunt. Inueniuntur tamen, in quibus aliter atq; in cæteris, idē eueniat. In his ergo cōmunium inspectio cōtraria est, ppriorum tantum salutaris. Et causæ quoq; æstimatio sæpe morbum soluit. Ergo etiā ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuperridimus, Cassius febricitanti cuidā, & magna siti affecto, cum post ebrietatem eum premi cœpisse cognosceret, aquā frigidā ingessit. Qua ille epota, cum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno et sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune prouidit, nō ex eo, quod

quod aut strictum corpus erat, aut fluebat: sed ex
 causa, quæ antè præcesserat. Estq; etiã proprium
 aliquid & loci & tēporis, istis quoq; autoribus,
 qui cū disputāt, quemadmodum sanis homini-
 bus agēdum sit, præcipiunt, vt grauib; aut lo-
 cis aut temporibus, magis vitetur frigus, æstus,
 satietas, labor, libido, magisq; vt conquiescat ijs-
 dem aut locis, aut temporibus. si quis grauitatem
 corporis sentit, ac neq; vomitu stomachum, neq;
 purgatiōe aluum sollicitet. Quæ vera quidē sunt,
 à communibus tñ ad quædā propria descendunt:
 nisi persuadere nobis volunt, sanis quidem consi-
 derandum esse, qđ cælum qđ tempus anni sit, æ-
 gris verò non est. Quibus tanto magis omnis ob-
 seruatio necessaria est, quāto magis obnoxia of-
 fensis infirmitas est. Quinetiā morborum in ijsdē
 hominibus aliæ atq; aliæ proprietates sunt: &
 qui secundis aliqn frustra curatus est, cōtrarijs
 sepe restituitur. Plurimaq; in dando cibo discri-
 mina reperiuntur, ex quibus contentus vno ero.
 Nā famem facilius fert adolescens, quā puer:
 facilius* in denso cælo, quā in tenui: facilius in
 hyeme, quā æstate: facilius vno cibo, quā pran-
 dio quoq; assuetus: facilius in exercitatus, quā
 exercitatus homo sustinet. Sæpe aut in eo magis
 necessaria cibi festinatio est, qui minus in diem
 tolerat. Ob quæ competit eū, qui propria non no-
 uit, communia tantum intueri debere: eumq; qui
 nosse propria potest, illa quidem nō oportere ne-
 gligere, sed his quoq; insistere. Ideoq; cū par
 scientia

* Quibus-
 dā videtur
 hic legēdū
 potius, in
 tenui cœ-
 lo, quā i
 dēso: & æ-
 state quā
 hyeme:
 propterea
 quod Hip-
 pocrat. di-

eat libro 1. scientia sit, vtiliorem tñ medicum esse amicum
 Aphor. Vē quam extraneum. Igitur vt ad propositū meum
 tres hyeme redeam, rationalem quidē puto medicinam esse
 & vere sūt debere, instrui verò ab euidentibus causis, obs-
 calidissimi. curis omnibus non à cogitatione artificis, sed ab
 Quare per ipsa arte reiectis. Incidere autē viuorum corpo-
 ra alimēta ra, & crudele, & superuacuum est: mortuorum
 copiosiora sunt exhi- corpora discentibus necessarium. Nā positum, &
 benda. Et ordine nosse debent: quæ cadauera melius, quàm
 Paul⁹ Ac- gineta lib. viuus, et vulneratus homo representant. Sed et
 itidē 1. q. 53. cetera, quæ modò in viuis cognosci possunt, in
 Hyeme qui dē & for- ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius,
 tiori exer- sed aliquanto mitius, vsus ipse monstrauit. His
 citatiōe, & propositis, primum dicam, quemadmodum sanos
 pleniore ci agere cōueniat: tum ad ea transibo, quæ ad mor-
 bo vtendū est. Nisi eò bos, curationesq; eorum pertinebunt.

referas,
 quod i dē- Quemadmodum sanos agere conueniat.
 so cœlo, &

CAP. I.

perhyemē,
 corpora
 sunt robu-
 stiora, atq;
 iō etiā faci-
 lius quāli-
 bet mole-
 stia ferunt.

* Reuncto
 res videtur
 transferre
 Plin li. 29.
 cap. 1.



ANVS homo, qui & bene valet,
 & sue spontis est, nullis obligare se
 legibus debet: ac neq; medico, neq;
 * iatralipta egere. Hūc oportet va-
 rium habere vitæ genus: modò ruri esse, modò in
 vrbe: sæpiusq; in agro, nauigare, venari, quiesce-
 re interdum, sed frequētius se exercere. Siquidē
 ignauia corpus hebetat, labor firmat: illa maturā
 senectutem, hic lōgā adolescentiā reddit. Prodest
 etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis
 vti: modò vngi, modo idipsum negligere: nullum
 cibi genus fugere, quo populus vtaturi interdum
 in con

in conuiuio esse, interdū ab eo se retrahere: modò plus iusto, modò non amplius assumere: bis die potius, quàm semel cibū capere: et semper quàm plurimum, dummodo hunc cōcoquat. Sed ut huius generis exercitationes, cibiq; necessarij sunt, sic athletici supernacui. Nā & intermissus propter ciuiles aliquas necessitates ordo exercitationis corpus affligit: & ea corpora, quæ more eorum repleta sunt, celerrime & senescunt, & ægotāt. Cōcubitus verò neq; nimis concupiscendus, neq; nimis pertimescendus est. Rarus, corpus excitat, frequens soluit. Cū autē frequens, non numero sit, sed natura, ratione ætatis & corporis scire licet, eum non inutilem esse, quem corporis neq; læguor, neq; dolor sequitur. Idē interdū peior est, noctu tutior: ita tamē, si neq; illū cibis, neq; hunc cū vigilia labor statim sequit̃. Hæc firmis seruanda sunt, cauendumq; ne in secunda valetudine, aduersæ præsidia cōsumantur.

Paul⁹ Aegineta li. 1. ca. 37. Frequens cōcubitus, corpus rari⁹, & frigidi⁹, & imbellius reddit.

Quæ stomacho imbecillis seruanda sint.

C A P. II.

ET imbecillis stomacho (quo in numero magna pars vrbānorum, omnesq; penè cupidi literarum sunt) observatio maior necessaria est: ut quod vel corporis, vel loci, vel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur qui bene concoxit, manē tutò surget; qui parum, quiescere debet: & si manē surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui non concoxit, ex toto conquiescere, ac neq; labori se, neq; exercitationi, neq; negotio credere.

credere. Qui crudus sine præcordiorum dolore ræstat, is ex intervallo aquam frigidam bibere, & se nihilominus continere. Habitare verò ædificio lucido, per flatum æstium hybernium solem habente, cauere meridianum solem, matutinum & vespertinum frigus, itemq; auras fluminis, atq; stagnorum, minimeq; nubilo cælo, soli aperienti se committere, ne modo frigus, modo calor moueat. Quæ res maximè grauedines, distillationesq; concitat. Magis verò grauibus locis ista seruanda sunt, in quibus etiam pestilentiam faciunt. Scire autem licet, integrum corpus esse, cum quotidie mane vrina alba, dein ruffa est. Illud concoquere, hoc concoxisse significat. Vbi experrectus est aliquis, paulum intermittere, deinde (nisi hyems est) fouere os multa aqua frigida debet, longis diebus meridiari potius ante cibum, sin minus, post eum: per hyemem potissimum totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, non post cibum id facere, sed post cōcoctionem. Quem interdum vel domestica, vel ciuilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod seruandum curationi corporis sui est. Prima autem eius exercitatio exercitatio est, quæ semper antecedere cibum debet: in eo, qui minus laborauit, et bene concoxit, amplior: in eo, qui fatigatus est, & minus concoxit, remissior. Comode verò exercent, clara lectio, arma, pila, cursus, ambulatio: atq; hæc non utiq; plana commodior est. Siquidem melius ascensus quoq; & descensus cum quadam varietate

Exercitatio.
tio.

varietate corpus moueat, nisi tamen id perquam
 imbecillum est. Melior autem est sub diuo, quam
 in porticu: melior (si caput patitur) in sole, quam
 in umbra: melior in umbra, quam parietes, aut
 viridaria efficiunt, quam quæ tecto subest: me-
 lior recta, quam flexuosa. *Exercitationis autem*
 plerumque finis esse debet sudor, aut certe lassitu-
 do, quæ citra fatigationem sit, idque ipsum, modo
 minus, modo magis faciendum est. Ac ne his
 quidem Athletarum exemplo, vel certa esse lex,
 vel immodicus esse labor debet. *Exercitationem*
 recte sequitur, modo unctio, vel in sole, vel ad
 ignem, modo balneum, sed in cœclavi, quam ma-
 xime et alto, et lucido, et spatioso. Ex his ve-
 rò neutrum sæpe fieri oportet, sed sæpius alter-
 utrum pro corporis natura. Post hæc paulum con-
 quiescere opus est. Vbi ad cibum ventum est,
 nunquam utilis est nimia satietas. Sæpe etiam
 inutilis nimia abstinentia. Sæpe si qua intempe-
 rantia subest, *durior est in potione, quam in
 esca. Cibus à salsamentis, oleribus, similibusque
 rebus melius incipit. Tum caro assumenda est,
 quæ assa optima, aut elixa est, Condita omnia
 duabus de causis inutilia sunt, quoniam et plus
 propter dulcedinem assumitur, et quod modo
 par est, tamen egrius cōcoquitur. Secunda men-
 sa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo coace-
 scit. Si quis itaque hoc parum valet, palmulas po-
 maque et similia melius primo cibo assumit. Post
 multas potiones, quæ aliquantum sitim excessē-
 runt,

Lassitudo
 est graui-
 tas corpo-
 ris. Vergil.
 Lassitudo pa-
 pauera col-
 lo. quæ etiā
 citra labo-
 re accidit.
 Fatigatio-
 nē verò nō
 mietatē la-
 boris itelli-
 gimus. Idē:
 Veloces ia-
 culo cer-
 uos, cursū-
 que fatigat.
 quod mox
 imodiciū la-
 bore appel-
 lauit. Verū
 de generi-
 b⁹ lassitu-
 dinis legē-
 dus ē lib. 3.
 Galeni de
 Sanitate
 tuenda.
 * tutior
 Cibus.

runt, nihil edendum est, post satietatem, nihil agendum. Vbi expletus est aliquis, facilius concoquit, si quicquid assumpsit potione aquae frigidae includit, tum paulisper inuigilat, deinde bene dormit. Si quis interdiu se impleuit, post cibum neq; frigori, neq; aestui, neq; labori se debet committere. Neq; enim tam facile haec inani corpore quam repleto nocent. Si quibus de causis futura inedia est, labor omnis vitandus est.

Observationes quaedam prout res nouae accidunt, & prout corporum genera, & sexus, & aetates, & tempora anni sunt,

C A P.

III.

ATq; haec quidem penè perpetua sunt. Quasdam autem observationes desiderant & nouae res, & corporum genera, & sexus, & aetates, & tempora anni. Nam neq; ex salubri loco in grauem, neq; ex graui in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in grauem prima hyeme; ex graui in eum, qui salubris est, prima aestate transire melius est. Neq; verò ex multa fame, nimia satietas; neq; ex nimia satietate, fames idonea est. Periclitaturq; & qui semel, et qui bis die cibum incontinenter, contra consuetudinē assumit. Item neq; ex nimio labore subito otium, neq; ex nimio ocio subitus labor sine graui noxa est. Ergo cum quis mutare aliquid volet, paulatim debet assuescere. Omnē etiā laborem facilius,

Puer,
Senex,
Homo.

facilius, vel puer, vel senex, quàm insuetus ho-
mo sustinet. Atq; ideo quoq; nimis otiosa vita
utilis non est, quia potest incidere laboris neces-
sitas. Si quando tamen insuetus aliquis laboravit,
aut multo plus quàm solet, etiam is qui assuevit,
huic ieiuno dormiendū est, multo magis, si etiam
os amarū est, vel oculi caligant, aut venter per-
turbatur. Tum enim non dormiendum tantum-
modo ieiuno est, sed etiam in posterū diem per-
manendum, nisi cito id quod ieiunium sustulit. Quod si fa-
ctum est, surgere oportet, & lente paululum am-
bulare. At si somni necessitas non fuit, quia mo-
dicè magis aliquis laboravit, tamen ingredi ali-
quid eodē modo debet. Communia deinde omni-
bus sunt post fatigationem cibi sumpturi, ubi
paulum ambulauerunt, si balneum non est, calido
loco, vel in sole, vel ad ignem vngi, atq; sudare:
si est, ante omnia in tepidario residere, deinde ubi
paulum conquieuerunt, intrare, & descendere in
solum, tum multo oleo vngi, leniterq; perfricari,
iterum in solum descendere. Post hæc os aqua
calida fouere, deinde frigida. Balneum his feruēs
idoneum non est. Ergo si nimium alicui fatigato
penè febris est, huic abunde est loco tepido dimit-
tere se inguinibus tenus in aquam calidam, cui
paulum olei adiectum sit: deinde totum quidem
corpus, maximè tamen eas partes, quæ in aqua
fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui vinū, &
paulum contriti salis sit adiectū. Post hæc, omni-
bus fatigatis, aptum est cibum sumere, eoq; hu-
mido

mido uti: aqua, vel certè diluta potione esse contentos, maximeq; ea quæ moueat vrinam. Illud quoq; nosse oportet, quòd ex labore sudanti, frigida potio perniciosissima est, atq; etiam (cum sudor se remisit) itinere fatigatis inutilis. A balneo quoque venientibus Asclepiades inutilem eam iudicauit. Quod in his verum est, quibus alius facile, nec tutò resoluitur, quiq; facile inhorrescunt. Perpetuum in omnibus non est, cum potius naturale sit, potione æstuantē stomachum refrigerari, frigentē calefieri. Quod ita precipio, ut tamen fatear, ne ex hac quidem causa sudanti adhuc frigidū bibendū esse. Solet etiam prodesse, post varium cibum, frequentesq; dilutæ potiones, vomitus, & postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio vrget, in vicē modò aqua, modò vinum bibendum est, raroq; balneo utēdum. Leuatq; lassitudinē etiam laboris mutatio, eumq; quem nouum genus eiusdem laboris pressit (id quod in consuetudine est) reficit. Fatigato quotidianum cubile tutissimum est, insolitū contrā lassat. Quod enim contra consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est. Propria quedam ad eum pertinet, qui ambulando fatigatur: hunc reficit in ipso quoque itinere frequens frictio, post iter, primum sedile, deinde vnctio, tum calida aqua in balneo magis superiores partes, quàm inferiores foueat. Si quis verò exustus in sole est, huic in balneum protinus eundum est, perfundendumq; oleo corpus & caput,

put, deinde in solium bene calidum descendendum est, tum multa aqua per caput infundenda, prius calida, deinde frigida. At ei qui perfrixit, opus est balneo primum inuoluto sedere donec insudet, tum ungi, deinde lauari, cibum modicum, deinde potiones meracas assumere. Is verò qui nauigabit, & nausea pressus est, si multam bilem euomuit, vel abstinere cibo debet, vel paulum aliquid assumere. Si pituitam acidam effudit, utique sumere cibum, sed assueto leuiorem: si sine vomitu nausea fuit, vel abstinere, vel post cibum vomere. Qui verò toto die, vel in vehiculo, vel in spectaculis sedit, huic nihil currèdum, sed lentè ambulandum est. Lenta quoque in balneo mora, dein coena exigua prodesse consueuerunt. Si quis in balneo aestuat, reficit hunc ore exceptum, & in eo retentum acetum. Si id non est, eodem modo frigida aqua assumpta. Ante omnia autem norit quisque naturam sui corporis: quoniam alij graciles, alij obesi sunt, alij calidi, alij frigidiores, alij humidi, alij sicci, alios astricta, alios resoluta aluus exercet. Raro quisquam, non aliquam partem corporis imbecillam habet. Tenuis verò homo implere se debet, plenus extenuare: calidus refrigerare, frigidus calefacere: madens siccare, siccus madefacere: itemque aluum firmare is, cui fusa, soluere is, cui astricta est. Succurrendumque semper parti maximè laboranti est. Implet autem corpus modica exercitatio, frequentior quies, unctio, & si post prandium est balneum, contra-

Et a alius, modicum frigus hyeme, somnus &
 plenus & non nimis longus, molle cubile, animi
 securitas, assumpta per cibos & potiones maxi-
 mè dulcia & pingua, cibus & frequentior, &
 quantus plenissimus potest concoqui. Extenuat
 corpus aqua calida, si quis in eam descendit, ma-
 gisq; si salsa est, in ieiunio balneum, inurens sol,
 & omnis calor, cura, vigilia, somnus nimium
 vel brevis, vel longus, lectus per æstatem terra,
 hyeme durum cubile, cursus, multa ambulatio,
 omnisq; vehemens exercitatio, vomitus, deiectio,
 acida res & austera, & semel die assumptæ
 epulæ, & vini non perfrigidi potio ieiuno in
 consuetudinem adducta. Cum verò inter exte-
 nuantia posuerim vomitum, & deiectionem, de
 his quoq; propria quedam dicenda sunt. Eiectum
 esse ab Asclepiade vomitum in eo volumine, quod
 de Tuenda sanitate composuit, video, neq; repre-
 hendo, si offensus eorum est consuetudine, qui quo-
 tidie eijciendo vorandi facultatem moluntur.
 Paulo etiam longius processit. Idem purgationes
 quoq; eodem volumine expulit. Et sunt hæ per-
 niciose, si nimis valentibus medicamentis fiunt.
 Sed hæc tamen submouenda esse non est perpe-
 tuum, quia corporum temporumq; ratio potest ea
 facere necessaria, dum et modo, & non nisi cum
 opus est, adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si
 quid iam corruptum esset, expelli debere confessus
 est. Ita non ex toto res condemnanda est. Sed esse
 eius etiam plures causæ possunt, estq; in ea que-
 dam

Vomitum.

dam paulo subtilior observatio adhibenda. Vomitus utilis est hyeme, quàm æstate. Nam tum & pituita plus, & capitis gravitas maior subest. Inutilis est gracilibus, & imbecillum stomachum habentibus. Utilis est plenis & biliosis omnibus, si vel nimium se repleverint, vel parum concoxerunt. Nam siue plus est, quàm quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur, non oportet. Si verò corruptum est, nihil commodius est, quàm id, qua via primum expelli potest, eicere. Itaq; ubi amari ructus cum dolore & gravitate præcordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. Item prodest ei, cui pectus æstuat, & frequens salina, uel nausea est, aut cui sonant aures, aut madent oculi, aut os amarum est. Similiterq; ei, qui vel cælum vel locum mutat. hisq; quibus (si per plures dies non vomuerint) dolor præcordia infestat. Neq; ignoro inter hæc præcipi quietem, quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus, nec in omnibus idem facit. Itaq; istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor. Interdum valetudinis causa rectè fieri, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere, et senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tanquam tepidam antè debet assumere: si difficilius, aquæ vel salis, vel mellis paulum adijcere. At qui mane vomiturus est, antè bibere mulsum, vel hyssopum, aut esse radiculam debet, deinde aquam tepidam, ut supra

Provo-
cans
tiavomitū.

scriptum est, bibere. Cætera quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum (si stomachus infirmus est) paulum cibi, sed huius idonei, gustandum, & aquæ frigidae cyathi tres bibendi sunt. Si autem vomitus fauces exasperavit, qui vomuit (si mane id fecit) ambulare debet, tum vngi, deinde cœnare. Si post cœnam, postero die lauari, & in balneo sudare, hinc proximus cibus, mediocris utilior est, isq; esse debet cum pane hesterno, vino austero, meraco, & carne assa, cibusq; omnibus quàm siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius consulet, si biduo continuerit, quàm si post quintum demum diem vomuerit, nisi hac mora gravitatem

Deiectio. pectori faciet. Deiectio autem medicamento quoq; petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoq; inflammationes, caligines, capitis dolores, aliaq; superioris partis mala increscunt. Quid enim inter hæc adiuuare possunt quies & inedia, quæ per illam maxime eueniunt? Qui eijcere volet, primum cibus, vinisq; utetur his, quæ hoc præstant. Dehinc si parum illa proficiant, aloenumat. Sed Purgationes quoq; ut interdum necessariæ sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus, & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit. Calefacit autem vntio, aqua salsa, magisq; si calida est, omnia & salsa, amara, carnosâ, si post cibum est balneum, vinum austerrum: refrigerat in ieiunio & balneum

**Purgatio-
nes.**

neum & somnus, nisi nimis longus est, et omnia
 acida, aqua quàm frigidissima, oleum si aque
 misceatur. Humidum autem corpus efficit labor
 * maior, quàm ex consuetudine, frequens bal- * aliàs, mi
 neum, cibus plenior, multa potio, posthac ambu- nor
 latio, & vigilia: per se quoq; ambulatio multa,
 & vehemens, & matutina exercitatio, & non
 protinus cibus adiectus, ea genera escae quæ ve-
 niunt ex locis frigidis, & pluuijs, & irriguis.
 Contrà siccatur, * modica exercitatio, fames, vinctio * aliàs, im
 sine aqua, calor, sol * modicus, frigida aqua, cibus modica
 exercitationi statim subiectus, & is ipse ex sic- * aliàs, im
 cis & æstuosis locis veniens. Alium astringit modicus
 labor, sedile, creta figuralis corpori illita, cibus
 imminutus, & is ipse semel die assumptus ab eo,
 qui bis solet: exigua potio, neque adhibita, nisi
 cum cibi quis quantum assumpturus est, cepit:
 post cibum quies. Contrà soluit, aucta ambula-
 tio atque esca, post motus qui post cibum est, sub-
 inde potiones cibo immixtæ. Illud quoque scire
 oportet, quod ventrem vomitus solutum compri-
 mit, compressum soluit. Itemq; comprimit is vo-
 mitus, qui statim post cibum est: soluit is, qui
 tarde superuenit. Quod ad ætates verò pertinet,
 inedia facillime sustinent mediæ ætates, mi-
 nus iuuenes, minime pueri, & senectute conse-
 cti. Quo minus fert facile quisq; eo sæpius debet
 cibum assumere, maximeq; eo eget, qui increscit.
 Calida lauatio, & pueris & senibus apta est.
 Vinum dilutius pueris, senibus meracius, neutri

etati quæ inflationes mouent. Iuuenum minus,
quæ assumant, & quomodo curentur, interest.
Quibus iuuenibus fluxit aluus, plerunq; in sene-
ctute contrahitur: quibus in adolescētia fuit astri-
cta, sepe in senectute soluitur. Melior est autem
in iuvene fusior, in sene astrictior. Tempus quoq;
anni considerare oportet. Hyeme plus esse conue-
nit: minus, sed meracius bibere: multo pane uti,
carne potius elixa, modicè oleribus: semel die ci-
bum capere, nisi si nimis venter astrictus est. Si
prandet aliquis, vtilius est exiguum aliquid, &
ipsum siccum sine carne, sine potione sumere. Eo
tempore anni calidis omnibus potius vtendū est,
vel calorē mouentibus. Venus tum non æquè per-
niciosa est. At vere paulum cibo demēdum, adij-
ciendumq; potioni, sed dilutius tamen bibendum
est: magis carne vtendum, magis oleribus: trans-
eundū paulatim ad assa ab elixis. Venus eo tem-
pore anni tutissima est. Aestate verò & potione
& cibo corpus sæpius eget. Ideo prandere quoq;
commodum est. Eo tempore aptissima sunt &
caro, & olus, potio quàm dilutissima, vt & si-
tim tollat, nec corpus incendat, frigida lauatio,
caro assa, frigidi cibi, vel qui refrigerent. Vt sæ-
pius autē cibo vtendum, sic exiguo est. Per au-
tunnum propter cæli varietatē periculum ma-
ximum est. Itaq; neq; sine veste, neq; sine calcea-
mentis prodire oportet, præcipueq; diebus frigi-
dioribus: neq; sub diuo nocte dormire, aut certe
bene operiri. Cibo verò iam paulo pleniore uti
licet:

licet : minus, sed meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quæ immodicè toto die plerunq; sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non hæc, sed consummatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quàm in his noxæ est. Sed his uti non sæpius, quàm alio cibo convenit. Deniq; aliquid densiori cibo, cum id accedit, necessarium est demi. Neque æstate verò, neque autumnò utilis venus est. Tolerabilior tamen per autumnum : æstate verò in totum, si fieri potest, abstinendum.

De his qui aliqua parte corporis laborant,
& primum de his quibus caput infirmum est.

C A P. II II.

Proximum est, ut de his dicam, qui partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is (si bene concoxerit) leniter perfricare id manè manibus suis debet: nunquam id (si fieri potest) veste velare, aut ad cutem tonderi: utileq; lunam vitare, maximeq; ante ipsum lunæ, solisq; concursus: sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere, multum ambulare: sed (si licet) sub tecto, neq; in sole. Vbiq; autem vitare solis ardorem, maximeq; post cibum & vinum: potius ungi quàm lauari, nunquam ad flammam ungi, interdum ad prunam. Si in balneum venit, sub veste primum paulum in tepidario insudare, ibi ungi, tum transire in calidarium: ubi sudabit, in solium non descendere, sed multa calida aqua per

c s caput

Aqua frigida capiti prodest.

caput se totum perfundere : tum tepida uti, deinde frigida, diutiusq; ea caput, quam ceteras partes perfundere : deinde id aliquandiu perfricare : nouissimè detergere & ungere. Capiti nihil æquè prodest, atq; aqua frigida : itaq; is, cui hoc infirmum est, per æstatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subijcere. Semper autem, etiam si sine balneo nectus est, neque totum corpus refrigerare sustinet, caput tamen aqua frigida perfundere. Sed cum ceteras partes attingi nolit, demittere id, ne ad ceruices aqua descendat, eamq; ne quid oculis, alijs'ue partibus noceat, defluentem subinde manibus ad os regerere. Huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat : isq;, si ieiunio caput leditur, assumendus etiam medio die est : si non leditur, semel potius. Bibere huic assidue vinum dilutū, leue, quam aquam magis expedit : ut cum caput grauius esse cœperit, sit quò cōfugiat : eiq; ex toto neq; vini, neq; aqua semper utilia sunt : medicamentū utrunq; est, cum inuicem assumitur. Scribere, legere, voce contendere, huic opus non est, utiq; post cœnā, postquam nec cogitatio quidē ei satis tuta est, maximè tamē vomitus alienus est.

De his qui lippitudine, grauedine, destillatione, tonsillisq; laborant. C A P. V.

NEque verò his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus aquæ frigida prodest : sed ijs etiam, quos assidue lippitudines, grauedines, destillationes, tonsillæq; malè habent. His autem

autem non caput tantum quotidie perfundendum est, sed os quoque multa frigida aqua fouendum est: præcipueq; omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi grauius cœli Austri reddiderunt. Cumq; omnibus inutilis sit, post cibum aut contentio, aut cogitatio animi: tñ his præcipue, qui vel capitis, vel arterie dolores habere consueuerunt, vel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiã grauedines, destillationesq; possunt, si quàm minime eũ (qui his opportunus est) aërem vel loca, aquasq; mutet, si caput in se protegit, ne incendatur, ne'ue subitum ex repentino núbilo frigus id moueat, si post concoctionem ieiunus caput radit, si post cibum neque legit, neq; scribit.

Ad solutam aluum remedia. C A P. VI.

Quem verò frequenter citata aluus exercet, huic opus est pila, similibusq; superiores partes exercere, dum ieiunus est ambulare, vitare solis nimium ardorẽ, continua balnea, vngi citra sudorem, non uti cibis varijs, minimeq; iurulentis, aut leguminibus, oleritis'ue his, quæ celeriter descendunt, omnia denique fugere quæ tarde concoquuntur. Venatio, duriq; pisces, et ex domesticis animalibus assa caro maximè inuuant. Nunquam vinum salsum bibere expedit, Plin. lib. 14. cap. 8. ne tenue quidem, aut dulce, sed austerum, & plenius, neq; id ipsum peruetus. Si mulso uti volet, Tenue, Dulce, Austerũ, Pleniũ. id ex decocto melle faciendũ est. Si frigide potiones ventrem eius non turbant, his utendum potissimum

tiſſimum eſt. Si quid offenſe in cœna ſenſit, vomere debet, idq; poſtero quoq; die facere, tertio modici ponderis panẽ ex vino eſſe, adiecta rua vel olea, vel ex defruto, ſimilibusq; alijs, deinde ad conſuetudinem redire. Semper autem poſt cibum conqueſcere, ac neq; intendere animum, neq; ambulatione, quamvis leui, dimoueri.

Remedia ad coli dolorem. C A P. VII.

ET ſi laxius inteſtinũ dolere cõſuevit (quod *κῶλον* nominant) cum id nihil niſi genus inflationis ſit, id agendum eſt, vt concoquat aliquis, vt lectione, & alijs generibus exerceatur: vtatur balneo calido, cibus quoq; & potionibus calidis: deniq; omnimodo frigus euitet, item dulcia omnia, leguminaq; & quicquid inflare conſuevit.

Quæ agenda ſint ſtomacho laborantibus.

C A P. VIII.

SI quis verò ſtomacho laborat, legere clarè debet: poſt lectionẽ ambulare: tum pila, vel armis, alio ue quo genere, quo ſuperior pars mouetur, exerceri: non aquam, ſed vinum calidum bibere ieiunus: tum cibum bis die aſſumere, ſic tamen vt facilè concoquat: vt i vino tenui, & aſtero, & poſt cibum frigidis potionibus potius. Stomachũ autem infirmum indicant, pallor, macies, præcordiorum dolor, nauſea, & nolentium vomitus, in ieiuno dolor capitis, Quæ in quo non ſunt, iſ firmi ſtomachi eſt. Neq; credendum utiq; noſtris eſt, qui cùm in aduerſa valetudine vi-

num

num aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrociniū in accusationem, non merentis stomachi habent. At qui tardē concoquunt, & quorum ideo prae cordia inflantur, qui ne propter ardorem aliquem noctu sitire consueuerunt, antequam conquiescant, duos, tresue cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam aduersus tardam concoctionem clarē legere, deinde ambulare, tum vel vngi, vel lauari assidue, vinum frigidum bibere, & post cibum magnam portionem, sed (vt supra dixi) per siphonem, deinde omnes portiones aqua frigida intercludere. Cui verò cibus acescit, is ante eum bibere aquam egellidam debet, & vomere. At is cui ex hoc frequens deiectio incidit, quoties alius ei constiterit, frigida portione potissimum vtatur.

Quid obseruandum sit dolore neruorum laborantibus.

CAP. IX.

SI cui verò dolere nerui solent (quod in podagra, chiragraue esse consuevit) huic quantum fieri potest, exercendum id est, quod affectum est, obijciendumque labori & frigori, nisi cum dolor increuit. Sub dio quies optima est. Venus semper inimica est. Concoctio (sicut in omnibus corporis affectibus) necessaria est. Cruditas enim id maxime laedit, & quoties offensum corpus est, vitiosa pars maxime sentit. Et concoctio autem omnibus vitijis occurrit, sic rursus alijs frigus, alijs calor. Quae sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicum est seni, tenui, vulnere,

vulneri, præcordijs, intestinis, vesicæ, auribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, vulvæ, cerebro. Idem summam cutem facit pallidam, aridam, duram, nigram. Ex hoc horrores, tremoresq; nascuntur. At prodest iuuenibus, & omnibus plenis, erectiorq; mens est, & melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cauetur. Aqua verò frigida infusa, præterquam capiti, etiam stomacho prodest. Item articulis, doloribusq; qui sunt sine ulceribus. Item rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant. Calor autem adiuuat omnia quæ frigus infestat. Item lippientes si nec dolor, nec lacrymæ sunt. Nervos quoque qui contrahuntur, præcipueq; ea ulcera, quæ ex frigore sunt. Idem corporis colorem bonum facit, urinam movet. Si nimius est, corpus effæminat, nervos emollit, stomachum solvit. Minimè verò aut frigus, aut calor tuta sunt, ubi subita insuetis sunt. Nam frigus lateris dolores, aliq; vitia: frigida aqua strumas excitat. Calor concoctionem prohibet, somnum aufert, sudorem digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

Observatio in pestilentia.

C A P. X.

Est etiam observatio necessaria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, navigare. Vbi id non licet, gestari, ambulare sub diuo, ante æstum leniter, eodemq; modo vngi, & ut supra cōprehensum est, vitare fatig

fatigationem, crudelitatem, frigus, calorem, libidinem, multoq; magis se continere, si qua grauitas in corpore est: tum neq; mane surgendum, neq; pedibus nudis ambulandum est, minimeq; post cibum, aut balneum, neq; ieiuno, neq; cœnato vomendum est. Neque mouenda aluus, atque etiam si per se mota est, comprimenda est. Abstinentum potius, si plenius corpus est. Itemq; vitandum balneum, sudor, meridianus somnus, vtique si cibus quoque antecessit, qui tamen semel die tunc commodius assumitur: insuper etiā modicus, ne crudelitatem moueat. Alternis diebus inuicem modò aqua, modò vinum bibendum est. Quibus seruatis, ex reliqua victus consuetudine, quàm minimū mutari debet. Cum vero hæc in omni pestilētia facienda sint, tum in ea maxime, quàm austru excitant. Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, vbi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus, vel vbi in graues regiones venerunt. Ac si cetera res aliqua prohibebit, vtique abstinere debebit. Atq; ita ab vino ad aquam, ab hac ad vinum eo, qui suprapositus est, modo transitus ei esse.

LIBER II.



INSTANTIS autē aduersæ valetudinis signa complura sunt. In quibus explicādis nō dubitabo auctoritate antiquorum virorum vti, maximeq; Hippocratis: cum recentiores quoque Medici

Medici, quāvis quaedam in curationibus mutarint, tamen hac illū optimē præsagisse fateantur. Sed antequā dico, quibus praecedētibus morborum timor subsit, non alienū videtur exponere, quae tempora anni, quae tempestatum genera, quae partes aetatis, qualia corpora maximē tuta, vel periculis opportuna sint, quod genus aduersae valetudinis in quoq; timeri maximē possit. Non quò non omni tempore, in omni tempestatum genere, omnis aetatis, omnis habitus hominū per omnia genera morborum & agrotent, & moriantur: sed quòd frequentius tamen quaedam eueniant. Ideoq; vtile est scire vnumquemque, quid, & quando maxime caueat.

Quae anni tempora, quae tempestatum genera, quae partes aetatis, qualia corpora vel tuta, vel morbis opportuna sint: & quod valetudinis genus in quoque timeri possit. C A P. I.

Igitur saluberrimum ver est, proxima deinde ab hoc hyems, periculiosior aestas, autumnus longe periculosissimus. Ex tempestatibus verò optimae aequales sunt, siue frigidae, siue calidae: pessima, quae variant maxime. Quò fit, ut Autumnus plurimos opprimat. Nam scè meridianis temporibus calor, nocturnis atq; matutinis simulq; etiam vespertinis frigus est. Corpus ergo & aestate, & subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed ut eo tempore id maximē fit, sic quādocunq; euenit, noxiū est. Vbi equalitas autem est, tamen saluberrimi
sunt

sunt sereni dies, meliores pluuij, quàm tantum Pluuji,
 nebulosi, aut nubili, optimiq; hyeme qui omni Nebulosi,
 vento vacant: æstate quibus Fauonij perflant. Nubili.
 Si genus aliud ventorū est, salubriores Septen-
 trionales, quàm Subsolani, vel Austri sunt. Sic
 tamen, vt hæc interdum regionum sorte muten-
 tentur. Nam ferè ventus vbiq; à mediterraneis
 regionibus veniens salubris, à mari grauis est.
 Neq; solum in bono tempestatum habitu certior
 valetudo est, sed priores morbi quoq; (si qui inci-
 derunt) leuiiores sunt, & promptius finiuntur.
 Pessimū ergo cælum est, quod ægrum fecit, adeo
 vt in id quoq; genus, quod natura peius est in
 hoc statu, salubris mutatio sit. Aetas media tu-
 tissima est, quæ neq; iuuentæ calore, neq; senectū-
 tis frigore infestatur. Longis morbis senectus,
 acutis adolescentia magis patet. Corpus autē ha-
 bilissimum quadratum est, neq; gracile, neq; ob-
 esum. Nam longa statura, vt in iuuenta decora
 est, sic matura senectute conficitur. Gracile cor-
 pus, infirmū: obesum, hebes est. Vere tamē maxi-
 mē quæcunq; humoris motu nouantur, in metu
 esse consuerunt. Ergo tum lippitudines, pustule,
 profusio sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀπο-
 σπύματα Græci nomināt, bilis atra, quæ μελαγ-
 χολία appellāt, insania, morbus comitialis, an-
 gina, grauedines, destillationes oriri solent. Hi
 quoq; morbi qui in articulis, nervisq; modo vr-
 gent, modo quiescunt, tum maximè & inchoan-
 tur & repetunt. At æstas non quidē vacat ple-
 d risq;

Corp^o que
 dratum.

risq; ab his morbis, sed adiicit febres, vel continuas, vel ardentes, vel tertianas, vomitus, alui deiectiones, auricularū dolores, vlcera oris, can-
cros, & in ceteris quidē partibus, sed maxime
obscænis, & quicquid sudore hominem resoluit.
Vix quicquā ex his in autumnum non incidit:

Febres in-
certæ.

sed oriuntur eo quoq; tēpore febres incerta, lienis
dolor, aqua inter cutem, tabes, quā Græci φθίσιν
nominant: vrina difficultas, quam εἰς ὑρῶνα
appellant: tenuioris intestini morbus, quē εἰς ἀσθενίαν
nominant. Fit item lenitas intestinorum, quæ
ἀνεπηρέγια vocatur, coxæ dolores, morbi comi-
tiales. Idemq; tempus & diutinis malis fatiga-
tos, & ab æstate tantum proxima oppressos in-
terimit, & alijs nouis morbis conficit, & quos-
dam longissimis implicat, maximeq; quartanis,
quæ per hyemem quoque exerceant. Neq; aliud
magis tēpus pestilentie patet, cuiuscunq; ea gene-
ris est, quāuis varijs rationibus nocet. Hyems au-
tem capitis dolores, tussim, & quicquid in fau-
cibus, in lateribus, in visceribus mali contrahi-
tur, irritat. Ex tēpestatibus Aquilo tussim mo-
uet, fauces exasperat, ventrē astringit, vrinam
supprimit, horrores excitat, item dolores lateris
& pectoris. Sanū tamen corpus spissat, & mobi-
lius, atq; expeditius reddit. Auster aures hebe-
tat, sensus tardat, capitis dolores mouet, aluum
soluit, totū corpus efficit hebes, humidū, langui-
dum. Ceteri venti quò vel huic vel illi propiores
sunt, eo magis vicinos his illisue affectus faciunt.
Deniq;

Deniq; omnis calor & iecur, & lienem inflam-
 mat: mentem hebetat: ut anima deficiat, ut san-
 guis prorumpat, efficit. Frigus modo nervorum
 distentionē, modo rigorem infert, illud *σπασμὸς*,
 hoc *τέταυ* & Græcè nominatur: nigriciem in
 ulceribus, horrorē in febribus excitat. In sicca-
 tibus acutæ febres, lippitudines, tormina, urinae
 difficultas, articularū dolores oriuntur. Per hym-
 bres longæ febres, alui deiectiones, angina, can-
 cri, morbi comitiales, resolutio nervorum, quam
παγάλυσιν Græci nominant. Neq; solum inter-
 est, quales dies sint, sed etiam quales antè præ-
 cesserint. Si hyems sicca Septentrionales ventos
 habuit, ver autem Austros & pluuias exhibet,
 ferè subeunt lippitudines, tormina, febres, maxi-
 meq; in mollioribus corporibus, ideoq; præcipuè
 in mulieribus. Si verò Austri, pluuiæq; hyemē
 occuparunt, ver autē frigidum et siccum est, gra-
 uida quidem fœminæ, quibus dum adest partus,
 abortu periclitatur. He verò quæ gignunt, imbe-
 cillosq; , vixq; vitales edunt. Ceteros lippitudo
 arida, & si seniores sunt, grauedines, atq; destil-
 lationes malè habet. At si à prima hyeme Au-
 stri ad vltimū ver continuarunt, laterū dolores,
 & insania febricitantiū, quæ *φρενίτις* apellant,
 quàm celerrime rapiunt. Vbi primò calor à pri-
 mo vere orsus, æstatē quoq; similē exhibet, ne-
 cesse est multū sudorē in febribus subsequi. At si
 sicca estas Aquilones habuit, autūno verò hym-
 bres, Austriq; sunt, tota hyeme quæ proxima
 d 2 est

est tussis, deſtillatio, raucitas, in quibusdā etiam
 tabes, oriūtur. Sin autem autumnus quoq; æquē
 ſiccus, iſdem Aquilonibus perflatur, omnibus
 quidē mollioribus corporibus, inter quæ mulie-
 bria eſſe propoſui, ſecunda valetudo contingit.
 Durioribus verò inſtare poſſunt & aride lip-
 pitudines, et febres partim acutæ, partim longæ,
 & hi morbi, qui ex atra bile naſcuntur. Quod
 ad ætates verò pertinet, pueri, proximiq; hiſ, ve-
 re optime valēt, & æſtate prima tutiſſimi ſunt:
 Senes æſtate, & autumnī prima parte: iuuenes
 hyeme, quiq; inter iuventam ſenectutemq; ſunt.
 Inimicior ſenibus hyems, æſtas adoleſcentibus
 eſt. Tum ſi qua imbecillitas oritur, proximū eſt,
 ut infantes, tenerosq; adhuc pueros ſerpentia
 vlcera oris (quæ ἀφθας Græci nominant) vomit-
 tus, nocturna vigilia, aurium humor, circa umbi-
 licum inſtāmationes exerceant. Proprie etiā den-
 tium gingivarum exulcerationes, diſtentiones
 neruorum, febriculæ interdum, alui deiection-
 nes, *maxil-
 læq; *maximeq; caninis dentibus orientibus ma-
 le habent. Quæ pericula pleniſſimi cuiuſq; ſunt,
 & cui maxime venter adſtriſtus eſt. At ubi
 ætas paulum proceſſit, glandula, & vertebrarū
 quæ in ſpina ſunt, aliqua inclinationes: ſtruma,
 verrucarum quedam genera dolentia (ἀνθροξέ-
 doves Græci appellant) & plura alia tubercu-
 la oriuntur. Incipiente verò iam pube, ex iſdem
 multæ & longæ febres, ſanguinis ex naribus
 curſus. Maximeq; omnis pueritia primum circa
 quadrag

quadragesimum diem, deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infantem inciderunt, ac neq; pubertate, neque primis coitibus, neq; in scemina primis menstruis finita sunt, fere longa sunt. Sæpius tamen morbi pueriles, qui diutius manserunt, terminantur. Adolescentia morbis acutis, item comitialibus, tabiq; maxime obiecta est, fereq; iuvenes sunt, qui sanguinem expuunt. Post hanc ætatem laterum & pulmonis dolores, lethargus, cholera, insania, sanguinis per quædam etiam velut ora venarum (αἱμορροΐδας Græci appellant) profusio. In senectute spiritus & urine difficultas, grauedo articulorum, & renum dolores, nervorum resolutiones, malus corporis habitus (ναρξία Græci appellant) nocturnæ vigiliæ, vitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, præcipueq; soluta alius, & quæ sequuntur hanc tormina, vel leuitas intestinorum, ceteraq; fusi ventris mala. Præter hæc graciles, tabes, deiectiones, destillationes. Item viscerum & laterum dolores fatigant. Obesi plerunq; acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subitoq; sæpe moriuntur. Quod in corpore tenuiore vix euenit.

De signis aduersæ valetudinis futuræ.

*notis.

C A P. II.

ANte aduersam autem valetudinem (vt supra dixi) quædam notæ oriuntur, quarum omnium cōmune est, aliter se corpus habere, atq;

d 3

consue

consuevit, neq; in peius tantū, sed etiam in me-
lius. Ergo si plenior aliquis, et speciosior, & co-
loratior factus est, suspecta habere bona sua de-
bet. Quæ quia neq; in eodem habitu subsistere,
neq; ultra progredi possunt, serè retro, quasi rui-
na quadam, reuoluuntur. Peius tamen signum
est, ubi aliquis contra consuetudinem emacruit,
& colorem decorēq; amisit, quoniam in his quæ
superant, est quod morbus demat: in his quæ de-
sunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter
hæc protinus timeri debet, si grauiora membra
sunt, si crebra vlcera oriuntur, si corpus supra
cōsuetudinem incaluit, si grauior somnus pressit,
si tumultuosa somnia fuerunt, si sæpius expergi-
scitur aliquis, quàm assuevit, deinde iterum soporatur,
si corpus dormientis circa partes aliquas
contra consuetudinem insudat, maximeq; circa
pectus, aut ceruices, aut crura, vel genua, vel co-
xas. Item si marcet animus, si loqui & moueri
piget, si corpus torpet, si dolor præcordiorum est,
* alias, aut totius pectoris, * aut, qui in plurimis euenit,
aut i plu- capitis: si saluæ plenum est os, si oculi cum dolo-
rimus re- re vertuntur, si tempora astricta sunt, si membra
nis capitis inhorrescunt, si spiritus grauior est, si circa fron-
tem intentæ venæ mouentur, si frequentes osci-
tationes, si genua quasi fatigata sunt, totum ve
corpus lassitudinē sentit. Ex quibus sæpe plura,
nunquam nō aliqua, febrem antecedunt. In pri-
mis tamen illud considerandum est, nunquid sæ-
pius horum aliquid eueniat, ac ideo neque cor-
poris

poris vlla difficultas subsequatur. Sunt enim quedam proprietates hominum, sine quarum notitia non facile quicquam in futurum presagiri potest. Facile itaq; securus est in his aliquis, quæ sæpe sine periculo euasit. Ille sollicitari debet, cui hæc noua sunt, aut qui ista nunquam sine custodia sui tuta habuit.

Quæ bona in ægrotantibus signa sint.

C A P. III.

VBi verò febris aliquem occupat, scire licet non periclitari, si in latus aut dextrum, aut sinistrum, ut ipsi visum est, cubat, cruribus paulum reductis: qui ferè sani quoq; iacentis habitus est: si facile conuertitur, si noctu dormit, si interdum vigilat, si ex facili spirat, si non conflatur, si circa vmbilicum & pubem cutis plana est: si præcordia eius sine vlllo sensu doloris æqualiter mollia in vtraque parte sunt: quod si paulò tumidiora sunt, sed tamè digitis cedunt, & non dolent, hæc valetudo, ut spatium aliquod habebit, sic tuta erit. Corpus quoque quod æqualiter molle & calidum est, quodq; æqualiter totum insudat, & cuius febricula eo sudore finitur, securitatem pollicetur, quando iam ad sanitatē venit corpus. Sternutamentum etiam inter bona indicia est: et cupiditas cibi, vel à primo seruata, vel etiam post fastidium orta. Neq; terrere debet ea febris, quæ eodè die finita est: ac ne ea quidem, quæ quamuis longiore tempore euauit, tamen ante alteram accessionem ex toto quieuit,

d 4 sic vñ

sic ut corpus integrum quod εἰληκνὲς Græci vocant, fieret. Si quis autem incidit vomitus, mixtus esse ex bile & pituita debet, & in urina subsidere album, leue, æquale, sic ut etiam si quæ quasi nubecula innatarint, in immum deferantur. At venter ei qui à periculo tutus est, reddit modò mollia, figurata eodem ferè tempore, quo secunda valetudine: assuevit modò cōuenientia his quæ assumuntur. Peior cita aluius est. Sed ne hæc quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, et ruffa est, neq; fæditate odoris similem aluum sani hominis excedit. Ac lumbricos quoq; aliquos sub fine morbi descendisse, nihil nocet. Si inflammatio in superioribus partibus dolorem tumoremq; fecit, bonum signum est. Sonus ventris inde ad inferiores partes euolutus, magisq; etiam si sine difficultate cum stercore excessit.

Mala signa ægrotantium.

CAP. IIII.

Contra grauis morbi periculum est, ubi supinus ager iacet, porrectis manibus & eruribus, ubi residere vult, in ipso acuti morbi impetu, præcipueq; pulmonibus laborantibus. Vbi nocturna vigilia premitur, etiam si interdiu somnus accedit. Ex quo tamen peior est, qui inter quartam horam & noctem, quàm qui matutino tempore ad quartam. Pessimum tamen est, si somnus neq; noctu, neq; interdiu accedit: id enim ferè sine continuo dolore esse non potest.

Aequè

Aequè verò signū malum est, etiam somno ultra debitum vrgeri, peiusq; quo magis se sopor interdiu, noctuq; continuat. Mali etiam morbi testimonium est, vehementer & crebro spirare, à sexto die cœpisse inhorrescere, pus expuere, vix excreare, dolorem habere continuum, difficulter ferre morbum, iactare brachia & crura, sine voluntate lacrymare, habere humorem glutinosum dentibus inhaerentem, cutem circa umbilicum & pubem macram, præcordia inflammata, dolentia, dura, tumida, intenta: magisq; si hæc dextra parte, quàm sinistra sunt: periculosissimum tamen est, si venæ quoq; ibi vehementer agitantur. Mali etiam morbi signum est, nimis celeriter emacrescere, caput, & pedes, manusq; calidas habere, ventre & lateribus frigentibus, aut frigidas extremas partes acuto morbo vrgente, aut post sudorem inhorrescere, aut post vomitum singultum esse, vel rubere oculos, aut post cupiditatem cibi, post'ue longas febres hunc fastidire, aut multum sudare, maximeq; frigido sudore: aut habere sudores non per totum corpus æquales, quiq; febrem non finiant, & eas febres quæ quotidie tempore eodem reuertantur, quæ'ue semper pares accessiones habeant, neq; tertio quoq; die leuentur, quæ'ue cōtinuent,* vel per accessiones increscant, per dis-
*ve
cessiones tantum molliantur, nec vnquam integrum corpus dimittant. Pessimum est, si ne leuatur quidem febris, sed æquè concitata conti-
d s nuat.

nuat. Periculosum est etiā post arquatum mor-
bum febrē oriri, utiq; si præcordia dextra parte
dura manserunt, ac dolentibus his læua. Nulla
acuta febris leuiter terrere eos debet: neq; vnquā
in acuta febre, vt à somno, non est terribilis ner-
uorum distentio. Timere etiam ex somno, mali
morbi est. Itemq; in prima febre protinus men-
tem esse turbatam, membrum' ve aliquod esse re-
solutum. Ex quo casu quāuis vita redditur, ta-
men id ferē membrū debilitatur. Vomitus etiam
periculosus est syncera pituita, vel bilis, peiorq;
vrina. si viridis, aut niger est. At mala vrina est, in
qua subsidunt subrubra, aut liuida: deterior, in
qua quasi fila quædam tenuia, atq; alba: pessima
ex his, si tanquam ex fursuribus factas nube-
culis representat: diluta quoq; atq; alba vitiosa
est, sed in phreneticis maxime. Aluus autē mala
est ex toto suppressa. Periculosa etiā quæ inter
febres fluens, conuiuiscere hominem in cubili
non patitur: utiq; si quod descendit est perliqui-
dum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans.
Præter hæc periculum ostendit id quod excerni-
tur, si est exiguum, glutinosum, leue, album, idēq;
subpallidum, vel si est aut liuidum, aut biliosum,
aut cruentum, aut peioris odoris, quā ex con-
suetudine. Malum est etiam, quod post longas
febres syncerum est.

De signis longæ valetudinis. CAP. V.

Post hæc indicia, notū est longum morbum
feri. Sic enim necesse est, nisi occidit. Neq;
vlla

Nulla alia spes in malis magnis est, quam ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat, porrigaturq; in id tempus, quod curationi locum praestet. Protinus tamen signa quaedam sunt, ex quibus colligere possumus morbum, & si non interemerit, longius tamen tempus habiturum. Vbi frigidus sudor inter febres non acutas circa caput tantum, et ceruices oritur: aut vbi febre non quiescente corpus insudat: aut vbi corpus modò frigidum, modò calidum est, & color alius ex alio fit: aut vbi quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatem non peruenit: aut vbi eger pro spatio parum emacrescit. Item si vrina modò liquida & pura est, modò habet quaedam subsidentia, si leuia, atq; alba, rubra' ve sunt, quae in ea subsidunt, aut si quasdam quasi maculas representat, aut si bullulas excitat.

Vrina,

De indicijs mortis.

CAP VI.

Sed inter hac quidē proposito metu spes tamen superest. Ad vltima verò iam ventum esse testantur, nares acuta, collapsa tempora, oculi concaui, frigida & languidaq; aures, & in his partibus leniter versa, cutis circa frontem dura et intenta, color aut niger, aut perpallidus, multoq; magis si ita haec sunt, ut neq; vigilia praecesserit, neq; ventris resolutio, neq; inedia. Ex quibus causis interdum haec species oritur, sed vno die finitur. Itaq; diutius durans mortis index est. Si verò in morbo vetere iam triduo talis est, in propinquo mors est: magisq; si praeter

haec

Habes de his indicijs Hippocratem ipsum in primo Prognosticon, vnde haec auror defumpfit, ut aliam multa in hoc fecudo libro.

hæc oculi quoq; lumē refugiunt, & illacrymant,
 quæq; in ijs alba esse debent, rubescunt, atq; in
 hisdem venulæ pallent, pituitaq; in ijs innatans
 nouissimè angulis inhærescit, alterq; ex his mi-
 nor est, hiq; aut vehementer subsederunt, aut fa-
 cti tumidiore sunt: perq; somnum palpebræ non
 committuntur, sed inter has ex albo oculorum
 aliquid apparet: neq; id fluens alius expressit:
 eademq; palpebræ pallent, & idem pallor labra
 & nares decolorat. Eademq; labra & nares
 oculiq; & palpebræ & supercilia, aliqua've
 ex his peruertuntur, isq; propter imbecillitatem
 iam non audit, aut non videt: eadem mors de-
 nuntiatur, vbi ager supinus cubat, eiq; genua
 contracta sunt. Vbi deorsum ad pedes subinde
 delabitur. Vbi brachia & crura nudat, & in-
 æquabiliter dispergit, neq; his calor subest. Vbi
 hiat, vbi assidue dormit: vbi is qui mentis suæ
 non est, neq; id facere sanus solet, dentibus stri-
 det. Vbi vlcus quod aut antè, aut in ipso mor-
 bo natum est, aridum, & aut pallidum, aut li-
 uidum factum est. Illa quoq; mortis indicia sunt,
 vngues, digitiq; pallidi, frigidus spiritus, aut si
 manibus quis in febre & acuto morbo vel in-
 sania, pulmonis've dolore, vel capitis, in veste
 floccos legit, fimbrias've diducit, vel in adiun-
 cto pariete, si qua minuta eminent, carpit. Do-
 lores etiam circa coxas & inferiores partes or-
 ti, si ad viscera transierunt, subitoq; desierunt,
 mortem subesse testantur, magisq; si alia quoq;
 signa

signa accesserunt. Neq; is seruari potest, qui sine* ullo tremore febricitans, subito strangulatur, * alij, tur. aut deuorare saliuam suam non potest. Cui' ve in more. alij, eodem febris corporisq; habitu ceruix conuertitur, sic vt deuorare aequè nihil possit. Aut cui simul & continua febris, & vltima corporis infirmitas est: aut cui febre non quiescente, exterior pars friget, interior sic calet, vt etiam sitim faciat: aut qui febre aequè non quiescente simul & delirio, et spirandi difficultate vexatur: aut qui epoto veratro exceptus distentione nervorum est: aut qui ebrius obmutuit. Is enim febre, adiecta nervorum distentione consumitur, nisi aut febris* accessit, aut eo tempore, quo ebrietas * abscessit solui debet, loqui coepit. Mulier quoq; grauida, acuto morbo facile consumitur: & is cui somnus dolorem auget, & cui protinus in recenti morbo bilis atra vel infra, vel supra se ostendit, cui' ve alterutrum modo se prompsit, cū iam longo morbo corpus eius esset extenuatum & affectum. Sputum etiam biliosum & purulentum, siue separatim ista, siue mixta proueniunt, interitus periculum ostendunt. Ac si circa septimum diem tale esse coepit, proximum est, vt is circa quartumdecimum diem decedat, nisi alia signa meliora, peiora' ve accesserint: quæ quo leuiores, grauiora' ve subsēcuta sunt, eò vel seriores mortem, vel maturiorem denuntiant. Sudor quoq; frigidus in acuta febre pestiferus est, atq; in omni morbo vomitus, qui varius, & multorum colorum

* In magna cruditate, subaudiendū est morbi. Sic in Prognosis Hippocra. lib. 2. Vrina quoad ruffa tenuisq; appa-ruerit, crudum morbum signi-
ficat.

colorum est, præcipueq; si malus in hoc odor est. Ac sanguinem quoq; in febre vomuisse, pestiferum est. Vrina verò rubra, & tenuis in magna cruditate esse consuevit, & sæpe antequam spatium maturescat, hominem rapit. Itaq; si talis diutius permanet, periculum mortis ostendit. Pestissima tamē est, præcipueq; mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Atq; in viris quidem & mulieribus talis deterrima est. In pueris verò quæ tenuis & diluta est. Aluus quoq; varia pestifera est, quæ strigmentū, sanguinem, bilem viridem, aliquid modò diuersis temporibus, modò simul, & in mistura quadam, discreta tamen repræsentat. Sed hæc quidem potest paulo diutius trahere. In præcipiti verò iam esse denunciat quæ liquida, eademq; vel nigra, vel pallida, vel pinguis est, utiq; si magna foeditis odoris accessit. Illud interrogari me posse ab aliquo scio: Si certa futuræ mortis indicia sunt, quomodo interdum deserti à medicis conualescant, quosdamq; fama prodiderit in ipsis funeribus reuixisse? quinetiā vir iure magni nominis Democritus, ne finitæ quidem vitæ satis certas notas esse proposuit, quibus medici credidissent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua signa futuræ mortis essent. Aduersus quos ne illud quidem dicam, quòd in vicino sæpe quædam notæ positæ, non bonos, sed imperitos medicos decipiunt. quod Asclepiades funeri obuius intellexit, eum viuere, qui efferebatur, ne protinus crimen artis esset, si quod professoris

fessoris sit. Illa tamē moderatius subijciam: Con-
iecturalem artem esse medicinam, rationemq; Medicinæ
certitudo.
coniecturæ talem esse, ut cum sæpius aliquando
responderit, interdum tamen fallat nos. Si quid
itaq; vix in millesimo corpore aliquando deci-
pit, id notam non habet, cum per innumerabiles
homines respondeat. Idq; non in his tantum, quæ
pestifera sunt, dico: sed in his quoq; quæ saluta-
ria. Siquidem etiam spes interdum frustratur,
& moritur aliquis, de quo medicus securus pri-
mò fuit. Quæq; medendi causæ reperta sunt, non-
nunquam in peius aliquid conuertunt. Neq; id
evitare humana imbecillitas in tanta varietate
corporum potest. Sed est tamen medicinæ fides,
quæ multo sæpius, perq; multo plures egros pro-
dest. Neq; tamē ignorare oportet, in acutis mor-
bis fallaces magis notas esse, et salutis et mortis.

De notis, quas aliquis in singulis morborum
generibus habere possit. CAP. VII.

Sed cum proposuerim signa quæ in omni ad-
uersa valetudine communia esse consueue-
runt, ea quoq; transibo, ut quas aliquis in singu-
lis morborum generibus habere possit notas,
indicem. Quædam autem sunt, quæ antefebres,
quædam quæ inter eas, quid aut intus sit, aut
venturum sit, ostendunt. Antefebres, si caput
graue est, aut ex somno oculi caligant, aut fre-
quentia sternutamenta sunt, circa caput aliquis
pituitæ & ipetus timeri potest. Si sanguis aut calor
abundat,

abundat, proximum est, ut aliqua parte proflu-
uium sanguinis fiat. Si sine causa quis emacre-
scit, ne in malum habitum corpus eius recidat,
metus est. Si præcordia dolent, aut inflammatio
gravis est, aut non toto die concocta fertur vri-
na, cruditatem esse manifestum est. Quibus diu
color sine morbo regio malus est, hi vel capitis
doloribus conflictantur, vel terram edunt. Qui
diu habent faciem pallidam, & tumidam, aut
capite, aut visceribus, aut aluo laborant. Si in
continua febre puero venter nihil reddit, muta-
turq; ei color, nec somnus accedit, ploratq; is as-
sidue, metuenda nervorum distentio est. Frequens
autem destillatio in corpore tenui longoq; tabem
timendam esse testatur. Vbi pluribus diebus non
descendit aluus, docet aut subitam deiectionem,
aut febriculam instare. Vbi pedes turgent, longæ
deiectiones sunt. Vbi dolor in imo ventre & in
coxis est, aqua inter cutem instat. Sed hoc morbi
genus ab ilibus oriri solet. Idem propositum pe-
riculum est his, quibus voluntas desidendi est,
venter nihil reddit, nisi & ægrè & durum, tu-
mor in pedibus est, idemq; modo dextra, modo
sinistra parte ventris inuicem oritur atq; finitur:
sed à iocinere id malū proficisci videtur. Eiusdē
morbi nota est, vbi circa umbilicum intestina
torquentur (σχοφῶν Græci nominant) coxæq; do-
lores manent, eaq; neq; tempore, neq; remedijs
soluuntur. Dolor autem articulorū, prout in pe-
dibus, manibus' ve, aut alia qualibet parte sic
est,

est, ut eo loco nervi contrahantur, aut si id membrum ex levi causa fatigatum æquè frigido calidoq; offenditur, ποδάγραν χερσάγραν ve, vel eius articuli in quo id sentitur, morbum futurum esse denuntiat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desit, hi vel capitis doloribus conflictentur necesse est, vel in articulis aliquis exulcerationes graues habeant, vel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus fœminis menstrua non proueniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel quælibet alia pars morbo infestetur. Eademq; his pericula sunt, quibus articularum vitia, dolores, tumoresq; sine podagra similibusq; morbis oriuntur & desinunt. Vtique si sæpe tempora ipsæ dolent, noctuq; corpora insudant, frons prurit, lippitudinis metus est. Si mulier à partu vehementes dolores habet, neque alia præterea signa mala sunt circa vigesimum diem, aut sanguis per nares erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicumq; etiam dolorem ingentem circa tempora & frontem habebit, is alterutra ratione eum finiet, magisq; si iuuenis erit, per sanguinis profusionem, si senior, per suppurationem. Febris autem quæ subito sine ratione, sine bonis signis finita est, ferè reuertitur. Cui fauces sanguine & interdum & noctu replentur, sic ut neque capitis dolores, neque præcordiorum, neq; tussis, neque vomitus, neque febricula præcesserit, huius aut in naribus, aut in faucibus vlcus

e reper

reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est, neque caussa apparet, vlcus in vulua est.

Vrina. *Vrina autem crassa, ex qua quod desidet album est, significat circa articulos, aut circa viscera dolorem, metumq; morbi esse. Eadem viridis aut viscerum dolorem tumoremq; cum aliquo periculo subesse, aut certe corpus integrum non esse testatur. At si sanguis aut pus in vrina est, vel vesica, vel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa carunculas quasdam exiguas quasi capillos habet, aut si bullat, & male olet, & interdum quasi harenam, interdum quasi sanguinem trahit, dolent autem coxæ, quæq; inter has, superq; pubem sunt, & accedunt frequentes ructus, interdum uomitus biliosus, extremæq; partes frigescent, vrinæ crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est aquæ simile, vel ruffum, vel pallidum est, paulum tamen in eo leuamenti est, alius vero cum multo spiritu redditur, utiq; in renibus vitium est. Aut si paulatim destillat, vel si sanguis per hanc editur, & in eo quadam cruenta concreta sunt, idq; ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eadem*

Calculosi. *vesica vitium est. Calculosi verò his indicijis cognoscuntur: Difficulter vrina redditur, paulatimq; interdum etiam sine voluntate destillat. Eadem harenosa est, nonnunquam aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamq; quidam promptius recti, quidam*

quidam resupinati, maximeq; hi qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemq; extendendo, dolorem leuant. Gravitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est, atque ea cursu omniq; motu augmentur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis vicibus implicant. Fœminæ verò oras naturalium suorū manibus admotis scabere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admoverunt, ubi vesicæ cervicem is vrget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone vitium est. Mulieri gravida sine modo fusa alui elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est quod intus gerit. Durae mammae sanū illud esse testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus, iecur inflammatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idq; à tergo incidit, vel distentio nervorum vel rigor timeri potest. At si à priore parte id evenit, vel lateris acutus dolor, vel insania expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur. Si ora venarum, sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur. Eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari non potuit. At si longa tristitia cum longo timore & vigilia est, atre bilis morbus subest. Quibus sepe ex naribus fluit sanguis, his

aut lientumet, aut capitis dolores sunt, quos sequitur, aut quedam ante oculos tanquam imagines obuersentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivæ malæ sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit. Quorum si nihil euenit, necesse est in cruribus mala vlcera, & ex his nigra cicatrices fiant. Quibus causa doloris, neque sensus eius est, his mens labat. Si in ventrem sanguis confluxit, ibi in pus vertitur. Si à coxis, & ab inferioribus partibus dolor in pettus transit, neq; vllum signum malum accessit, suppurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua ex parte dolor, aut prurigo cum rubore, aut calore est, ibi aliquid suppurat. *Urina.* Urina quoque quæ in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denuntiat. Hæc verò cum sine febre quoque vel latentium, vel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, vbi febris accessit, atq; etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est, vbi expeditior alicuius, quàm sani fuit, sermo est: subitaq; loquacitas orta est, & hæc ipsa solito audacior: aut vbi raro quis & vehemèter spirat, venasq; concitatus habet, præcordijs duris & tumentibus. Oculorum quoq; frequens motus, & in capitis dolore offusæ oculis tenebræ, vel nullo dolore substante somnus ereptus, continuataq; nocte & die vigilia, vel prostratum contra consuetudinem corpus in ventrem, sic, vt ipsius alui dolor.

lor id non coëgerit : item robusto adhuc corpore insolitus dentium stridor insaniæ signa sunt. Siquid etiam abscessit, & antequam suppuraret, manente adhuc corpore insolita febre subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus. Auris quoque dolor acutus, cum febre continua, vehementiq; sæpe mentem turbat, & ex eo casu iuniores interdum intra septimum diem moriuntur, seniores tardius : quoniam neq; æquè magnas febres experiuntur, neque æquè insaniunt, ita sustinent, dum is affectus intus versatur. Suffusæ quoque sanguine mulieris mammae, furorem venturum esse testantur. Quibus autem longæ febres sunt, his abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat his nervorum distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit, idq; sæpe intra septimum diem occidit. Quod nisi incidat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde post alui longam resolutionem, tormina : Post hæc intestinorum leuitas oritur. Post nimias destillationes, tabes. Post lateris dolores, vitia pulmonum, post hæc, insania. Post magnos feruores corporis, nervorum rigor aut distentio. Vbi caput vulneratum est, delirium. Vbi vigilia torsit, nervorum distentio. Vbi vehementer venæ supra vlcera mouentur, sanguinis profluvium erit. Suppuratio verò pluribus morbis excitatur. Nam si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent, in ali-

quam partem id malum incumbit, in iunioribus tantum: in senioribus ex eiusmodi morbo quartana ferè nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura dolentia ante vigesimum diem hominem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeq; in adolescentibus: utique si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt, sed cum in inferioribus partibus aliquid abscedit. At si præcordia tumorem mollem habent, neq; habere intra sexaginta dies desinunt, hæretq; per omne id tempus febris, tum in superioribus partibus fit abscessus: ac, si inter ipsa ulcera non fluit, circa aures erumpit. Cumq; omnis longus tumor ad suppurationem

* aliàs, ferè spectet, * magis eò tendit is, qui in præcordiis se dijs, quàm is, qui infra est. Si lassitudinis etiam tendit sensus in febre est, vel in maxillis, vel in articulis, aliquid abscedit. Interdum quoque urina tenuis et cruda, sic diu fertur, ut alia salutaria signa sint, ex q; eo casu, plerunque infra transversum septum (quod διαφραγμα Græci vocant) fit abscessus. Dolor autem pulmonis, si neque per sputa, neque per cucurbitulas, neque per sanguinis detractionem, neque per victus rationem fit

* intus nitus est, vomicas aliquas * interdum excitat, exci. aut circa vigesimum diem, aut circa * quadragessimum, nonnunquam etiam circa sexagesimum. Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gravitatem eius partis sensit. Sed hæ vomicæ modò
à pulm

à pulmone, modò à contraria parte nascuntur. Quod suppurat ab ea parte, quam afficit, dolorem, inflammationemq; concitat, ipsum calidius est: & si in partē suam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo videtur. Omnis etiam suppuratio, quæ nondum oculis patet, sic apprehendi potest: Si febris non dimittit, eaq; interdum lenior est, noctu increscit, multus sudor oritur, cupiditas tussendi est, & penè nihil in tussi excreatur, oculi cavi sunt, malæ rubent, venæ sub lingua inalbescunt, in manibus sunt adunci ungues, digiti, maximeq; summi* pallēt, in pedibus *calens tumores sunt, spiritus difficiliter trahitur, cibi fastidium est, pustulæ toto corpore oriuntur. Quòd si protinus initio dolor, & tussis fuit, & spiritus difficultas, vomica vel ante, vel circa vigesimum diem erumpet. Si serius ista cœperint, necesse est quidem increcant, sed quò minus cito affecerint, eò tardius soluentur. Solent etiam in graui morbo pedes cum digitis vnguib; nigrescere. Quòd si non est mors consecuta, & reliquum corpus inualuit, pedes tamen decidunt.

Quæ notæ in quoque morbi genere, vel spem, vel pericula ostendant. CAP. VIII.

Sequitur, ut in quoq; morbi genere proprias notas explicem, quæ vel spem, uel periculum ostendant. Ex vesica dolente, si purulenta vrina Vrina. processit, inq; ea leue & album subsedit, metum detrahit. In pulmonis morbo, si sputo ipse leua-

tur dolor, quamuis id purulentum est, tamen eger facile spirat, facile excreat, morbum ipsum non difficulter fert, potest ei secunda valetudo contingere. Neq; inter initia terreri conuenit, si protinus sputum mistum est ruffo quodam & sanguine, dummodo statim edatur. Laterum dolores suppuratione facta, deinde intra quadragesimum diem purgata, finiuntur. Si in iocinore vomica est, & ex ea fertur pus purum & album, salus ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex suppurationibus verò, hæ tolerabiles sunt, quæ in exteriorem partem feruntur & acuuntur. Et ex his quæ intus procedunt, hæ leuiiores, quæ contra se cutem non afficiunt, eamq; & sine dolore esse, & eiusdem coloris, cuius reliquæ partes sunt, sinunt esse. Pus quoq; quacunq; parte erumpit, si est leue, album, & vnius coloris, sine vlllo metu est, & quo effuso, febris protinus conquieuit, desieruntq; vrgere cibi fastidium, & potionis desiderium: si quando etiam suppuratio descendit in crura, sputumq; eiusdem factum pro ruffo purulentum est, periculi minus est. At in tabe eius qui saluus futurus est, sputum esse debet album, æquale totum, eiusdemq; coloris, sine pituita, eiq; etiam simile esse oportet si quid in nares à capite destillat. Longe optimum est febrem omnino non esse: secundum est, tantulum esse, vt neq; cibum impediat, neq; crebram sitim faciat. Alius in hac valetudine ea tuta est, quæ quotidie coacta, eaq; conuenientia his, quæ assumuntur,

Sputi iudicatio.

tur, reddit. Corpus id, quod minimè tenue, ma-
 ximeq; lati pectoris atque setosi est, cuiusq;
 cartilago exigua, & carnosæ est. Super tabem Alui iudi-
 si mulieri quoque suppressa menstrua fuerunt, catio.
 & circa pectus atque scapulas dolor mansit,
 subitoq; sanguis erupit, leuari morbus solet. Nam
 & tussis minuitur, & sitis atque febriculæ desi-
 nunt. Sed ipsædem ferè, nisi redit sanguis, vomica
 erumpit, quæ quo cruentior, eo melior est. Aqua
 autem inter cutem minime terribilis est, quæ nul-
 lo antecedente morbo cæpit, deinde quæ longo
 morbo superuenit. Vtique si firma viscera sunt,
 si spiritus facilis, si nullus dolor, si sine calore
 corpus est, æqualiterq; in extremis partibus
 macrum est, si venter mollis, si nulla tussis, nul-
 la sitis, si lingua ne per somnum quidem inare-
 scit, si cibi cupiditas est, si venter medicamen-
 tis mouetur, si per se excernit mollia, & figura-
 ta, si extenuatur, si vrina & vini mutatione,
 & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si
 corpus sine lassitudine est, & morbum facile
 sustinet. Siquidem in quo omnia hæc sunt, is ex
 toto tutus est: in quo plura ex his sunt, is in
 bona spe est. Articulorum verò vitia, ut poda-
 græ, chiragræq;, si iuuenes tentarunt, neque
 callum induxerunt, solui possunt, maximeq; tor-
 minibus leniuntur, & ex quocunq; modo ven-
 ter fluit. Item morbus comitialis ante puberta-
 tem ortus, non agre finitur, & in quo ab una
 parte corporis venientis accessionis sensus inci-
 pit,

pit, optimum est à manibus pedibus'ue initium fieri, deinde à lateribus, pessimum inter hæc à capite. Atque in his quoque ea maxime pro-
 Deiectio
 sine vlla
 noxa est. sunt, quæ per deiectiones excernuntur. Ipsa au-
 tem deiectio sine vlla noxa est, quæ sine febre est, si celeriter desinit, si contracto ventre nullus motus eius sentitur, si extremam aluum spiritus sequitur. Acrida tormina quidem periculosa non sunt, si sanguis & strigmenta descendunt, dum
 *adsint febris cetera q; accessiones huius morbi * absint, adeo ut etiam gravida mulier non solum reseruari possit, sed etiam partum reservare. Prodest q; in hoc morbo, si iam ætate aliquis processit. Contrà intestinorum leuitas facilius à teneris ætatibus depellitur, utique si fieri vrina & ali cibo corpus incipit. Eadem ætas prodest & in coxæ dolore, & humerorum, & in omni resolutione nervorum. Ex quibus coxa si sine torpore est, si leuiter friget, quamvis magnos dolores habet, tamen & facile & mature sanatur, resolutumq; membrum, si nihilominus aliter fieri sanum potest, oris resolutio etiam, aluo cita finitur. Omnisq; deiectio lippienti prodest. At varix ortus, vel per ora venarum subita profusio sanguinis, vel tormina, insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas vel manus tendunt, vomitu atra bilis solvuntur. Et quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones supprimit vomitus. Mulier sanguinẽ vomens profusa

fusis menſtruis liberatur. Quæ menſtruis non
 purgatur, ſi ſanguinem ex naribus fudit, omni
 periculo vacat. Quæ locis laborat, aut difficulter
 partum edit, ſternutamento leuatur. Aëſtiua
 quartana ferè breuis eſt. Cui calor & tremor eſt,
 ſaluti delirium eſt. Lienofis bono tormina ſunt.
 Deniq; ipſa febris (quod maxime mirum videri
 poteſt) ſæpè præſidio eſt. Nam & præcordio-
 rum dolores, ſi ſine inflammatione ſunt, finit,
 & in iocineris dolore ſuccurrit, & neruorum
 diſtentionem rigoremq; (ſi poſtea cæpit) ex
 toto tollit, & ex difficultate vrinæ morbum
 tenuioris inteſtini ortum, ſi vrinam per calorem
 mouet, leuat. At dolores capitis, quibus oculo-
 rum caligo, & rubor cum quadam frontis pru-
 rigine accedunt, ſanguinis profuſione, vel fortui-
 ta, vel etiam petita ſummouentur. Si capitis ac
 frontis dolores ex vento, vel frigore, aut æſtu
 ſunt, grauedine & ſternutamentis finiuntur. Fe-
 brem autem ardentem (quam Græci* *ναυσόδιον* *ναύσο-*
vocant) ſubitus horror exoluit. Si in febre au- *va*
 res obtuſæ ſunt, ſi ſanguis è naribus fluxit, aut
 venter reſolutus eſt, illud malum deſinit ex to-
 to. Nihil plus aduerſus ſurditatem, quàm bilioſa
 alius poteſt. Quibus in fiſtula urinae vti minu-
 ti* abſceſſus (quos *θύματα* Græci vocant) eſſe *apices
 cæperunt, ijs vbi pus ea parte profluxit, ſanitas
 redditur. Ex quibus cum pleraq; per ſe proue-
 niant, ſcire licet inter ea quoque, quæ ars adhi-
 bet, naturam plurimum poſſe. Contra, ſi caput fe-
 bra

bre continenti dolet, neque quicquam reddit, malum atque mortiferum est: maximeq; id periculum est pueris à septimo anno ad quartumdecimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus non fuit, deinde à septimo die coepit, & ultra septimum mansit, periculosum est. Quantoq; magis mistos, neque inter se diductos colores habet, tanto deterius. Et tamen nihil peius est, quam syncerum id edi, siue ruffum est, siue cruentum, siue album, siue glutinosum, siue pallidum, siue spumans: nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo periculosa sunt tussis, destillatio, etiam (quod aliàs salutare habetur) sternutamentum. Periculosissimum est, si hæc secuta subita deiectio est. Ferè verò quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, & mitiora signa, & asperiora esse consueverunt. Ex iocino-
re si pus cruentum exit, mortiferum est. At ex suppurationibus hæc pessimæ sunt quæ intus tendunt, sic ut exteriorem quoq; cutem decolorent. Ex his deinde, quæ in exteriorem partem prorumpunt, quæ maximæ, quæq; planissimæ sunt. Quod si ne rupta quidem vomica, vel pure extrinsecus emissio febris quieuit, aut quavis quieverit, tamen repetit. Item si sitis est, si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus est liuidum, & pallidum, si nihil æger excreat nisi pituitam spumantem, periculum certum est. Atq; ex his quidem suppurationibus, quæ pulmonis morbi concitarunt, ferè senes moriuntur: ex cæteris iuniores.

res. At in tabe sputum mixtum purulentum, febris assidua, quæ & cibi tempora eripit, & siti affligit, in corpore tenui periculum subesse testatur. Si quis etiâ in eo morbo diutius traxit, ubi capilli fluunt, ubi urina quædam araneis similia Urina subsidencia ostendit, atq; in his odor fædus est, maximeq; ubi post hæc orta deiectio est, protinus moritur. Utique si tempus autumnus est, quo ferè, qui cetera parte anni traxerunt, resolvuntur. Item pus expuisse in hoc morbo, deinde ex toto spueri desisse, mortiferum est. Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo vomica, fistulaq; oriri, quæ non facile sanescunt, nisi si multa signa bonæ valetudinis subsecuta sunt. Ex reliquis verò minime facile sanantur virgines, aut hæ mulieres, quibus super tabem menstrua suppressa sunt. Cui verò sano subitus dolor capitis ortus est, dein somnus oppressit, sic ut stertat, neque expergiscatur, intra septimum diem perendum est: magis si eum alius cita non antecesserit. Si palpebræ dormientis non cœiunt, si album oculorum apparet. Quos tamen ita mors sequitur, si id malum non est febre discussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo cœpit, ad sanitatem raro perducitur, utique si contraria his quæ supra posita sunt subsequuntur, æquè in ea quoque tussis spem tollit. Item si sanguis sursum, deorsumq; erupit, & aqua medium corpus implevit. Quibusdam etiam in hoc morbo tumores oriuntur, deinde desinunt, deinde
tursus

rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt, quam qui supra comprehensi sunt, si attenduntur, sed ferè fiducia secundæ valetudinis opprimuntur. Illud iure aliquis mirabitur, quomodo quedam simul & affligant nostra corpora, & parte aliqua tueantur. Nam siue aqua inter cutem quem impleuit, siue in magno abscessu multum puris coijt, simul id omne effudisse æquè mortiferum est, ac si quis sani corporis vulnere factus exanguis est. Articuli verò qui sic dolent, ut super eos ex callo quedam tubercula, innata sint, nunquam liberantur: quæq; eorum vitia vel in senectute cœperunt, vel in senectutem ab adolescentia peruenerunt, ut aliquando leniri possunt, sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoq; comitialis post annum quintum & vigesimum ortus ægrè curatur: multoq; ægrius is, qui post quadragesimum annum cœpit: adeo ut in ea etate aliquid in natura spei, vix quicquam in medicina sit. In eodem morbo si simul totum corpus afficitur, neque antè in partibus aliquis venientis mali sensus est, sed homo ex improviso concidit, cuiuscunque is etatis est, vix sanescit. Si verò aut mens læsa est, aut nervorum facta resolutio, medicine locus non est. Deiectionibus quoque si febris accessit, si inflammatio iocinoris, aut præcordiorum, aut ventris, si immodica sitis, si longius tempus, si alius varia, si cum dolore est, etiam mortis periculum subest, maximeq; si inter hæc tormenta

mina vetera esse cœperunt. Isq; morbus maxime pueros absorbet vsque ad annum decimum. Cætera ætates facilius sustinent. Mulier quoque grauida eiusmodi casu rapi potest, atque etiam si ipsa conualuit, partum tamen perdit. Quinetiam tormina ab atra bile orsa mortifera sunt, aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra aluus profluxit, aut intestinorum leuitas. Periculosior est, si frequens deiectio est. Si venter omnibus horis & cum somno, & sine hoc profluit. Si similiter noctu & interdiu. Si quod excernitur aut crudum est, aut nigrum, & præter id etiam leue, & mali odoris sit: si sitis vrget, si post potionem vrina non redditur, quod euenit, quia tunc liquor omnis non in vesicam, sed in intestina descendit, si os exulceratur, si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur, si venter est quasi fermentatus, pinguis atque rugosus, si cibi cupiditas non est. Inter quæ cum euidentis mors sit, multo euidentior est, si iam longum quoque id vitium est, maximeq; si etiam in corpore senili est: si verò in tenuiore intestino morbus est, vomitus, singultus, nervorum distentio, delirium, mala sunt. At in morbo arquato durum fieri iecur perniciosissimum est. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt, deinde inuersa sunt, vel in aquam inter cutem, vel in intestinorum leuitatem, vix vlla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris,
nisi

nisi resolutus est, inter septimum diem occidit. Mulier ex partu, si cum febre, vehementibus etiam & assiduus capitis doloribus premitur, in periculo mortis est. Si dolor atque inflammatio est in his partibus, quibus viscera continentur, frequenter spirare signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est, & in ceruices ac scapulas transit, rursusque in caput reuertitur, aut à capite ad ceruices scapulasque peruenit, perniciosus est, nisi vomitam aliquam excitauit, sic ut pus extusceretur, aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit, aut nisi in capite multa prurigo, toto uero corpore pustulae ortae sunt. Aequè magnum malum est, ubi torpor atque prurigo peruagantur, modò per totum caput, modò in parte, aut sensu alicuius ibi quasi frigoris est, eaque ad summam quoque linguam perueniunt. Et cum in iisdem abscessibus auxilium sit, eò difficilior sanitas est, quò minus saepe sub his malis illi subsequuntur. In coxae uero doloribus si vehemens torpor est, frigescentque crura & coxae, aliusque nisi coacta non reddit, idque quod excernitur mucosum est, iamque aetas eius hominis quadagesimum annum excessit, is morbus erit longissimus, minimeque annuus, neque finire poterit, nisi aut uere, aut autumno. Difficilis aequè curatio est, in eadè aetate, ubi humorum dolor, vel ad manus peruenit, vel ad scapulas tendit, torporemque & dolorem creat, neque bilis vomitu lenatur. Quacunque uero parte corp

corporis membrum aliquod resolutum est, si neque mouetur, & emacrescit, in pristinum habitum non reuertitur, eoq; minus, quo vetustius id vitium est, & quo magis in corpore senili est. Omniq; resolutioni nervorum ad medicinam non idonea tempora sunt, hyems, & autumnus: aliquid sperari potest vere & æstate. Isq; morbus mediocris vix sanatur, vehemens sanari non potest. Omnis etiam dolor minus medicinæ patet, qui sursum procedit. Mulieri grauida, si subito mammae emacruerunt, abortus periculum est. Quæ neque peperit, neque grauida est, si lac habet, à menstruis defecta est. Quartana æstiva breuis, autumnalis ferè longa est, maximeq; quæ cæpit hyeme appropinquante. Si sanguis profuxit, deinde secuta est dementia cum distentione nervorum, periculum mortis est. Itemq; si medicamentis purgatum, & adhuc inanem nervorum distentio oppressit, aut si in magno dolore extrema partes frigent. Neque is ad vitam redit, qui ex suspendio, spumante ore detractus est. Aluus nigra, sanguini atro similis repentina, siue cum febre, siue etiam sine hac, perniciosa est.

De morborum curationibus.

CAP. IX.

Cognitis indicijis, quæ nos vel spe consolentur, vel metu terreant, ad curationes morborum transeundum est. Ex his quedam communes sunt, quedam propria. Communes, quæ pluribus morbis opitulantur. Propria, quæ singulis.

f

gulis.

gulis. Antè de communibus dicam. Ex quibus tamen quedam non egros solùm, sed sanos quoque sustinent: quedam in-aduersa tantum valetudine adhibentur. Omne verò auxilium corporis, aut demit aliquam materiam, aut adiicit, aut euocat, aut reprimit, aut refrigerat, aut calefacit, simulq; aut durat, aut mollit. Quedam non vno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrarijs adiuuant. Demitur materia, sanguinis detractione, cucurbitula, deiectione, vomitu, frictione, gestatione, omniq; exercitatione, corporis abstinentia, sudore. De quibus protinus dicam.

De sanguinis detractione per venas. CAP. X.

Sanguinem incisa vena mitti, nouum non est: sed nullum penè morbum esse, in quo non mittatur, nouum est. Item mitti iunioribus, & fœminis vterum non gerentibus, vetus est. In pueris verò idem experiri, & in senioribus, & in grauidis quoque mulieribus, vetus non est: siquidem antiqui, primâ vltimamq; etatem sustinere non posse hoc auxilij genus indicabât, persuaferantq; sibi mulierem grauidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturam. Postea verò vsus ostendit, nihil ex his esse perpetuū, aliasq; potiores obseruationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim non quæ atas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ vires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est, aut si mulier, quæ grauida non est, pa-
rum

rum valet, malè sanguis emittitur. Emoritur enim vis, si quæ his supererat, & hoc modo excepta est. At firmus puer, & robustus senex, & grauida mulier valens, tutò curantur. Maxime tamen in his medicus imperitus falli potest, quia ferè minus roboris illis ætatibus subest. Mulieriq; pregnantæ post curationem quoque viribus opus est, non tantum ad se, sed etiam ad partum sustinendum. Non quicquid aut intentione animi, aut prudetiam exigit, protinus faciendum est, cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret, neque conceptionem solam videat, sed vires æstimet, & ex eo colligat, possit nec ne superesse, quod vel puerum, vel senem, vel in vna muliere duo corpora simul sustineat. Inter est enim inter valens corpus, & obesum, inter tenue & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractionem eiusmodi sustinent, celeriusq; ea si nimium est pinguis aliquis affligitur. Ideoq; vis corporis melius ex venis, quam ex ipsa specie æstimatur. Neque enim solum hæc considerata sunt, sed etiam morbi genus, quod sit. Vtrum superans, an deficiens materia læserit. Corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia vel deest, vel integra est, istud alienum est. At si vel copia sui male habet, vel corrupta est, nullo modo melius succurritur. Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus, plenæq; venæ tument, sanguinis detractione requirit. Item viscerum, morbi,

f 2 nervor

neruorumq; resolutio, & rigor, & distentio, quicquid deniq; fauces difficultate spiritus strangulat, quicquid subito suppressit vocem, quisquis intolerabilis dolor est, & quacunq; de causa, ruptum aliquid intus atque collisum est. Item malus corporis habitus, omnesq; acuti morbi, qui modo (vt supra dixi) non infirmitate, sed onere nocent. Fieri tamen potest, vt morbus quidem id desideret, corpus autem vix pati posse videatur. Sed si nullum tamen appareat aliud auxilium, periturusq; sit, qui laborat, nisi temeraria quoq; via fuerit adiutus in hoc statu: boni medici est ostendere, quam nulla spes sine sanguinis detractione sit, fateriq; quantus in hac ipsa re sit metus. Et tum demum si exigatur, sanguinem mittere. De quo dubitari in eiusmodi re non oportet. Satius est enim, anceps auxilium experiri, quam nullum. Idq; maxime fieri debet, vbi nervi resoluti sunt. Vbi subito aliquis obmutuit. Vbi angina strangulatur. Vbi prioris febris accessio penè cōfecit, paremque subsequi verisimile est, neq; eandem videntur sustinere aegri vires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est. Neque enim semper concoctionem res exspectat. Ergo si ex superiore parte aliquis decedit, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem vomit, quamuis paulo ante sumpsit cibum, tamen protinus ei demenda materia est, ne, si subsederit, corpus affligat. Idemq; etiam in alijs

alijs casibus repentinis, qui strangulabunt, dictū
 erit. At si morbi ratio patiatur, tum demū nulla
 cruditatis* suspitione remanente id fiet. Ideoq; *suspicio-
 ei rei videtur aptissimus aduersæ valetudinis ne
 dies secundus aut tertius. Sed vt aliquando etiā
 primo die sanguinem mittere necesse est, sic
 nunquam vtile post diem quartum est, cum iam
 spatio ipso materia ex exhausta est, & cor-
 pus corrumpit, vt detractio imbecillum id fa-
 cere possit, non possit integrum. Quod si vehe-
 mens febris vrget, in ipso impetu eius sangui-
 nem mittere, hominem iugulare est. Expectāda
 ergo remissio est, si non decrescit, sed crescere de-
 syt, neq; speratur remissio, tunc quoq; quamuis
 peior, sola tamen occasio non omittenda est. Fe-
 re etiam ista medicina vbi necessaria est, in bi-
 duum diuidēda est. Satiū est enim primū le-
 uare egrū, deinde perpurgare, quā simul omni
 vi effusa fortasse precipitare. Quod si in cura
 quoq; aqua, quæ inter cutem est,* ita respondet, *ista
 quanto magis necesse est in sanguine respōdeat?
 Mitti vero is debet, si totius corporis causa sit,
 ex brachio: si partis alicuius, ex ea ipsa parte,
 aut certe quā proxima, quia non vbiq; mitti
 potest, sed in temporibus, in brachijs, iuxta ta-
 los. Neq; ignoro quosdam dicere, quā longissi-
 me sanguinem inde, vbi ledit, esse mittendum:
 sic enim auerti materie cursum: at illo modo in
 idipsum quod grauat, euocari. Sed idipsum fal-
 sum est. Proximum enim locum primo ex hau- *exaruit
 f 3 rit.

rit. Ex vltioribus autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur, vbi is suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur tamen vsus ipse docuisse, si caput fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse. Si quod in humero vitium est, ex altero brachio: credo, quia si quid parum cesserit, opportuniore hae partes iniuriae sunt, quam quae iam male habent. Auertitur quoque interdum sanguis, vbi alia parte prorumpens, alia emittitur. Desinit enim fluere quā volumus, inde obiectis quae prohibeant, alio dato itinere. Mitti autem sanguinem cum sit expeditissimum, vsu habenti, tum ignaro difficilimum est. Iuncta enim est vena arterijs, his nervi. Ita si neruum scalpellus attigit, sequitur nervorum distentio, ea quae hominem crudeliter consumit. At arteria incisa neque coit, neque sanescit, interdum etiam ut sanguis vehementer erumpat, efficit. Ipsius quoque venae, si forte praecisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timide scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neque venam incidit. Nonnunquam etiam ea latet, neque facile reperitur. Ita multae res id difficile in scio faciunt, quod perito facilimum est. Incidenda ad medium vena est, ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habitumque oportet attendere. Nam si is crassus & niger est, vitiosus est. Ideoque vtiliter effunditur. Si rubet, & pellucet, integer est. Eaque missio sanguinis adeo non prodest, ut etiam noceat,
 prob

protinusq; is suppressendus est. Sed id euenire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet, ut æque niger assidue ac primo die profluat. Quod quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit, suppressendus est. Semperq; antè finis faciendus est, quàm anima deficiat. Deligandumq; brachium super imposito expresso ex aqua frigida penicillo, * & postero die aduerso medio digito vena ferienda, ut recens coitus eius resoluatur, iterumq; sanguinem fundat. Siue autem primo, siue secundo die sanguis, qui crassus & niger initio fluxerat, & rubere & pellucere cœpit, satis materiæ detractum est, atq; quod superest, syncerum est. Ideoq; protinus brachium deligandum, habendumq; ita est, donec valens cicatricula sit, quæ celerrime in vena confirmatur.

* alias: & postero die aduerso medio digito, non autem scalpello, vena facienda.

De sanguinis detractione per cucurbitulas.

C A P. XI.

Cucurbitularum verò duo genera sunt, æneum, & corneum. Aenea altera parte patet, altera clausa est. Cornea altera parte æquè patens, altera foramen habet exiguum. In æneam linamētum ardens coniicitur, ac sic os eius corpori aptatur, imprimiturq; donec inhereat. Cornea per se corpori imponitur, deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus est, superq; cera cauum id clausum est, æquè inhaerescit. Vtraq; non ex his tantum materiæ generibus, sed etiam ex quolibet alio rectè

f 4 fit.

fit. At si cætera defecerunt, caliculus quoq; auge-
 pularius oris cõpressiori, ei rei commodè apta-
 tur. Vbi inhaesit, si concisa antè scalpello cutis est,
 sanguinem extrahit: si integra est, spiritum. Er-
 go vbi materia quæ intus est lædit, illo modo:
 vbi inflatio, hoc imponi solet. Vsus autem cucur-
 bitula præcipuus est, vbi non in toto corpore, sed
 in parte aliqua vitium est, quam exhauriri ad
 confirmandam valetudinem satis est. Idq; ipsum
 testimonium est, etiam scalpello sanguinem, vbi
 membro succurritur ab ea potissimè parte, quæ
 iam læsa est, esse mittendum, quòd nemo cucur-
 bitulam diuersæ parti imponit, nisi cum profu-
 sionem sanguinis eò auertit, sed ei ipsi quæ dolet
 quæq; liberanda est. Opus etiam esse cucurbi-
 tula potest in morbis lōgis, *quamuis & ijs iam
 spatium aliquod accessit, siue corrupta materia,
 siue spiritu male habente. In acutis quoq; qui-
 busdam, si & leuari corpus debet, & ex vena
 sanguinem mitti, vires non patiuntur. Idq; au-
 xilium vt minus vehemens, ita magistutum.
 Neque vnquam periculosum est, etiam si in me-
 dio febris impetu, etiam si in cruditate adhibe-
 tur. Ideoq; vbi sanguinem mitti opus est, si in-
 cisa vena, præceptum periculum est, aut si in par-
 te corporis etiam vitium est, huc potius confu-
 giendum est. Cum eo tamen, vt sciamus, hic vt
 nullum periculum, ita leuius præsidium esse, nec
 posse vehementi malo, nisi æquè vehemens au-
 xilium succurrere.

De

Deiectionem autem antiqui varijs medicamentis, crebraq; alui ductione in omnibus ferè morbis moliebantur, dabantq; aut nigrum veratrum aut filiculam, aut squamam æri, quoniam λεπίδι χαλκον Græci vocant, aut lactuce marinæ lac, cuius gutta pani adiecta abunde purgat, aut lac vel asininum, vel bubulum, vel caprinum, eiq; salis paulum adijciebant, decoquebantq; id, & sublatis his, quæ coierant, quod quasi serum supererat, bibere cogeant. Sed medicamenta stomachum ferè ledunt. Ideoq; omnibus catharticis aloë miscenda est. Alius si vehementius fluit, aut sæpius ducitur, hominem infirmat. Ergo nunquam in aduersa valetudine medicamentum eius rei causa rectè datur, nisi ubi is morbus sine febre est. Ut cum veratrum nigrum, aut atra bile vexatis, aut cum tristitia insanientibus, aut ijs quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At ubi febres sunt, satius est eius rei causa cibos, potionesq; assumere, qui simul & alant, & ventrem molliant. Suntq; valetudinis genera, quibus ex lacte purgatio conuenit. Plerumque verò aluius* potioni- *potius bus ducenda est, quod ab Asclepiade quoque sic *vituperat* temperatum, ut tamen seruatum sit, video plerumque seculo nostro præteriri. Est autem ea moderatio, quam is secutus videtur, aptissima: ut neq; sæpe ea medicina tentetur, & tamen semel sumptum vel bis non omittatur. Si caput
f 5 graue

graue est: si oculi caligant: si morbus maioris in-
 testini est, quod Græci *νόσος* nominant: si in
 imo ventre, aut in coxa dolores sunt: si in stoma-
 chum quedam biliosa concurrunt, vel etiam pi-
 tuita eò se, humor' ve aliquis aquæ similis con-
 fert: si spiritus difficiliter redditur: si nihil per se
 venter excernit, utiq; si iuxta quoq; stercus est,
 & intus remanet: aut si stercoris odorem, nihil
 deiciens, ager ex spiritu suo sentit: aut si cor-
 ruptum est quod excernitur: aut si prima inedia
 febrem non sustulit: aut si sanguinem mitti,
 cum opus sit, vires non patiuntur, tempus' ve
 eius rei præterijt: aut si multum ante morbum
 portauit aliquis potauit: aut si is qui sepe vel sponte, vel
 casu purgatus est, subito habet aluum suppres-
 sam. Seruanda verò illa sunt, ne ante diem ter-
 tium ducatur, ne vlla cruditate substantive, ne in
 corpore infirmo, diuq; in aduersa valetudine
 exhausto, ne' ve in eo, cui satis aluus reddit quo-
 tidie, qui' ve eam liquidam habebit, ne in ipso
 accessionis impetu, quia quod tum infusum est,
 aluo continetur, regestumq; in caput, multo gra-
 uius periculum efficit. Pridie verò abstinere
 debet ager, ut aptus tali curationi sit. Eodem die
 ante aliquot horas aquam calidam bibere, ut
 aliàs, superiores eius partes madescant, tum deiciens-
 timnittere da aluus est, si leui medicina contenti sumus,
 da i aluū pura aqua: si paulò valentiori, mulsa, si leni: ex
 aqua, in qua scænum græcum, vel ptisana, vel
 malua decocta sit. Si reprimendi causa, ex ver-
 benis

benis. Acris autem est marina aqua, vel alia sale adiecto, atq; utraq; decocta commodior est. Acrior fit adiecto vel oleo vel nitro, vel melle quoque. Si acrior est, eo plus extrahit, sed minus facile sustinetur. Id quod infunditur, neque frigidum esse oportet, neq; calidum, ne alterutro modo laedat. Cum infusum est, quantum fieri potest, continere se in lectulo debet aeger, nec primæ cupiditati deiectionis protinus cedere. Vbi necesse est, tum demum *desidere. Fereq; eo mo-^{*residere} do dempta materia superioribus partibus leuatis morbum ipsum mollit. Cum verò quoties res coëgit, desidendo aliquis se exhaust, paulisper debet conquiescere, & ne vires deficiant, utiq; eo die cibum assumere: qui plenior an exiguus sit dandus, ex ratione eius accessionis, quæ expectabitur, aut in metu non erit, æstimari oportebit.

De Vomitu.

CAP. XIII.

AT Vomitus, ut in secunda quoq; valetudine saepe necessarius biliosus est, sic etiam in his morbis, quos bilis concitant. Ergo omnibus qui ante febres horrore & tremore vexantur, omnibus, qui cholera laborant, omnibus etiã cum quadam hilaritate insanientibus, & comitiali quoq; morbo oppressis, necessarius est. Sed si acutus morbus est, sicut in cholera, si febris est, ut inter horrores, asperioribus medicamentis opus non est, sicut in deiectionibus quoq; supra dictum

dictum est, satisq; est ea vomitus caussa sumi, quæ sanis quoq; sumenda esse proposui. At ubi longi, valentes q; morbi sine febre sunt, ut comitialis aut insania, veratro quoq; albo utendum est. Id neq; hyeme, neq; æstate recte datur, optime vere, tolerabiliter autumno. Quisquis daturus erit, id agere antè debet, ut accepturi corpus humidum sit. Illud scire oportet, omne eiusmodi medicamentum, quod potui datur, non semper ægris prodesse, semper sanis nocere.

De Frictione. CAP. XIIII.

DE Frictione verò & Gestatione adeo multa Asclepiades, tanquam inuentor eius, posuit: quod in eo volumine quod communis, vi nium auxiliorum scripsit, cum trium tantum faciens, ret mentionem, huius & equi & gestationis, & aquæ tamen maximam partem in hoc consumpserit. et gestat. Oportet autem neq; recentiores viros in his fraudare, quæ vel reppererunt, vel recte secuti sunt, & tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt, autoribus suis reddere. Neq; dubitari potest, quin latius quidem, & dilucidius, ubi & quomodo frictione utendum esset, Asclepiades præceperit, nihil tamen repercrit, quod non à vetustissimo autore Hippocrate paucis verbis comprehensum sit, qui dixit, Frictione si vehemens sit, durari corpus: si lenis, molliri: si multa, minui: si modica, impleri. Sequitur ergo, ut tum utendum sit, cum aut astringendum corpus

corpus sit, quod fluens est: aut molliendum, quod induruit: aut dirigendum in eo quod copia nocet: aut alendum id, quod tenue, & infirmum est. Quas tamen species si quis curiosius aestimet, quod iam ad medicum non pertinet, facile intelliget, omnes ex vna causa pendere, quae demit. Nam & astringitur aliquid eo dempto, quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat: & mollitur eo detracto, quod duriciem creabat: & impletur non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem digestionem quadam relaxatam penetrat. Diversarum verò rerum in modo causa est. Inter unctionem autem & frictionem, multum interest. Ungi enim, leuiterque pertractari corpus etiam in acutis & recentibus morbis oportet, in remissione tamen & ante cibum. Longa verò frictione uti, neque in acutis morbis, neque incrementibus conuenit, praeterquam cum phreneticis somnus ea queritur. Amat autem hoc auxilium valetudo longa, & iam à primo impetu inclinata. Neque ignoro quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse, incrementibus morbis, non cum iam per se finiuntur. Quod non ita se habet. Potest enim morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli, quod duabus de causis necessarium est, ut & quam primum bona valetudo contingat: & ne morbus, qui remanet, iterum, quamuis leui de causa, exasperetur. Potest enim morbus minus gra-
uis

uis esse quàm fuerit, neque ideo tamen solui, sed reliquis quibusdam inherere, quæ admotum aliquod auxilium discutit. Sed ut leuata quoque aduersa valetudine rectè frictio adhibetur, sic nunquam adhibenda est febre increscente. Verum si fieri poterit, cum ex toto corpus ea vacabit, minus certè cum ea remiserit. Eodem autem modo in tutis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus modo est in partibus, aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius. Nam & capitis longos dolores, ipsius frictio leuat, non in impetu tamen doloris, et membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longe tamen sapius aliud perfricandum est, cum aliud dolet, maximeq; cum à summis, aut à medijs partibus corporis euocare materiam volumus, ideoq; extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex viribus hominis colligendum est. Et si is perinfirmus est, potest satis esse quinquagies: si robustior, potest ducenties esse faciendum. Inter vtrunq; deinde, prout vires sunt. Quò fit, ut etiam minus sæpe in muliere, quàm in viro, minus sæpe in puero vel sene, quàm in iuvene manus dimouenda sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentiq; frictione opus est. Nam neque totum corpus infirmari cito per partem potest, & opus est quàm plurimum materiæ digerere, siue id ipsum membrum,

hrum, siue per id aliud leuamus. At ubi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totum id exigit, breuior esse debet & lenior, ut tantummodo summam cutem emolliat, quò facilius capax ex recenti cibo nouæ materiæ fiat. In malis iam lægrum esse testatur, ubi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, ut supra posui. Sed tunc quoq; vnicum in frictione præsidium est, quæ si calorem in cutem euocauit, potest alicui medicinæ locum facere.

De Gestatione.

CAP. XV.

Gestatio quoque longis etiam & inclinatis morbis aptissima est, utilisq; est & his corporibus, quæ iam ex toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt: & his quibus lentæ morborum reliquæ remanent, neq; aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti, vehementiq; febre, præcipueq; ardente, ad discutendam eam, gestatione dixit utendum esse. Sed id periculose fit, meliusq; quiete eiusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen experiri volet, sic experiatur, si lingua nõ erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut præcordijs suberit. Et ex toto, nunquam gestari corpus dolens debet, siue id in toto, siue in parte est, nisi tamen solis nervis dolentibus: neq; vnquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt & pro viribus cuiusq;

iusq; , & pro opibus, ne aut imbecillum hominem nimis digerant, aut humili obsint. Gestationum lenissima est naui, vel in portu, vel in flumine; vehementior in alto mari naui, vel lectica, aut scamno: acrior vehiculo. Atq; hæc ipsa, & intendi & leniri possunt: si nihil horum est, suspendi lectus debet, & moueri: si ne id quidem est, at certè vni pedi lecti funiculus subijciendus est, atq; ita lectus huc & illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis, infirmis conueniunt. Valentiora verò his, qui iam pluribus diebus febre liberati sunt: aut his, qui grauium morborum initia sic sentiunt, vt adhuc febre vacent. Quod & in tabe, & in stomachi vitijs, & cum aqua cutem subijt, & interdum in morbo regio fit. Aut vbi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamuis diu manent. In quibus affectibus ea quoq; genera exercitationum necessaria sunt, quæ comprehendimus eo loco, quo quemadmodum sani, neque firmi homines se gererent, præcepimus.

De Abstinencia. CAP. XVI.

Abstinencia verò duo genera sunt. Alteri vbi nihil assumit æger. Alterum, vbi non nisi quod oportet. Initia morborum, primum famem, sitimq; desiderant: ipsi deinde morbi moderationem, vt neq; aliud, quàm expedit, neque eius ipsius nimium sumatur. Neq; enim conuenit

nit iuxta inedia protinus satietatem esse. Quòd si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore etiam agro? Neque vlla res magis adiuvat laborantem, quàm tempestiva abstinentia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alij tempora medicis pro dono remittunt, sibiipsis modum vendicant. Liberaliter agere se credunt, qui cetera illorum arbitrio relinquunt, in genere cibi liberi sunt, quasi quærat, quid medico liceat, non quid agro salutare sit. Cui vehementer nocet, quoties in eius quod assumitur, vel tempore vel modo, vel genere peccatur.

De Sudore.

CAP. XVII.

Sudor etiam duobus modis elicitur: aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & harenae calide, & laconici, & clibani, & quarundam naturalium sudationes, ubi è terra profusus calidus vapor edificio includitur, sicut super Baias in myrtetis habemus. Præter hæc sole quoque, & exercitatione is mouetur. Utiliaq; hæc genera sunt, quoties humor intus nocet, isq; digerendus est. Ac nervorum quoque quedam vitia sic optimè curantur. Sed cetera infirmis possunt convenire: Sol, & exercitatio tantum robustioribus, qui tamen sine febre, vel initio morbi, vel etiam grauib; morbis tenentur. Cavendum autem est, ne quid horum vel in febre,

g

vel

vel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. Nam modo discussis febribus initium cibi plenioris, viniq; firmiter valetudini facit: modo febrem ipsam tollit, fereq; adhibetur, ubi summam cutem relaxari, euocariq; corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo utebantur, Asclepiades audacius. Neque terrere autem ea res, si tempestiva est, debet: & ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est, simul atq; ea vno die non accessit, eo qui proximus est, post tempus accessio- nis, tuto lauari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic ut tertio, quarto'ue die reuertatur, quodcumq; non accessit, balneum tutum est. Manentibus vero adhuc febribus, si hæ sunt lentæ, lienesq; iamdiu male habent, rectè medicina ista tentatur. Cum eo tamen, ne præcordia dura sint, ne'ue ea tumeant, ne'ue lingua aspera sit, ne'ue aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit, ne'ue tum febris increseat. At in his quidem febribus quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt, alterum ante horrorem, alterum febre finita. In his vero qui lentis febriculis diu detinentur, cum aut ex toto recessit accessio, aut si id non solet certè lenita est, iamq; corpus tam integrum est, quàm maxime esse in eo genere valetudinis solet: imbecillus homo iturus in balneum, vitare debet, ne antè frigus aliquod experiatur. Vbi in balneum venerisistere nit, paulisper residere, expeririq; num tempora astring

astringantur, & an sudor aliquis oriatur. Illud
 si incidit, hoc non secutum est, inutile eo die bal-
 neum est: perungendus est is leniter, & referen-
 dus est, vitandumq; omnimodo frigus, & absti-
 nentia vtendum. At si temporibus integris, pri-
 mum ibi, deinde alibi sudor incipit, fouendum os
 aqua calida, tum in solio desidendum est: atque
 ibi quoque videndum, num sub primo contactu
 aquæ calidæ summa cutis inhorrescat, quod vix
 tamen fieri potest, si priora rectè cesserunt. Cer-
 tum id autem signum inutilis balnei est. Antè
 verò, an postea, quàm in aquam calidam se de-
 mittat, aliquis perungi debeat, ex ratione vale-
 tudinis suæ cognoscat. Ferè tamen, nisi vbi no-
 minatim, vt postea fiat, id præcipietur, moto su-
 dore leuiter corpus perungendum, deinde in a-
 quam calidam demittendum est. Atq; hic quoq;
 habenda virium ratio est. Neq; committendum,
 vt per æstum anima deficiat: sed maturius is
 auferendus, curiosoq; in vestimentis inuoluen-
 dus est, vt neque ad eum frigus aspiret, & ibi
 quoque antequam aliquid assumat, insudet. Fo-
 menta quoque calida sunt, milium, sal, harena,
 quodlibet eorum calefactum, & in linteum con-
 iectum. Si minore vi opus est, etiam solum lin-
 teum. At si maiore, extincti titiones, inuolutiq;
 panniculis, & sic circumdati. Quinetiam calido
 oleo replentur vtriculi, & in vasa fictilia, ad si-
 militudinem, quas lenticulas vocant aqua con-
 iicitur, & sal sicco linteo excipitur, demitti-
 turq;

De his ex-
 tinctis ti-
 tionibus ha-
 bes infra li.
 3. cap. 12.
 Lenticulæ.

turq; in aquam bene calidam, tum super id membrum, quod fouendum est, collocatur: iuxtaq; ignem ferramenta duo sunt capitulis paulo latioribus, alterumq; ex his demittitur in eum salem, & aqua super leniter aspergitur. Vbi frigere coepit, ad ignem refertur, & idem in altero fit, deinde inuicem in utroque inter quæ descendit falsus & calidus succus, qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omnibus commune est digerere id, quod vel præcordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoq; utendum sit, in ipsis morborum generibus dicetur.

Qui cibi, potionisue, aut valentis, aut mediæ, aut imbecillæ materiæ sint. CAP. XVIII.

Cum de his dictum sit, que detrahendo iuant, ad ea veniendum est, que nos alunt, id est cibum & potionem. Hæc autem non omnium tantum morborum, sed etiam secundæ valetudinis communia præsidia sunt. Pertinetq; ad rem, omnium proprietates nosse: primum, ut sani sciant, quomodo his utantur: deinde ut exequentibus nobis morborum curationem, liceat species rerum, quæ assidue necessarie erunt, subijcere. Neque necesse est subinde singulas illas nominare. Scire igitur oportet omnia legumina, quæq; ex frumentis panificia sunt, generis valentissimi esse. Id valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est. Item omne animal quadrupes

drupes domi natum, omnem grandem feram, quales sunt caprae, ceruus, aper, onager: omnem grandem auem, quales sunt anser, & pavo, & grus. Omnes belluas marinas, ex quibus nūc est, quæq; his pares sunt. Item mel, & caseum. Quò minus mirum est, opus pistorium, valentissimum esse, quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat. In media verò materia, numerari ex oleribus debere ea, quorum radices vel bulbos assumimus. Ex quadrupedibus, leporem. Aues omnes à minimis ad Phœnicopterum: item pisces omnes, qui salem non patiuntur, solidiue saliantur. Imbecillissimam verò materiam esse omne olus, & quicquid in cauliculo nascitur, qualis est cucurbita, & cucumis, & capparitis. Omnia poma, oleas, cochleas, itemq; conchyilia. Sed quamuis hæc ita discreta sunt, tamen etiam quæ sub eadem specie sunt, magna discrimina recipiunt, aliaq; res alia vel valentior est vel infirmior. Siquidem plus alimenti est in carne, quàm in ullo alio. Firmius est triticum, quàm milium, idipsum quàm ordeum, & ex tritico firmissima siligo, deinde simila, deinde cui nihil ademptum est (quod αὐτὸ ὄρυπον Græci vocant) infirmior est, ex polline infirmissimus cibarius panis. Ex leguminibus verò valentior faba, vel lenticula, quàm pisum. Ex oleribus valentior rapa, napiq; & omnes bulbi (in quibus cepam quoque & allium numero) quam pastinaca, vel quæ specialiter, ra-

Cibarius
panis.

Varro lib.
4. de Ling.
Latin. Ra-
dix, inquit,

peregrinū
vocabulū:
sic enim an-
tiqui Græ-
ci, quū nūc
Raphanū.

* fragilia

dicula appellatur. Item firmior brassica, & be-
ta, & porrum, quā lactuca, vel cucurbita, vel
asparagus. At ex fructibus surculorum valen-
tiores vuae, ficus, nuces, palmulae, quā quae po-
ma proprie nominantur. Atque ex his ipsis fir-
miora quae succosa, quā quae * frigida sunt.
Itemq; ex his auibus, quae in media specie sunt,
valentior ea, quae pedibus, quā quae volatu
magis nititur: & ex his quae volatu fidunt, fir-
miores sunt, quae grandiores aues, quā quae
minuta sunt, vt ficedula & turdus. Atque ea
quoq; quae in aqua degunt, leuiorem cibum pra-
stant, quā quae natandi scientiam non habent.
Inter domesticas verò quadrupedes, leuissima
suilla est, grauisima bubula. Itemq; ex feris
quo maius quodque animal, eo robustior ex eo
cibus est. Pisciumq; eorum, qui ex media mate-
ria sunt, quibus maxime vtimur: tamen gra-
uissimi sunt, ex quibus salsamenta quoque fieri
possunt, qualis Lacertus est, deinde qui quam-
uis teneriores, tamen duri sunt, vt aurata, cor-
uus, scarus, oculata: tum plani. post quos etiam
leuiiores, lupi, mulliq; & post hos omnes saxa-
tiles. Neque verò in generibus rerum tantum-
modo discrimen est, sed etiam in ipsis, quod &
aetate fit, & membro, & solo, & caelo, & ha-
bitu. Nam quadrupes animal omne si lactans
est, minus alimenti praestat. Item quo tenerior
pullus cohortalis est. In piscibus quoque media
aetas, quae nondum summam magnitudinem im-
pleuit.

pleuit. Deinde ex eodem sue ungula, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hædo'ue, cum petiolis totum caput aliquāto, quā cetera membra, leuiora sunt, adeo ut in media materia poni possint. Ex auibus, colla ala'ue recte infirmis annumerantur. Quod ad solum verò pertinet, frumentum quoque valentius est collinum, quā campestre. Leuior piscis inter saxa editus, quā in harena: leuior in harena, quā in limo. Quod fit, ut ex stagno, vel lacu, vel flumine eadem genera grauiora sint. Leuiorq; qui in alto, quā qui in vado vixit. Omne etiam ferum animal domestico leuius: & quodcunque humido cælo, quā quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pingua, quā macra, recentia quā salsa, noua quā vetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit iurulenta, quā assa: magis assa, quā *frixæ. Ouum durum valentissimæ materiae est, molle vel sorbibile, imbecillissime. Cumq; panificia omnia firmissima sint, elota tamen quedam genera frumenti, ut alica, opusca, ptisana, vel ex hisdem facta sorbitio, vel pulicula, & aqua quoque madens panis imbecillissimis annumerari potest. Ex potionibus verò, quæcunque ex frumento facta est, itemq; lac, mulsum, defrutum, passum, vinum aut dulce, aut vehemens, aut mustum, aut magne vetustatis, valentissimi generis est. At acetum, & id vinum, quod paucorum annorum, vel austerrum, vel lene est, in media materia est. Ideoq;

infirmis nunquam generis alterius dari debet. Aqua omnium imbecillissima est: firmiorque ex frumento potio est, quò firmitus fuit ipsum frumentum: firmior ex eo vino, quod bono solo, quàm quod tenui, quodque temperato cælo, quàm quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimiumque aut frigido, aut calido natum est. Multum quò plus mellis habet, defrutum quo magis incoctum est, passum quo ex sicciore uva est, eo valentius est. Aqua leuissima pluuialis est, deinde fontana, tum ex flumine, tum ex puteo, post hæc ex niue, aut glacie, grauior his ex lacu, grauissima ex palude. Facilis etiam & necessaria cognitio est naturam eius requiruntibus. Nam leuis pondere apparet, & ex his quæ pondere pares sunt, eo melior quæque est, quo celerius & calefit, & frigescit, quoque celerius ex ea legumina percoquantur. Ferè verò sequitur, ut quò valentior quæque materia est, eo minus facile concoquatur, sed si concocta est, plus alat. Itaque utendum est materie genere pro viribus, modusque omnibus pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus rebus infirmis opus est. Mediocriter firmos media materia optime sustinet: & robustis apta validissima est. Plus deinde aliquis assumere ex leuioribus potest, magis in his, quæ valentissima sunt, temperare sibi debet.

Quæ natura ac proprietas cuiusque rei sit, quæ
vescitur.

C A P. XIX.

Neque

NEquæ hæc sola discrimina sunt, sed etiam alie res boni succi, alie mali sunt, quas *δύχυλὰς*, vel *καποχύλὰς* Græci vocant. Alie lenes, alie acres, alie crassiores pituitam in nobis faciunt, alie tenuiorem, alie idoneæ sunt stomacho, alie alienæ sunt. Itemq; alie inflant, alie ab hoc absunt, alie calefaciunt, alie refrigerant, alie facile in stomacho acescunt, alie non facile intus corrumpuntur, alie mouent aluum, alie supprimunt, alie citant urinam, alie tardant. Quædam somnum mouent, quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud aliter, vel corpori, vel valetudini conuenit.

Quæ res boni succi sint.

C A P. XX.

Boni succi sunt, triticum, siligo, alica, oryza, amyllum. Item & lenes sunt & stomacho aptæ & calefaciunt, tragus, ptisana, lac, caseus mollis, omnis venatio, omnes aues, quæ ex media materia sunt. Ex maioribus quoque hæ, quas supra nominauimus. Medij inter teneros durosq; pisces, vt mullus & lupus, verna, lactuca, vrtica, malua, cucumis, cucurbita, ouum forbile, portulaca, cochleæ, palmulæ. Ex pomis quodcunq; neq; acerbum neq; acidum est. Vinum dulce vel lene, passum, defrutum, oleæ quæ ex his duobus in alterutro seruatæ sunt, vuluæ, rostra, *trunculiq;. In summa omnis pinguis caro, *ventri-

culiq;

g s Quæ

Quæ res mali succi sint.

CAP. XXI.

MAli verò succi sunt milium, panicum, ordeum, legumina, caro domestica permacra, omnisq; caro salsa, omne salsamentum, garum, vetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi, bulbi, brassica, magisq; etiam cyma eius, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepeta, satureia, hyssopum, ruta, anethum, fœniculum, cuminum, anisum, lapathum, sinapi, & allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcunq; acidum vel acerbum est, acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum, pisces quoq; saxatiles, omnesq; qui ex tenerrimo genere sunt, aut hi qui rursus nimium duri, virosiq; sunt, ut fere quos stagna, lacus, limosi uerui ferunt, quiue in nimiam magnitudinem excefferunt.

Quæ res lenes, quæue acres sint.

CAP. XXII.

LEnes autem sunt, sorbitiones, pulticula, laganum, amyllum, ptisana, pinguis caro, & quæcunq; glutinosa est. Quod ferè quidem in omni, quæ domestica sit, præcipue tamen in vngulis, trunculisq; suum, in petiolis, capitulisq; hœdorum, & vitulorum, & agnorum, omnibusq; cerebellis. Item si qui proprie bulbi nominantur, lac, defrutum, passum, nuclei pinei. Acria sunt omnia nimis austera, omnia acida, omnia salsa, & mel quidem, quo melius est, eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturtium, cucumis

Petiolis, id est, paruis pedibus: à Catone petioli, in decini, in de re rustica appellati.

mis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocymum, lactuca, maximaq; olerum pars.

Quæ res crassiores, quæ uero tenuiores pituitam faciant. CAP. XXIII.

CRassiores autem pituitam faciunt, oua sorbilia, alica, oryza, amyllum, ptisana, lac, bulbi, omniaq; fere glutinosa. Extenuant eandem omnia salsa, atq; acria, & acida.

Quæ res stomacho idoneæ sint. CAP. XXIII.

Stomacho autem aptissima sunt, quæcumque austera sunt, etiam quæ acida sunt, quæq; contacta sale modico sunt. Item panis sine fermento, & elota alica, vel oryza, vel ptisana, omnis auis, omnis venatio atq; utraq; vel assa, vel elixa. Ex domesticis animalibus bubula. Si quid ex ceteris sumitur, macrum potius, quam pingue. Ex sue ungula, rostra, aures, *vuluaq; steriles. *vulua, Ex oleribus intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, sifer. Ex pomis cerasium, morum, sorbum, pirum fragile, quale crustuminum, vel neuianum est. Item pira, quæ reponuntur tarentina atq; signina. Malum orbiculatum, aut scandianum, vel amerinum, vel cotoneum, vel punicum. Uuæ ex olla, molle ouum, palmula, nuclei, pinei, olea alba ex dura muria, eadem aceto intincta, vel nigra, quæ in arbore bene permaturuerunt, vel quæ in passo, defruto uero seruata sunt. Vinum austerum, licet iam asperum sit, item resinatum.

Duri

Duri ex media materia pisces, ostrea, peccines, murices, purpure, cochleæ: cibi, potionesq; vel frigide vel feruentes, absynthium.

Quæ res alienæ stomacho sint. CAP. XXV.

Aliena verò stomacho sunt omnia tepida, omnia salsa, omnia iurulenta, prædulcia, omnia pingua, sorbitio, panis fermentatus, itēq; vel ex milio, vel ex hordeo, oleum, radices oleum, & quodcunq; olus ex oleo garo'ue estur, mel, mulsum, defrutū, passum, lac, omnis caseus, vna recens, ficus & viridis & arida, legumina omnia, quæq; inflare consueuerunt: item thymum, nepeta, satireia, hyssopum, nasturtium, lappathum, lapsana, iuglandes. Ex his autem intelligi potest, non quicquid boni succi est, protinus stomacho conuenire: neq; quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse.

Quæ inflent, aut inflammationem leuent.

CAP. XXVI.

Inflant autem omnia fere legumina, omnia pingua, omnia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atque etiam id vinum, cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus allium, cepa, brassica, omnesq; radices, excepto sisere & pastinaca, bulbi, ficus etiam arida, sed magis virides, vnae recentes, nuces omnes, exceptis nucleis pineis, lac, omnisq; caseus, quicquid deinde subcrudum aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex venatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchyliis, ouis vel mollibus, vel sorbilibus, vi-

no

no vetere. Fœniculum verò & anethum inflationes etiam leuant.

Quæ res aut calefaciant, aut refrigerent.

CAP. XXVII.

AT calefaciunt piper, sal, caro omnis iurulenta, allium, cepa, ficus arida, salsamentum, vinum, & quo meracius est, eo magis. Refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca. Item coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasa, mala austera, pira fragilia, caro elixa, præcipueq; acetum, siue cibis ex eo, siue potio assumitur.

Quæ res intus facile vitientur, vel minime

corrumpantur.

CAP. XXVIII.

Facile autem intus corrumpuntur, panis fermentatus, & quisquis alius quam ex tritico est, lac, mel, ideoq; * lactaria atq; omne pisto- * lactatia-
rium opus, teneri pisces, ostrea, olera, caseus, et recens, & vetus, crassa vel tenera caro, vinum dulce, mulsum, defrutum, passum, quicquid deinde vel iurulentum est, vel nimis dulce, vel nimis tenue. At minime intus vitiantur, panis sine fermento, aues, & ea potius duriores, aurati pisces: neque solum aurata pura, aut scarus, sed etiam loligo, locusta, polypus. Item bubula, omnisq; dura caro, eademq; aptior est, si macra, si salsa est, omniaq; salsamenta, cochleæ, murices, purpureæ, vinum austereum, vel resinatum.

Quæ res aluum moueant.

CAP. XXIX.

AT aluum mouent, panis fermentatus, magisq; si cibarius vel hordeaceus est, brassi-
ca,

ca, si subcruda est, lactuca, anethum, nasturtium,
 ocymum, vrtica, portulaca, radícula, capparis,
 allium, cepa, malua, lapathum, beta, asparagus,
 cucurbita, cerasia, mora, vua, omnia mitia, ficus
 etiam arida, sed magis viridis, vuae recētes, pin-
 gues, minuta aues, cochlea, garum, salsamenta,
 ostrea, pelorides, echini, muscoli, & omnes fere
 conchule, maximeq; ius earum, saxatiles, &
 omnes teneri pisces, sepiarum atramentū, si qua
 caro assumitur pinguis eadem, vel iurulenta,
 * lactātia vel elixa, aues, quae natant, mel crudum, lac, * la-
 ctaria omnia, mulsum, vinum dulce, vel salsum,
 aqua tenera, omnia tepida, dulcia, pingua, eli-
 xa, iurulenta, salsa, diluta.

Panis.

Quae res aluum astringant. CAP. XXX.

Contra astringunt, panis ex siligine, vel ex
 simila, magis si sine fermento est, magis etiā
 si rētus est, intenditurq; vis eius etiam si bis
 coquitur. Pulticula vel ex alica, vel ex panico,
 vel ex milio, itemq; ex iisdem sorbitio, & ma-
 gis si haec antè fricta sunt. Lenticula, cui vel be-
 ta, vel intubus, vel ambubeia vel plantago ad-
 iecta est, magisq; etiam, si illa antè fricta est,
 per se etiā intubus, vel ex plantagine vel am-
 bubeia fricta, minuta olera, brassica bis deco-
 cta, dura oua, magisq; si assa sunt, minuta aues,
 merula, palumbus, magisq; si in posca decoctus
 est, graues omnes aues, quae magis currūt, quā
 volant: lepus, caprea, iecur ex his quae seuum ha-
 bent, maximeq; bubulum, ac seuum ipsum, ca-
 seum,

seus, qui vehementior vetustate fit, vel ea mutatione quam in caseo transmarino videmus, aut si recens est ex melle, mulso'ue decoctus. Item mel coctum, pira immatura, sorba, magisq; ea, quæ torminalia vocantur, mala cydonia, & punica, oleæ vel albæ vel permatura, myrta, pal-mula, purpureæ, murices, vinum resinatum vel asperum, item meracum, acetum, mulsum quod inferbuit, item defrutum, passum, aqua vel tepida, vel præfrigida, dura, id est ea quæ tarde putrescit, ideoq; pluvia potissimum, omnia dura, macra, austera, aspera, tosta, & in eadem carne assa potius quàm elixa.

Quæ res urinam mouent. C A P. XXXI.

VRinam autem mouent, quæcunq; in horto nascuntur boni odoris sunt, vt apium, ruta, anethum, ocymum, menta, hyssopum, anesum, coriandrum, nasturtium, eruca, fœniculum. Præter hæc asparagus, capparis, nepeta, thymum, satureia, lapsana, pastinaca, magisq; agrestis, radícula, fiser, cepa. Ex venatione maxime lepus, vinum tenue, piper & rotundum & longum, sinapi, absinthium, nuclei pinei.

Quæ res somnum moueant, aut sensus excitent.

C A P. XXXII.

Somno verò aptum est papauer, lactuca, maximeq; æstiuæ, cuius cauliculus iam lacte repletus est, morum, porrum. Sensus excitant nepeta, thymum, satureia, hyssopum, præcipueq; pulegium, ruta & cepa.

Quæ

Quæ res corpus aut erodant, aut reprimant,
aut refrigerent, aut calefaciant, aut du-
rent, aut emolliant. CAP. XXXIII.

EVocare verò materiam multa admodum
possunt. Sed ea quæ ex peregrinis medica-
mentis maxime constant, alijsq; magis quàm
quibus ratione victus succurritur, opitulantur,
in præsentia differã. Ponam ea verò, quæ prom-
pta, & his morbis (de quibus protinus dictu-
rus sum) apta corpus erodunt, & sic ex eo, quod
mali est, extrahunt. Habent autem hanc facul-
tatem semina eruce, nasturtij, radiculæ, præci-
pue tamen omnium sinapi. Salis quoque & fici
eadem vis est. Leniter verò simul & reprimunt
vel ace- & molliunt lana succida ex aceto vel vino,
to vel vi- cui oleum adiectum est, contritæ palmulæ, fursu
no, quo res in salsa aqua, vel aceto decocti. At simul re-
olei adi. primunt, & refrigerant, herba muralis, parthe-
nium, vel perdicium appellant, serpyllum, pule-
gium, ocymum, herba sanguinalis, quam Græci
Herba fan- *ποδὺ γόρον* vocant, portulaca, papaveris folia, ca-
guinalis. preoliq; vitium, coriandri folia, hyoscyamus, mu-
scus, siser, apium, solanum, quàm *ἑρὺ χυρόν* Græci
vocant, brassicæ folia, intubus, plantago, fœnicu-
li semen, contrita pira vel mala, præcipueq; cy-
donia, lenticula, aqua frigida, maximeq; plu-
uialis, vinum, acetum, & ex horum aliquo ma-
gis, madens vel panis, vel farina, vel spongia,
vel cinis, vel lana succida, vel etiam linteolum,
creta cimolia, gypsum, melinum, myrteum, rosa,
acerb

acerbum oleum, verbenarum contusa cum teneris caulibus folia, cuius generis sunt olea, cypressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, hederæ, punicum malum. Sine frigore autem reprimunt cocta mala cydonia, malicorium, aqua calida, in qua verbenæ coctæ sunt, quas supra proposui, pulvis vel ex fece vini, vel ex myrti folijs, amaræ nuces. Calefacit verò ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex farri, siue hordei, siue erui, vel lolij, vel milij, vel panici, vel lenticulæ vel fabæ, vel lupini, vel lini, vel fœni græci, ubi ea defuerit, calidâq; imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quàm ex aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, modulla, adeps ex felle iuncta oleo, magisq; si vetus est, sal, nitrum, git, piper, quinquefolium, fereq; quæ vehementer & reprimunt, & refrigerant. Durant quæ calefaciunt & digerunt, & emolliunt. Præcipueq; ad emolliendû potest cataplasma ex lini vel fœni græci semine. His autem omnibus & simplicibus & permixtis variè medici vtuntur, ut magis quid quisq; persuasit sibi appareat, quàm quid euidenter cõperit.

LIBER III.

De morborum generibus.

CAP. I.



PROVISIS omnibus, quæ perti-
nent ad vniuersa genera morborum,
ad singulorum curationes veniam.
Hos autem in duas species Græci
diuiserunt, aliosq; ex his acutos, alios longos esse
dixerunt. Ideoq; quoniam non semper eodem mo-
do respondebant, eosdem alij inter acutos, alij in-
ter longos retulerunt. Ex quo plura eorum ge-
nera esse manifestum est. Quidam enim breues
utique sunt, qui cito vel tollunt hominem, vel
ipsi cito finiuntur. Quidam longi, sub quibus ne-
que sanitas in propinquo, neque exitium est. Ter-
tiumq; genus eorum est, qui modò acuti, modò
longi sunt. Idq; non in febribus tantummodo, in
quibus frequentissimum est, sed in alijs quoque
fit. Atque etiam præter hos, quartum est, quod
neq; acutum dici potest, quia non perimit: neque
utique longum, quia si occurritur, facile sana-
tur. Ego cum de singulis dicam, cuius quisque ge-
neris sit, indicabo. Diuidam autem omnes in
eos, qui in totis corporibus consistere videntur,
et eos qui oriuntur in partibus. Incipiā à prio-
ribus, pauca de omnibus præfatus. In nullo qui-
dem morbo minus fortuna sibi vendicare, quàm
fortuna ars potest, utpote cum repugnante natura,
nihil medicina proficiat. Magis tamē ignoscen-
dum medico est parum proficienti in acutis mor-
bis,

bis, quàm in longis. Hic enim breue spatium est, intra quod si quod auxilium non profuit, aeger extinguitur. Ibi & deliberationi & mutationi remediorum tempus patet, adeo ut rarò, si inter initia medicus accessit, obsequens aeger sine illius vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus insedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus quidem, quò vetustior est, longus autem quò recentior, eò facilius curatur. Alterum illud ignorari non oportet, quòd non omnibus aegris eadem auxilia conueniunt. Ex quo incidit, ut alia atque alia summi auctores, quasi sola vendicauerint, prout cuique cesserant. Oportet itaque ubi aliquid non respondit, non tanti putare autorem, quanti aegrum, & experiri aliud atque aliud. Sic tamen, ut in acutis morbis citò mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus ut facit, sic etiam soluit, non statim condemnatur, si quid non statim profuit. Minus verò remoueatur, si quid paulum saltem iuuat, quia profectus tempore expletur.

Quomodo morbi cognoscantur, & an incrementum, an constant, an minuantur: & qua ratione ab initio, qui languere incipit, curari debeat.

CAP. II.

Protinus autem inter initia scire facile est, quis acutus morbus, quis longus sit: non in his solis in quibus semper ita se habet, sed in his quoque in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones & dolores graues
 1 2 vrgent

urget, acutus morbus est. Vbi lenti dolores, len-
 tæue febres sunt, & spatia inter accessiones por-
 riguntur, acceduntq; ea signa, quæ in priore vo-
 lumine exposita sunt, longum hunc futurum esse
 manifestum est. Videndum etiam est, morbus
 an increseat, an consistat, an minuat, quia
 quedam remedia incrementibus morbis, plura
 inclinantibus conueniunt. Ea q; quæ decrescen-
 tibus apta sunt, vbi acutus increscens urget, in
 remissionibus potius experienda sunt. Increscit
 autem morbus, dum grauiore dolores accessio-
 nesq; veniunt, hæq; & antè quàm proximæ re-
 uertuntur, & postea desinunt. Atque in longis
 quoq; morbis etiam tales notas non habentibus,
 scire licet incrementum, si somnus incertus est, si
 deterior concoctio, si fædiore deiectiones, si
 tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit cor-
 pus frigus aut calor, si idem magis pallet. Ea ve-
 rò quàm contraria his sunt, decedentis eius no-
 tæ sunt. Præter hæc in acutis morbis serius ager
 alendus est, nec nisi iam inclinatis, ut primò
 dempta materia impetum frangat. In longis ma-
 * aduentu turius, ut sustinere spatium affecturi mali
 ri possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed
 in parte est, magis tamen ad rem pertinet vim
 totius corporis molliri, quàm propriæ partes
 agræ sanentur. Multum etiam interest, ab ini-
 tio quis recte curatus sit, an perperam, quia cu-
 ratio minus his prodest, in quibus assidue fru-
 stra fuit. Si quis temere habitus, adhuc integris
 virib

viribus viuit, admota curatione momento resti-
tuitur. Sed cum ab his cœperim, quæ notas quas-
dam futuræ aduersæ valetudinis exhibent, cura-
tionum quoque principium ab animaduersione
eiusdem temporis faciam. Igitur si quid ex his
quæ proposita sunt, incidit, omnium optima sunt,
quies, & abstinentia. Si quid bibendum, aqua.
Idq; interdum vno die fieri satis est. Interdum,
si terrentia manent, biduo. proximeq; absti-
nentiam sumendus est cibus exiguus, bibenda
aqua, postera die etiam vinum, deinde inui-
cem alternis diebus, modò aqua, modò vinum,
donec omnis causæ metus finiatur. Per hæc enim
sepe instans grauis morbus discutitur. Pluri-
miq; falluntur, dum se primo die protinus subla-
turos languorem, aut exercitatione, aut balneo,
aut coacta deiectione, aut vomitu, aut sudatio-
nibus, aut vino sperant. Non quo non interdum
id incidat, aut non decipiat, sed quò sæpius fal-
lat, solaq; abstinentia sine vllò periculo medea-
tur. Cum præsertim etiam pro modo terroris mo-
derari liceat, & si leuiora indicia fuerint, satis
sit à vino tantum abstinere: quod subtractum,
plus quàm si cibo aliquid dematur, adiuvat: si
paulò grauiora, facile sit, non aquam tantum bi-
bere, sed etiam cibo carnem subtrahere. Interdum
panis quoq; minus quàm pro consuetudine assu-
mere, humidoq; cibo esse contentum, & olere po-
tissimum. Satisq; sit tum ex toto à cibo, à vino,
ab omni motu corporis abstinere, cum vehē-

mentes nota terruerunt. Neque dubium est quin vix quisquam, qui non dissimulauit, sed per hæc mature morbo occurrit, ægrotet.

De Februm generibus.

CAP. III.

ATque hæc quidem sanis facienda sunt, tantum causam metuentibus. sequitur verò curatio febriū, quod & in toto corpore, & vulgare maxime morbi genus est. Ex his vna quotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum etiam longiore circuitu quædā redeunt, sed id raro euēnit. In prioribus & morbi sunt, & medicina. At quartanæ quidem simpliciores sunt. Incipiunt fere ab horrore, deinde calor erumpit, finitaq; febre biduum integrum est, ita quarto die reuertitur. Tertianarum verò duo genera sunt. Alterum eodem modo quo quartana & incipiens & desinens, illo tantum interposito discrimine, quod vnum diem præstat integrum, tertio redit. Alterū longe perniciosius, quod tertio quidem die reuertitur, ex octo autē & quadraginta horis, fere sex & triginta per accessionem occupat, interdum etiam vel minus vel plus, neq; ex toto in remissione desistit, sed tantū leuius est. Id genus pleriq; medici hemitritæo appellāt. Quotidianæ verò variæ sunt, Frigus. & multiplices. Aliæ enim protinus à calore incipiūt, aliæ à frigore, aliæ ab horrore. Frigus vo
Horror. co, vbi extremæ partes membrorum inalgescūt:
horror

horrorē, ubi totum corpus intremittit. Rursus alie sic desinunt, vt ex toto sequatur integritas: alie sic, vt aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quadā reliquie remaneant, donec altera accessio accedat, ac sepe alie vix quicquam, aut nihil remittant, sed ita vt continuant. Deinde alie feruorem ingentem habent, alie tolerabilem, alie quotidie pares sunt, alie impares, atq; inuicem altero die leniores, altero vehementiores, alie tēpore eodem postridie reuertuntur, alie vel serius vel celerius, alie diem noctemq; accessionē et decessionē implent, alie minus, alie plus, alie cum decedēti sudorē mouent, alie non mouent: atq; aliās per sudorem ad integritatem venit, aliās corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam, modō singule singulis diebus fiunt, modō binę, plures re concurrunt. Ex quo sepe euenit, vt quotidie plures accessiones, remissionesq; sint. Sic tamen vt vnaqueq; alicui priori respondeat. Interdum verō accessiones quoq; confunduntur, sic vt notari neq; tempora earum, neque spatia possint. Neq; verum est, quod dicitur à quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex vomica, aut ex inflammatione, aut ex vlcere. Facilius enim semper curatio foret, si hoc verum esset. Sed quod euidentes causse faciunt, facere etiam abditę possunt. Neq; de re, sed de verbo controuersiam mouent. Qui cum aliter aliterq; in eodē morbo febres accedant, non easdē inordinate re-

h 4 dire,

dire, sed alias, aliasq; subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret, etiam si verè diceretur. Tempora quoq; remissionum modò liberalia, modò vix vlla sunt.

De curationū diuerlis generibus. CAP. II. II.

ET februm quidem ratio maxime talis est. Curationū verò diuersa genera sunt, prout autores aliqui habēt. Asclepiades officium esse medici dicit, vt tutò, vt celeriter, vt iucundè curret. Id notum est, sed ferè periculosa esse nimium, & festinatio & voluptas solet. Qua verò moderatione vtendū sit, vt quantum fieri potest omnia ista cōtingant, prima semper habita salute in ipsis partibus curationū considerandū erit. Et ante omnia queritur, primis diebus aeger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eò quòd cruditatē maxime horrebant: deinde eam materiam, quæ ledere videbatur, ducēdo sæpius aluum subtrahebant. Asclepiades medicamenta sustulit, aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. Febre verò ipsa præcipuè se ad eius remedium vti professus est. Conuellendas enim vires egri putauit, luce, vigilia, siti ingenti: sic, vt ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis falluntur, qui per omnia in-

* Et is e- cundam eius disciplinam esse contendunt. * His
nim enim vltioribus quidem diebus cubātis etiam
luxuriæ subscripsit: primis verò tortoris vicem
exhibuit. Ego autem medicamentorum dari po-
potiones,

potiones, & aliud duci non nisi raro debere, con-
 cedo. Et id non ideo tamen agendum, ut acri vi-
 res conuellantur, existimo: quoniam ex imbecil-
 litate summum periculum est. Nolinui ergo tan-
 tam materiam superatam oportet, quae naturali-
 ter* digeritur, ubi nihil noui accedit. Itaque ab-
 tinendus à cibo primis diebus est, in luce habendus ^{* detra-} hatur
 aeger, nisi infirmus interdium est, quoniam
 corpus ista quoque digerit, isque cubare quam ma-
 ximo conclauis debet. Quod ad sitim verò so-
 mnusque pertinet, moderandum est, ut interdium
 vigilet: noctu, si potest, conquiescat: ac neque po-
 tet, neque nimium siti crucietur. Os etiam eius e-
 lui potest, ubi & siccum est, et ipsi saetet, quam-
 uis id tempus aptum potioni non est. Commodeque
 Erasistratus dixit, saepe inferiore parte humo-
 rem non requirente, os & fauces requirere, neque
 ad rem male haberi aegrum pertinere. Ac primò
 quidem sic tenendus est. Optimum verò medi-
 camentum est, opportunè cibus datus, qui quan-
 do primùm dari debeat, quaeritur. Plerique ex
 antiquis tarde dabant, saepe quinto die, saepe sex-
 to, & id fortasse vel in Asia, vel in Aegypto
 caeli ratio patitur. Asclepiades ubi aegrum tri-
 duo per omnia fatigarat, quarto die cibo desti-
 nabat. At Themison nuper, non quando coepisset
 febris, sed quando defisset, aut certè leuata
 esset, considerabat, & ab illo tempore expectato
 die tertio, si non accesserat febris, statim: si acces-
 serat, ubi ea vel defierat, vel si assidue inhiere-
 bat,

h s bat,

bat, si certè se inclinauerat, cibum dabat. Nihil autem horum vtiq; perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut quinto, potest post vnā accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim qualis morbus sit, quale corpus, quale cælum, quæ ætas, quod tempus anni. Minimeq; in rebus multum inter se differentibus, quod intermittendum non est, perpetuum esse præceptum temporis potest. In morbo qui plus virium aufert, celerius cibus dandus est, itemq; eo cælo, quo magis digerit. Ob quam causam in Aphrica, nullo die æger abstinere recte videtur. Melius etiam puero, quàm iuueni, æstate, quàm hyeme dari debet. Vnum illud & semper & vbiq; seruandum est, vt ægri vires subinde aspidens medicus inspicat, & quamdiu supererunt, abstinentia pugniet: si imbecillitatem vereri cœperit, cibo subueniat. Id enim eius officium est, vt ægrum neq; superuacua materia oneret, neq; imbecillitatem
 *fami *fame perdat. Idq; apud Erasistratum quoq;
 prodat inuenio, qui quamuis parum docuit, quādo venter, quando corpus ipsum exinaniretur, dicendo tamen hac esse visenda, et tum cibum dandum, cum corpori deberetur: satis ostendit, dum vires superessent, dari non oportere: ne deficerent, consulendum esse. Ex his autem intelligi potest ab vno medico multos non posse curari, eumq; (si artifex est) idoneum esse, qui non multum ab ægro

gro

gro recedit. Sed qui quæstui seruiunt, quoniam
 is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea
 præcepta, quæ sedulitatem non exigunt, ut in
 hac ipsa re. Facile est enim dies, vel accessiones
 numerare his quoq; qui ægrum rarò vident. ille
 assideat necesse est, qui quod solum opus est, vi-
 surus est, quando nimis imbecillus futurus sit,
 nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad ini-
 tium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit.
 Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, Dies impa-
res.
 quoniam antiqui potissimè impares sequeban-
 tur, eosq; tanquam tunc de agris iudicaretur,
 ugiours nominabant. Hi erant dies tertius,
 quintus, septimus, nonus, undecimus, quartus-
 decimus, unus & vigesimus, ita ut summa po-
 tentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni
 & vigesimo daretur. Igitur sic ægros nutrie-
 bant, ut dierum imparium accessiones expecta-
 rent, deinde postea cibum quasi lenioribus ac-
 cessionibus instantibus darent, adeo ut Hippo-
 crates, si alio die febris desisset, recidiuam timere
 sit solitus. Id Asclepiades iure ut vanum repu-
 diavit, neq; in ullo die, quia par, impar'ue esset,
 his vel maius, vel minus periculum esse dixit.
 Interdum enim peiores dies pares fiunt, & op-
 portunius post earum accessiones cibus datur.
 Nonnunquam etiam in ipso morbo, dierum ratio
 mutatur, fitq; grauior, qui remissior esse consue-
 uerat, atq; ipse quartusdecimus par est, in quo
 esse magnam vim antiqui fatebantur. Qui cum
 octauum

octauum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet, ipsi sibi repugnabant, non octauum, neq; decimum, neq; duodecimum diem sumendum quasi potentio-rem. Plus enim tribuebant nono & vndecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione, ab vndecimo non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem, ei quem septimus dies liberaturus sit, quartum esse grauisimum. Ita illo quoq; autore in die pari & grauior febris esse potest, & certa futuri nota. Atq; idem alio loco quartum quemq; diem, ut in vtrumq; efficacissimum apprehendit, id est, quartum, septimum, vndecimum, quartumdecimum, decimumseptimum, in quo & ab impari ad paris rationem transit: & ne hoc quidem propositum conserua-uit, cum à septimo die vndecimus, non quartus, sed quintus sit: adeo apparet quacumq; ratione ad numerum respeximus, nihil rationis sub illo quidem autore reperiri. Verum in his quidē antiquos tunc celebres admodum Pythagorici numeri fefellerunt, cum hic quoq; medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri, & ex his coniectare, quando dandus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet, scire, tum ne oporteat dari, cum iam bene vena con- quicuerunt, aut etiam num manentibus reliquis febris. Antiqui enim quā integerrimis corpo- ribus alimentum offerebant. Asclepiades incli-
nata

Sed si octa-
uus primi
naturā ha-
bet: vnde-
cim^o quar-
tus, non
quintus e-
rit.

nata quidem febre, sed adhuc tamen inherente.
 In quo^{*} vanam rationē secutus est, non quò non^{*} vnam
 sit interdum maturius cibus dandus, si mature
 timetur altera accessio: sed quò scilicet quàm sa-
 nissimo dari debeat. Molius enim corrumpitur
 quod integro corpori infertur. Neq; tamen^{*} ve-^{*} non va-
 rum est, quod Themisoni videbatur, si duabus num est
 horis integer futurus esset aeger, satius esse tunc
 dare, ut ab integro corpore potissimum diduce-
 retur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset
 optimum. Sed cum hoc breue tempus nō præster,
 satius esse principia cibi à decedente febre quàm
 reliquias ab incipiēte excipi, ita, si longius tem-
 pus secundum est, quàm integerrimo dandus
 est: si breue, etiam antequā ex toto integer fiat.
 Quo loco verò integritas est, eodem est remissio,
^{*} quæ maxime in febre continua potest esse. At^{*} si qua
 hic quoq; queritur, vtrum tot horæ expectandæ
 sint, quot febrem habuerunt, an satis sit, primam
 partem earum præteriri, ut aegris iucundius in-
 sidat, quibus interdum non vacat. Tutissimum
 est autem ante totius accessionis tempus præter-
 ire, quamvis ubi longa febris fuit, potest indul-
 geri egro maturius, dum tamen ante minime
 pars dimidia prætereatur. Idq; non in ea sola fe-
 bre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus
 ita seruandum est.

De febrium speciebus, & singularum curatio-
 nibus: & primò, quando cibus febricitan-
 tibus dandus sit.

C A P. V.

Hec

HAec magis per omnia genera febrium perpetua sunt, nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desit, eaque vel ex inguine, vel ex lassitudine, vel ex aestu, aliave simili re fuit, sic ut interior nulla causa metum fecerit, postero die cum tempus accessionis ita transijt, ut nihil moverit, cibus dari potest. At si ex alto calor venit, & gravitas vel capitis vel praecordiorum secuta est, neque apparet quid corpus confuderit, quamvis unam accessionem secuta integritas est, tamen quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: & ubi accessionis tempus praeterijt, cibus dandus est, sed exiguus, quia quartana quoque timeri potest. Et die quarto demum, si corpus integrum est, eo cum fiducia utendum. Si vero postero, tertiove, aut quarto die secuta febris est, scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque, quarum & certus circuitus est, & finis integer, & quia liberaliter quietata tempora sunt, expeditior ratio est: de quibus suo loco dicam. Nunc vero eas explicabo, quae quotidie urgent. Igitur tertio quoque die cibus agro commodissime datur, ut alter febrem minuat, alter viribus subueniat. Sed his dari debet, si quotidiana febris est, quae ex toto desinat, simul atque corpus integrum factum est. si quamvis non accessiones, febres tamen iunguntur, & quotidie quidem crescunt, sed sine integritate tamen remittunt, cum corpus ita se habet, ut maior remissio non expectetur.

Et letur. Si altero die grauior, altero leuior accessio
 est, post grauiorem. Ferè verò grauiorẽ accessio-
 nem leuior nox sequitur: quò fit, vt grauiorẽ ac-
 cessionẽ nox quoq; tristior antecedit. At si con-
 tinuatur febris, neq; leuior vnquã fit, & dari ci-
 bum necesse est, quãdo dari debeat, magna quidẽ
 dissensio est. Quidam, quia ferè remissius matu-
 tinum tẽpus agris est, tunc putant dandũ. Quod
 si respondet, non quia mane est, sed quia remis-
 sio est agris, dari debet. Si verò ne tunc quidem
 ulla requies agris est, hoc ipso peius id tempus
 est, quòd cum sua natura melius esse debeat, mor-
 bi vitio non est, simulq; insequitur tẽpus meri-
 dianum: à quo cum omnis ager ferè peior fiat,
 timeri potest, ne ille magis etiam, quàm ex con-
 suetudine vrgeatur. Igitur alij vespere tali agro
 cibum dant. Sed cum eo tempore ferè pessimi
 sint, qui egrotant, verendum est, ne si quid tunc
 mouerimus, fiat aliquid asperius. Ob hac ad me-
 diam noctem decurro, id est finito iam grauis-
 simo tempore, eodemq; longissimè distante, secu-
 turis verò antelucanis horis, quibus omnes ferè
 maximè dormiunt: deinde matutino tempore,
 quod natura sua leuissimum est. Si verò febres
 vagæ sunt, quia verendum est, ne cibum statim
 subsequantur, quandocunq; quis ex accessione
 leuatus est, tunc debet assumere. At si plures
 accessiones eodem die veniunt, considerare oportet,
 pares ne per omnia sint, (quod vix fieri po-
 test) an impares. Si per omnia pares sunt, post
 eam

Febres vā-
gæ.

* hunc.

eam potius accessionem cibis dari debet, quæ non inter meridiem & vesperem desinit. Si impares sunt, considerandum est, quo distent. Nam si altera grauior, altera leuior est, post grauiorẽ dari debet: si altera longior, altera breuior, post longiorem: si altera grauior, altera longior est, considerandum est, vtra magis affligat, illa vi, an hæc tempore, & post eam dandus est. Sed planè plurimum interest, quantæ, qualesq; inter eas remissiones sint. Nā si post alteram febrem motio manet, post alteram integrum corpus est: integro corpore, cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet, sed alterum tamen longius tempus remissionis est, id potius eligendum est, adeo vt vbi accessiones continuantur, protinus inclinata priore dandus cibis sit. Etenim perpetuum est, ad quod omne cõsiliũ dirigi potest, cibum quàm maxime semper ab accessione futura reducere, & hoc saluo, dare quàm integerrimo corpori. Quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. Sed cum sit aptissimum tertio quoq; die cibum dare, tamen si corpus infirmum est, quotidie dandus est; multoq; magis si continentes febres sine remissione sunt, quanto magis corpus affligunt, aut si due pluresve accessiones eodem die veniunt. Quæ res efficit, vt & à primo die protinus cibis dari quotidie debeat. Si protinus venie conciderunt, & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde vis corpori deest, illud tamen

tamen in his seruandum est, vt post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum verò febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur, scire licet, optimum cibo tempus esse febre finita: deinde cum decessio eius consistit: tertium si necesse est, quandoque decedit, cetera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas vrget, satius esse consistente iam incremento febris aliquid offerre, quàm increscente. Satius esse instante, quàm incipiente: cum eo tamen, vt nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neque Hercule satis est, ipsius tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, & ad eum dirigere curationem, seu supersunt vires, seu desunt, seu quidam mali affectus interueniunt. Cum verò semper agros securos agere conueniat, vt corpore tantum, non etiam animo laborent, tum precipuè, vbi cibum sumpserunt. atque si qua sunt, quæ exasperatura eorum animos sunt, optimum est, * ea dum agrotant eorum * eadem notitia subtrahere. Si id fieri non potest, sustine- agrotan- re tamen post cibum vsque somni tempus, & tium no- cum experrecti sunt, tum exponere. titia sub.

Quando potiones febricitantibus dari expediat.

CAP. VI.

Sed de cibo facilior quidem cum aegris ratio est, quorum saepe stomachus hunc respuit, etiam si mens concupiscit. De potione verò in-

i

gens

gens pugna est, eoq; magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accedit, et tum maxime aquam exigit, cum illa periculosissima est. Sed docendus æger est, ubi febris conquieverit, protinus sitim quoq; quieturam, longioremq; accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum. Ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit. Necesse est tamen quanto facilius etiam sani famem, quam sitim sustinent, tanto magis ægris in potione, quam in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet, nisi subito sic venæ conciderunt, ut cibus quoq; dari debeat. Secundo verò, ceterisq; etiam, quibus cibus non dabitur, tamen si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidem ab Heraclide Tarentino dictum ratione caret, ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet, expedire quoq; per medicas potiones misceri novam materiam corruptæ. Illud videndum est, ut qualia tempora cibo leguntur, talia potioni quoq; : ubi sine illo datur, deligantur, aut cum ægrum dormire cupiemus. Quod ferè sitis prohibet. Satis autem convenit, cum omnibus febricitantibus, nimius humor alienus sit, tum præcipue esse fœminis, quæ ex partu in febres inciderunt. Sed cum tempora cibo potioniq; febris & remissionis ratio det, non est expeditissimū scire quando æger febricitet, quando melior sit, quando deficiat. Sine quibus dispensari illa non possunt.

Venarum pulsus. Venis enim maxime credimus fallacissimæ rei, quia sepe istæ leniores, celerioresve sunt, & atate

ætate & sexu, & corporum natura. Et plerunq;
 satis sano corpore, si stomachus infirmus est, non-
 nunquam etiam incipiente febre subeunt et qui-
 escunt, ut imbecillus is videri possit, cui facile
 laturo grauis instat accessio. Contra sæpe eas
 concitat, & resoluit sol, & balneum, & exerci-
 tatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi
 affectus, adeo, ut cum primum medicus venit,
 sollicitudo ægri dubitantis quomodo ille se habe-
 re videatur, eas moueat. Ob quam causam peri-
 ti medici est, non protinus ut venit apprehendere Officium
medici.
 manu brachium, sed primum residere hilari uul-
 tu, percunctariq; quemadmodum se habeat, & si
 quis eius metus est, eum probabili sermone leni-
 re, tum deinde eius corpori manum admouere.
 Quas venas autem conspectus medici mouet,
 quam facile mille res turbant. Altera res est, cui
 credimus calor, æque fallax. Nam hic quoq; ex-
 citatur æstu, labore, somno, metu, sollicitudine.
 Igitur intueri quidem etiam ista oportet. Sed his
 non omnia credere, ac protinus quidem scire non
 febricitare eum, cuius venæ naturaliter ordinatæ
 sunt, teporq; talis est, qualis esse sanis solet. Non
 protinus autē sub calore motuq; febrem sese con-
 cipere, sed ita, si summa quoq; arida inæqualiter
 cutis est, si calor et in fronte est, & ex*imis præ*intimis
 cordijs oritur, si spiritus ex naribus cum feruore
 prorumpit, si color aut rubore, aut pallore nouo
 mutatus est, si oculi graues, & aut persicci, aut
 subhumidi sunt, si sudor cum sit, inæqualis est, si
 i 2 venæ

venæ non æquis intervallis mouentur. Ob quam causam medicus neq; in virebris, neq; à capite ægri debet residere, sed illustri loco aduersus eum, vt omnes notas ex vultu quoq; cubantis perspiciat. Vbi verò febris fuit, atq; decreuit, expectari oportet, num tēpora, partes'ue corporis aliæ paulum madescant, quæ sudorem venturum esse testentur. Ac si qua nota est, tunc demū dare potius calidam aquam, cuius salubris effectus est, si sudorē per omnia membra diffundit. Huius autem rei causa continere æger sub veste satis multa manus debet, eademq; crura, pedesq; contegere, qua male plerique ægros in ipso impetu febris, pessimeq; vbi ardens ea est, male habent. Si sudare corpus cœpit, linteū tepescere oportet, paulatimq; singula membra detergere. At vbi sudor omnis finitus est, aut si is nō venit, vbi quàm maxime potuit, idoneus esse cibo æger videtur, sub veste leniter vngendus est, tum detergendus, deinde ei cibus dandus. Cibus autem febricitantibus humidus est aptissimus, aut humori certe quàm proximus, vtiq; ex materia quàm leuissima, maximeq; sorbitio, eaq; si magnæ febres fuerunt, quàm tenuissima esse debet. Mel quoq; despumatum huic rectè adijcitur, quo corpus magis nutriatur: sed id, si stomachū offendit, superuacuum est, sicut ipsa quoq; sorbitio. Dari verò in vicem eius potest, vel intrita ex aqua calida, vel alica elota, si firmus est stomachus: & compressa aluus ex aqua mulsæ: si vel ille languet, vel

vel hæc profluit, ex posca. Et primo quidem cibo ita satis est: secundo verò aliquid adijci potest, ex eodẽ tamen genere materia vel olus, vel chylum, vel pomum. Et dum febres quidem increscunt, hic solus idoneus cibus est. Vbi verò aut desinunt, aut leuantur, semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima: adijciendum verò aliquid ex media, ratione habita subinde & virium hominis & morbi. Ponendi verò ægro varij cibi (sicut Asclepiades præcepit) tum demum sunt, vbi fastidio vrgetur, neq; satis vires sufficiunt, vt paulum ex singulis degustando famem vitet. At si neq; vis, neq; cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus æger est, ne plus assumat, quàm concoquat. Neq; verũ est, quod ab eo dicitur, facilius concoqui cibos varios: eduntur enim facilius, ad concoctionẽ autem materia, genus & modus pertinent. Neque inter magnos dolores, vt neq; increscente morbo tutũ est ægrũ cibo impleri, sed vbi inclinata iam in melius valetudo est. Sunt alie quoq; obseruationes in febribus necessariae, atque id quoq; videndum est, quod quidam solum præcipiunt, an astrictum corpus sit, an profluat: quorũ alterum strangulat quod continet, alterum digerit. Nam si astrictum est, ducenda aluius est, mouenda vrina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodest.

dest. Vtile est etiam ducere in balneum, prius demittere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, multaq; aqua fouere inguina, interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere, uti cibo rarius & serius tenui, simplici, molli, calido, exiguo, maximeq; oleribus, qualia sunt, lapathum, urtica, malua, vel iure etiam concharum, muscutorum'ue, aut locustarum, neq; danda caro, nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc ultra quam sitis coget. Poteritq; à balneo etiam pinguius aut dulcius dari vinum, poterit semel aut bis interponi Græcum salsum. Contra verò si corpus profluet, sudor coërcendus, quies adhibenda erit, tenebris, somnoq; quodcumq; volet utendum, non nisi leui gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subueniendum. Nam si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decreuit, liberaliter oportet aquam tepidam potui dare, & vomere cogere, nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet, aut uetus morbus est. Si vero sudor exercet, duranda cutis est vel nitro, vel sale, quæ cum oleo miscentur. At si leuius id vitium est, oleo corpus ungendum est: si vehementius, rosa vel melino, vel myrteo, cui vinum austerum sit adiectum. Quisquis autem fluore ager est, cum venit in balneum, prius ungendus, deinde in solium demittendus est. Si incute uitium est, frigida quoque, quam calida aqua melius utetur. Vbi ad cibum ventum est, dari

dari debet is valens, frigidus, siccus, simplex, qui quàm minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, vinum asperum, vel certè subausterrum. Si venter profuit, calidum: si sudores nocent, vomitusq; sunt, frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant.

C A P. VII.

Desiderat etiam propriam animaduersionem in febribus pestilentiae casus. In hanc minime vtile est, aut fame, aut medicamentis vti, aut ducere aluum. Si vires sinunt, sanguinem mittere optimum est, præcipueq; si cum dolore febris est. Si id parum tutum est, vbi febris aut tenuata est, aut leuata est, vomitus pectus purgare. Sed in hoc maturius, quàm in alijs morbis, ducere in balneum opus est, vinum calidum & meracius dare, & omnia glutinosa. Inter quæ quoque carnem generis eiusdem. Nam quo celerius eiusmodi tempestates corripiunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate rapienda sunt. Quod si puer est qui laborat, neq; tantum robur eius est, vt sanguis mitti possit, siti ei vtendum est, ducenda aluus, vel aqua, vel ptisanæ cremore, tum demum is leuibus cibis nutriendus. Et ex toto, non sic pueri, vt viri curari debent. Ergo, vt in alio quoque genere morborum, parcius in his agendum est. Non facile sanguinem mittere, non facile ducere aluum, non cruciare vigilia, fame'ue, aut nimia siti, non uino curare satis conuenit. Vomitus post febrem eliciendus est, deinde

i 4 dand

dandus cibus ex lenissimis, tum is dormiat: postero quoque die si febris manet, abstineatur. Tertio ad similem cibum redeat. Dandaq; opera est, quantum fieri potest, ut inter opportunam abstinentiam cibosq; opportunos, obmissis ceteris nutriatur. Si verò ardens febris extorret, nulla medicamenti danda potio est, sed in ipsis accessionibus, oleo & aqua refrigerandus est, quæ miscenda manu sunt donec albescant, & conclavi tenendus, quò multum & purum aërem trahere possit, neq; multis vestimentis strangulandus, sed admodum lenibus tantum velandus est. Possunt etiam super stomachum imponi folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est, alendus maturius est, id est, à die tertio, & ante cibum ipsdem perungendus. Si pituita in stomacho coit, inclinata iam accessione, vomere cogendus est, & tunc dandum frigidum olus, aut pomum ex his, quæ stomacho conueniunt. Si siccus manet stomachus protinus vel ptisanæ, vel alicæ, vel oryzae cremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum verò in summo incremento morbus est, utiq; non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiam ultra satietatem: & cum iam venter & præcordia ultra modum repleta, satisq; refrigerata sunt, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida tantum ad satietatē data pro medicamento vtuntur. Vbi utramlibet factum est,

est, multa veste operiendus est, & collocandus ut dormiat. Fereq; post longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem plenus somnus venit, per quem ingens sudor effunditur, idq; presentissimum auxilium est. Sed in his tamen, in quibus præter ardorem, nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibens, vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus, non ulcus, non deiectio, non profluvium alui fuit. Si quis autem in huiusmodi febre leuiter tussit, is neq; vehementi siti conflictatur, neq; bibere aquam frigidam debet, sed eo modo curandus est, quo in cæteris febribus præcipitur.

Curatio semitertianæ febris, quæ hemitritæos dicitur.

CAP. VIII.

A Trbi id genus tertianæ est, quod hemitritæon Medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerunq; frequentiores accessiones, decessionesq; ut aliud morbi genus uideri possit: porrigitq; febris inter horas vigintiquatuor et triginta sex, ut quod idē est, non idem esse uideatur. Et magnopere necessariū est, neq; dari cibū, nisi in ea remissione, quæ uera est: & ubi ea uenit, protinus dari, plurimiq; sub alterutro curantis errore subito moriuntur: ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet, tum dari cibus, qui neq; incitet febrem, & tamen longū eius spatium sustineat.

Curatio lentarum febrium CAP. IX.

N Onnunquam etiam lentæ febres sine ulla
i 5 remiss

remissione corpus tenent, ac neq; cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet. Fortasse enim curationi opportunior fiet. Sape igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectum, corpus eius pertractandum est, quoniam interdum sic euenit, ut horror oriatur, & fiat initium quoddam noui motus, exq; eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoq; ex oleo & sale salubris uidetur. At si diu frigus est & torpor, & iactatio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos, uel cum cibo uinum bene dilutum. Intenditur enim saepe ex eo febris, & maior ortus calor, simul & priora mala tollit, & spem remissionis in ea curatione ostendit. Neque hercules ista curatio noua est, qua nunc quidam traditos sibi egros (qui sub cautiore medicis trahebantur) interdum contrarijs remedijs sanant. Siquidem apud antiquos quoq; ante Herophilum & Erasistratum, maximeq; post Hippocratem fuit* πέρπων quidam, qui febricitantem hominem, ubi acceperat, multis uestimentis operiebat, ut simul calorem ingentem, sitimq; excitaret. Deinde ubi paulum remitti coeperat febris, aquam frigidam potui dabat: ac si mouerat sudorem, explicuisse se egro indicabat: si non mouerat, plus etiam aquae frigidae ingerebat, & tum uomere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat, protinus suillam assam, & uinum homini dabat. Si non liberauerat, decoq

decoquebat aquam sale adiecto, eamq; bibere cogebat, vt mouendo ventrem purgaret. Et intra hæc omnis eius medicina erat. Eaq; non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores non refecerant, quàm nunc est his quos Herophili, vel Erasistrati æmuli, diutraculos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina, quia plures, si protinus à principijs exceperit, interemit. Sed cùm eadem omnibus conuenire non possint, ferè quos ratio non restituit, temeritas adiuuat. Ideoq; eiusmodi medici melius alienos egros, quàm suos nutriunt. Sed est circumspecti quoq; hominis, & nouare interdum, & augere morbum, & febres accendere, quia curationem vbi id quod est non recipit, potest recipere id quod futurum est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, & precordiorum inflammationem, & ariditatem, & scabritiem linguæ.

C A P. X.

Considerandū etiam est febres'ne sole sint, an alia his quoque mala accedant: id est, num caput doleat, num lingua aspera, num præcordia intēta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, & in id ingerere, deinde habere duo pitacia, quæ latitudinem frontis longitudinemq; æquent. Ex his inuicem alterum in aceto & rosa habere, alterū in fronte, aut intinctā iisdem lanam succidam imponere. Si acetum offendit, pura rosa vtendum est. Si rosa ipsa lædit, oleo acerbo: si ista parū iuuant, teri potest
vel

vel iris arida, vel nuces amarae, vel qualibet herba ex refrigerantibus. Quorum quilibet ex aceto impositum dolorem minuit, sed magis aliud in alio. Iuuat etiam panis cum papauere iniectus, vel cum rosa, cerussa, spuma ue argenti. Olfacere quoq; vel serpyllum, vel anethum non alienum est. At si in praecordijs inflammatio & dolor est, primò superimponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint, plus eò materiae concurrat. Deinde ubi prima inflammatio se remisit, tunc demum ad calida & humida veniendum est, ut ea quae remanserint, discutiant. Notae verò inflammationis sunt quatuor, rubor & tumor, cum calore & dolore. Quo magis errauit Erasistratus, qui febrem nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est, nihil imponendum est. Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neq; inflammatio, neq; febris, sed tantum praecordiorum dolor est, protinus calidis & siccis fomentis uti licet. Si verò lingua sicca est, & scabra, detergenda primum penicillo est ex aqua calida. Deinde ungenda mistis inter se rosa & melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulq; siccescere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterisa est, ungi rosa debet, cui cera sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febrem praecedit.

C A P. X I.

Solet etiā ante febres esse frigus, idq; vel molestissimū morbi genus est. Vbi id expectatur,

tur, omni potione prohibendus ager est. Hæc enim paulo antè data multum mali adijcit. Item maturius veste multa tegendus est: admouenda partibus his, pro quibus metuimus, sicca & calida fomenta, sic, ne statim vehementissimi calores incipiant, sed paulatim increcant. Perfricandæ quoq; eæ partes manibus vnctis ex vetero oleo sunt, eiq; adijciendum aliquid ex calefacientibus. Contentiq; medici quidã vna frictione etiam ex quolibet oleo sunt. In harum febrium remissionibus, nonnulli tres aut quatuor sorbitionis cyathos, etiamnum vltra manente febre, dant. Deinde, ea bene finita, reficiunt stomachũ cibo frigido, & leni. Ego tum hoc puto tentandum, cum parum cibus semel, & post febrem datus prodest. Sed curiose perspicendum est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoque genere valetudinis iam minui febris videtur, & rursus intenditur. Itaque ei remissioni credendũ est, quæ etiam immoratur, & iactationem fœtoremq; quendam oris (quem ὄζυς Græci vocant) minuit. Illud satis cõuenit, si quotidie pares accessiones sunt, quotidie paruum cibum dandum: si impares, post grauiorem cibum, post leuiorem, aquam mulsam.

Curatio horroris in febribus. C A P. XII.

Horror autẽ eas ferè febres antecedit, quæ certum habent circuitũ, & ex toto remittuntur. Ideoq; tutissimæ sunt* maximè quæ cu* maximæ rationes admittunt. Nam vbi incerta tempora meq; curantur,

sunt, neq; alui ductio, neq; balneum, neq; vinum, neq; medicamentum aliud recte datur. Incertum est enim quando febris ventura sit: ita fieri potest, ut si subito venerit, summa in eo pernicies sit, quod auxilij causa sit inuētum. Nihilq; aliud fieri potest, quam ut primis diebus bene abstinere ager, deinde sub decessu febris eius, quæ grauiissima est, cibum sumat. At ubi certus circuitus est, facilius omnia illa tentantur, quia facilius proponere nobis et accessionum et decessionum vices possumus. In his autem cum veterauerunt, utilis fames non est. Primis tantummodo diebus ea pugnandum est, deinde diuidenda curatio est, et ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, et ex horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidam Vomitus. aquam, subsalsam, et vomere eum cogere. Nam ferè talis horror ab his oritur, quæ biliosa in stomacho resederunt. Item faciendū est, si proximo quoq; circuitu equè cessit. Sæpe enim sic discutitur. Iamq; quod genus febris sit, scire licet. Itaq; sub expectatione proximæ accessionis, quæ instare tertia potest, deducendus in balneū est, dandaq; opera est, ut per tempus horrores in solio sit. Si ibi quoq; senserit, nihilominus idem sub expectatione accessionis quartæ faciat, siquidem eo quoq; modo sæpe id discutitur: si nec balneū quidem profuit, ante accessionē allium edat, aut bibat calidam aquam cum pipere, siquidem ea quoque assumpta calorem mouent, qui horrorem
non

non admittit. Deinde eo modo, quo in frigore preceptum est, antequam inhorrescere possit, operiatur. Fomentisq; protinus validioribus totum corpus circundare conuenit, maximeq; inuolutis extinctis testis & titionibus. Si nihilominus horror perruperit, multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta perfundatur, cui equè ex calefacientibus aliquid sit adiectum, abhibeaturq; frictio, quantam is sustinere poterit, maximeq; in manibus & pedibus, & spiritum ipse contineat, neque desistendum est etiam si horror est. Sæpe enim pertinacia iuuantis, malum corporis vincit. Si quid euomuit, dāda aqua tepida, iterumq; vomere cogendus est, utendumq; eisdē est, donec horror finiatur. Sed præter hæc, ducenda alius est, si tardius horror quiescet: siquidem id quoque exonerato corpori prodest. Ultima quoque post hæc auxilia sunt, gestatio & frictio. Cibus autem in eiusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem aluum præstet, caro glutinosa, vinum cum dabitur austerum.

Curatio quotidianæ febris. C A P. XIII.

Hæc ad omnes circuitus febrium pertinent, discernenda tamen singule sunt, sicut rationem habent dissimilem. Si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet, tum cibus altero quoq; die uti. Si res inueterauerit, post febrem experiri balneum & vinum, magisq; si horrore sublato hæc superest.

Curat

SI tertiana verò, quę ex toto intermittit, aut quartana est, medijs diebus & ambulationibus vti oportet, alijsq; exercitationibus & vñtionibus. Quidam ex antiquioribus medicis Cleophrantus, in hoc genere morborum, multo ante accessionem caput ægri multa calida aqua perfundebat, deinde vinum dabat. Quod quamvis pleraq; eius viri pręcepta secutus est Asclepiades, recte tamen pręterijt. Est enim anceps. Ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionem dicit aluum duci oportere, quinto post horrorem vomitum elicere, deinde post febrem (sicut illi mos erat) adhuc calidis dare cibum, & vinum. Sexto die in lectulo detineri. Sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse verisimile est. Tutius tamẽ est vt ipso ordine vtamur. Tria remedia, vomitus, alui ductio, vini potus per triduum, id est, die tertio, & quinto, & septimo tentare, nec vinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si verò primis diebus discussus morbus non est, inciditq; in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat, post febrem perfricetur, tum cibo assumpto bibat aquam: postero die, quo cibo vacat & ab exercitatione vñtioneq; aqua tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. Si verò imbecillitas vrgebit, & post febrem vinum, & medio die paulum cibi debeat assumere.

Curat

Curatio quartanę febris.

CAP. XV.

EAdem in quartana facienda sunt. Sed cum hæc tarde admodum finiatur, nisi primis diebus discussa est, diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaquæ desit, eodem die, et postero tertioquæ; continere se debet, et aquam tantummodo calidam primo die post febrē sumere, bi- duo proximo, quantum fieri potest, ne hanc quidem. Si quarto die cum horrore febris reuertitur, vomere, sicut antè præceptum est: deinde post febrē modicum cibum sumere, vini quadrantem. Postero tertioquæ; die abstinere, aqua tantummodo calida (si sitiet) assumpta: septimo die balneo frigus præuenire, abstinere, continere se debet, et aqua tantummodo calida, si sitiet: actum ita* septimo die balneo frigus præuenire: si febris *non redierit, ducere aluum: ubi ex eo corpus coquieverit, inunctione vehementer perfricari, eodem modo sumere cibum, et vinum bi duo proximo se abstinere, frictione seruata: decimo die rursus balneum experiri: et si postea febris accessit, æquè perfricari, vinum copiosius bibere: ac si proximum est, quies tot dierum, ut abstinentia cum cæteris quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si verò nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum est curationis genus. Idquæ; agendum, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quominus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducendam aluum,

k deinde

deinde abstinendum vsq; in septimum diem dixit. Quod vt sustinere aliquis possit, tamē etiam febre liberatus vix refectioni valebit. Adeo si febris saepius accesserit, concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit, balneum neq; ante febrem, neque post eam tentandum erit, nisi interdum iam horrore discusso. Horror ipse per eadem quae supra praescripta sunt, expugnandus. Deinde post febrem oportebit vngi, & vehementer perfricari, cibum & validum & fortiter assumere, vino vti quantumlibet, postero die cum satis quieverit, ambulare, exerceri, vngi, perfricari fortiter, cibum accipere sine vino. Tertio die abstinere. Quo die verò febrem expectabit, antè surgere, & exerceri: dareq; operam non oportet, vt in ipsam exercitationē tempus febris incurrat. Sic enim saepe illa discutitur. At si in opere occupauit, tum demum se recipere. In eiusmodi valetudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, vinum. Si vter astrictus est, soluendus est. Sed haec facile validiores faciunt, si imbecillitas occupauit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est: si hac quoque vehemens onerat, intra quietem, & vctionē, & cibum sistendum est, dandaq; opera est, ne qua cruditas in quotidianam id malum vertat. Nam quartana neminem iugulat, sed si ex ea facta quotidiana est, in malis ager est. Quod tamē nisi

*nunquā culpa vel agri vel curantis * nonnunquam fit.

Curatio

Curatio duarum quartanarum. CAP. XVI.

A Tsi duæ quartanæ sunt, neq; hæ, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt, aut ex toto quiescere opus est: aut si id difficile est, leuiter ambulare, considerare diligenter inuolutis pedibus & capite. Quoties febris accessit et desit, cibum modicum sumere & vinum: reliquo tempore nisi imbecillitas urget, abstinere. Aut si duæ febres penè iunguntur, post utranq; cibum sumere. Deinde vacuo tempore & moueri aliquid, & post unctionē cibo uti. Cum verò vetus quartana raro, nisi vere soluatur, utiq; eo tempore attendendum est, ne quid fiat, quod valetudinem impediatur. Prodestq; in vetere quartana mutare subinde victus genus, à vino ad aquam, ab aqua ad vinum, à lenibus cibis ad acres, ab acris ad lenes transire, esse radicē, deinde vomere, iure'ne pulli gallinacei ventrem resolvere, oleum ad frictiones adycere, calefacientia ante accessionē sorbere, vel aceti cyathos duos, vel unum synapis, cum tribus Græci vini falsi, vel mista paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, laser, myrrham. Per hæc enim similiaq; corpus agitandum est: ut moueatur ex eo statu quo detinetur. Si febris quieuit, diu meminisse eius diei conuenit, eoq; vitare frigus, calorem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim reuertitur, nisi à sano quoq; aliquandiu timetur.

Curatio quotidianæ febris, quæ ex quartana facta sit.

CAP. XVII.

k 2 At

AT si ex quartana quotidiana facta est, cum id vitio inciderit, per biduum abstinere oportet, frictione uti, aquam tantummodo vesperi potui dare, tertio die saepe fit, ne febris accedat, sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessionis tempus est dandus: at si manet, per biduum abstinentia, quanta maxime imperari corpori potest, frictione quotidie utendum est.

De tribus insaniae generibus, & primo de eius curatione, quae à Græcis *φρενιτις* dicitur.

C A P. XVIII.

ET febriū quidem ratio exposita est. Super-sunt verò alij corporis affectus, qui huic superueniunt, ex quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt, protinus iungam. Incipiam ab insania, primamq; huius ipsius partem aggrediar, quae & acuta, & in febre est, Græci *φρενιτις* appellant. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione egros desipere, & loqui aliena. Quod non quidē leue est, neq; incidere potest, nisi in febre vehementi, non tamen aequè pestiferum est. Nam plerunq; breue esse consuevit, leuatoq; accessionis impetu, protinus mens redit. Neq; id genus morbi remedium aliud desiderat, quam quod in curanda febre præceptum est. Phrenitis verò tum demum est, cum continua dementia esse incipit, aut cum aeger quamuis adhuc sapiat, tamen quasdam vanas imagines accipit: perfecta est, ubi mens illis imaginibus adiecta est. Eius autem plura genera sunt. Siquidē
ex

Phrenitis.

ex Phreneticis alij hilares, alij tristes sunt, alij
faciliter continentur, & intra verba desipiunt,
alij consurgunt, & violenter quædam manu fa-
ciunt: atq; ex his ipsis alij nihil nisi impetu pec-
cant, alij etiam artes adhibent, summamq; spem
sanitatis in captandis maiorum operum occasio-
nibus præbent, sed exitu deprehenduntur. Ex
his autem eos qui intra verba desipiunt, aut le-
uiter etiam manu peccant, onerare asperioribus
coërcitionibus superuacuum est. Eos verò, qui
violentius se gerunt, vincire cōuenit, ne vel alte-
ri vel sibi noceant. Neq; credendum est, si vin-
ctus aliquis, dum leuari vinculis cupit, sanū iam
se fingat, quamuis prudēter & miserabiliter lo-
quatur, quoniam is dolus insanientis est. Ferè
verò antiqui tales ægros in tenebris habebant,
eò quòd eis contrarium esset exterreri, & ad
quietē animi tenebras ipsas conferre aliquid iu-
dicabant. At Asclepiades, tanquā tenebris ipsis
terrentibus, in lumine habendos esse dixit: neu-
trum tamen perpetuum est. Alium enim lux,
alium tenebræ magis turbant, reperiunturq; in
quibus nullum discriminē deprehendi vel hoc, vel
illo modo possit. Optimum itaq; est vtrunq; expe-
riri, & habere eum, qui tenebras horret, in luce,
eum qui lucem, in tenebris. At vbi nullum tale
discrimen est, æger si vires habet, loco lucido, si
non habet, obscuro cōtinendus est. Remedia verò
adhibere, vbi maxime furor vrget, superuacuum
est: simul enim febris quoque increscit. Itaque

tum nihil nisi continendus ager est. Vbi verò res patitur, festināter subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinē mitti, ac si trucidentur: rationem hanc secutus, quòd neq; insania esset, nisi febre intenta: neq; sanguis, nisi in remissione eius rectè mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictiōe quæsiuit, cum & intentio febris somnū impediāt, & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaq; hoc quoq; auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo rectè fiunt, aliās omittenda. Et cōtinuata quoq; febris habet tempora, quibus etsi non remittit, non tamen crescit. Est q; hoc, ut non optimum, sic tamen secundum remedi*genus. Quod si vires agri patiantur, sanguis quoq; mitti debet. Nec minus deliberari potest, an aliud ducenda sit, tum interposito die conuenit caput ad cutem tondere, deinde aqua fouere, in qua verbenæ aliquæ decoctæ sint, vel ex reprimentibus: aut prius fouere, deinde tondere et iterum fouere, ac nouissime rosa caput naresq; implere, offerre etiam naribus rutam, ex aceto contritam, mouere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Quæ tamen facienda sunt in his, quibus vires non desunt. Si verò imbecillitas est, rosa tantum caput, adiecto serpyllo, similiq; aliquo madefaciendum est. Vtiles etiam in quibuscunq; viribus herbæ duæ sunt, Solanum & Muralis, simul ex utraq; succo expresso caput impleatur. cum se febris remiserit, frictiōe
utendum

*tempus

utendum est, parcius tamen in his, qui nimis
hilaris, quam in his qui nimis tristes sunt. Ad-
uersus omnium autem sic insanientium animos,
gerere se pro cuiusq; natura necessariū est. Quo-
rundam enim vani metus leuandi sunt, sicut in
homine prædiuite famem timente *accidit, cui *incidit
subinde falsæ hereditates nuntiabantur. Quo-
rundam audacia coercenda est, sicut in his fit, in
quibus continendis plagæ quoque adhibentur.
Quorundam etiam intempestiuus risus & ob-
iurgatione & minis prohibendus est. Quorun-
rundam discutiendæ tristes cogitationes, ad quod
symphonie, & cymbala, strepitusq; proficiunt.
Sæpius tamen assentiendum, quam repugnan-
dum est, paulatimq; & non euidenter ab his,
quæ stultè dicuntur, ad meliora mens eius abdu-
cenda est. Interdum etiam elicienda ipsius in-
tentio, ut fit in hominibus studiosis literarum,
quibus liber legitur, aut rectè, si delectantur, aut
perperam, si id ipsum eos offendit. Emendando
enim, conuertere animum incipiunt. Quinetiam
recitare, si qua meminerunt, cogendi sunt. Ad
cibum quoq; quosdam non desiderantes reduxe-
runt hi, qui inter epulantes eos collocauerunt.
Omnibus verò sic affectis, somnus & diffici-
lis, & præcipuè necessarius est. Sub hoc enim
pleriq; sanescunt. Prodest ad id, atq; etiam ad
mentem ipsam componendam, crocinum vn-
guentum cum irino in caput datum. Si nihilomi-
nus vigilant hi, quidam somnū moliuntur, potui

dando aquam, in qua papauer, aut hyoscyamos decocta sit: alij mandragoræ mala puluino subiiciunt, alij vel amomum, vel sycamini lacrymam fronti inducunt. Hoc nomen apud medicos reperio. Sed cum Græci morum sycaminum appellant, mori nulla lacryma est. Sic verò significatur lacryma arboris in Aegypto nascentis, quam ibi morosycon appellant. Plurimi decoctis papaueris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os, & caput fouent. Asclepiades ea superuacua esse dixit, quoniam in lethargum sæpe * conuerterent. Præcipit autem ut primo die à cibo, potione, somno abstineretur, respere ei daretur potui aqua, tunc frictio admoventur lenis, ita ut ne manum quidem qui fricaret, vehementer imprimeret: postero deinde die ejusdem omnibus factis, resperi ei daretur sorbitio * ex aqua, rursusq; frictio adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidē adeo, ut illo consistente nimia frictio etiā lethargi periculū afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis accersendus est, habita scilicet eadem moderatione, quæ hic quoq; necessaria est, ne quē obdormire volumus, excitare postea non possimus. Confert etiam aliquid ad somnū * Silanius Georgius iuxta cadens, vel gestatio post cibum & noctu, Val. Sila- maximeq; suspēsi lecti motus. Neq; alienum est, nū pro ri- si neq; sanguis antè missus est, neq; mens con- no expo- stat, neq; somnus accedit, occipitio inciso cucur- bitulam

* compel-
lerent.

* & aqua

* saliens
Georgius
Val. Sila-
nū pro ri-
no expo-
nit.

bitulam ad mouere. Quæ quia leuat morbum, potest etiam somnum facere. Moderatio autem in cibo quoq; adhibenda. Nam neq; implendus eger est, ne insaniat, neq; ieiunio utiq; vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeq; sorbitione, portione aquæ mulsæ, cuius ternos cyathos bis hyeme, quater æstate dedisse satis est. Alterum genus insanie est, quod spatium longius recipit, quia ferè sine febre incipit, leues deinde febriculas excitat, & consistit in tristitia, quam videtur bilis atra contrahere. In hac utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est abstinentia, secunda per album veratrum vomitumq; purgatio, post utrumlibet adhibenda bis die frictio est. Si magis valet, frequens etiam exercitatio. In ieiunio vomitus, cibus sine vino dandus ex media materia est. Quam quoties posuero, scire licet etiam ex infirmissima dari posse, dum ne ea sola quis utatur, valentissima tantummodo esse remouenda. Præter hæc seruanda alius est quam tenerrima, remouendi terrores, et potius bona spes asserenda, querenda delectatio ex fabulis ludisq;, quibus maxime capi sanus assueuerat. Laudanda si qua sunt ipsius opera, & ante oculos eius ponenda. Leuiter obiurganda vana tristitia. Subinde admonendus in his ipsis rebus, quæ sollicitant, cur non potius letitie, quam sollicitudinis causa sit. Si febris quoq; accessit, sicut aliæ febres curanda est.

k s Terti

Tertium insanie genus est ex his longissimum, adeo ut vitam ipsam non impediat, quod robusti corporis esse consuevit. Huius autem ipsius species duæ sunt. Nam quidam imaginibus, non mente falluntur, qualem insanientem Aiacem vel Orestem poetarum fabula ferunt; quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt, ante omnia videndum est, tristes an hilares sint. In tristitia nigrum veratrum deiectionis causa, in hilaritate album, ad vomitum excitandum dari debet. Idque si in potione non accepit, pani adijciendum est, quo facilius fallat. Nam si bene se purgauerit, ex magna parte morbum lenabit. Ergo etiam si semel datum veratrum, parum profecerit, interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare oportet, leuiorem esse morbum cum risu, quam serio insanientium. Illud quoque perpetuum in omnibus morbis, ubi ab inferiore parte purgandus aliquis est, venter eius ante solvendum esse: ubi à superiore, comprimendum. Si vero consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optime curatur. Vbi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, vinculis, plagis coercendus est. Cogendus est et attendere, et ediscere aliquid, et meminisse. Sic enim fiet, ut paulatim metu cogatur considerare quid faciat. Subito etiam terreri et expauescere, in hoc morbo prodest. Et ferè quicquid animum vehementer perturbat. Potest enim quædam fieri mutatio, cum ab eo statu mens in quo fuerat, abducta est. Interest

cerest etiam si ipse sine causa subinde rideat, an
maestus, dimissusq; sit. Nam dementis hilaritas
terroribus his (de quibus supra dixi) melius cu-
ratur. Si nimia tristitia est, prodest lenis, sed
multa bis die frictio. Item per caput aqua frigi-
da infusa, demissumq; corpus in aquam & o-
leum. Illa communia sunt, insanientes vellemen-
ter exerceri debere, multa frictioe uti, neq; pin-
guem carnem, neq; vinum assumere, cibis uti
post purgationem ex media materia quam le-
uissimis. Non oportere esse vel solos, vel inter
ignotos, vel inter eos, quos aut contemnant, aut
negligant, mutare debere regiones, & si mens
redit, annua peregrinatioe esse iactandos. Raro,
sed aliquando tamen, ex metu delirium nasci-
tur. Quod genus insanientium specie similiq; vi-
ctus genere curandum est, praeterquam quod in
hoc insanie genere solo recte vinum datur.

Cardiaci morbi curatio.

CAP. XIX.

Hic morbo praecipue contrarium est id ge-
nus, quod Cardiacum à Græcis nomina-
tur, quamvis saepe ad eum phrenetici transeunt.
Siquidem mens in illis labat, in hoc constat. Id
autem nihil aliud est, quam nimia imbecillitas
corporis, quod stomacho languente, immodico su-
dore digeritur. Licetq; protinus scire id esse, ubi
venarum exigui, imbecilliq; pulsus sunt. Sudor
autem supra consuetudinē, & modo & tempo-
re, ex toto thorace & cervicibus, atq; etiam ca-
pite prorumpit, pedibus tantummodo & cruri-
bus

bus siccioribus atq; frigentibus. At ubi id mor-
bi genus est, curatio prima est, supra præcordia
imponere quæ reprimant cataplasmata: secunda,
sudorem prohibere. Id præstat acerbum oleum
vel rosa, vel melinum aut myrteum. Quorum a-
liquo corpus leuiter perungendum, ceratumq; ex
aliquo horum tum imponendū est. Si sudor vin-
cit, delinendus homo est, vel gypso vel argenti
spuma, vel cimolia creta, vel etiam subinde ho-
rum puluere respergendus. Idem præstat puluis
ex contritis aridi myrti vel rubi folijs, aut ex
austeri, & boni vini arida sece. Pluraq; similia
sunt, quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex via
puluis iniectus. Super hæc verò quo minus cor-
pus insudet, leui veste debet esse contactus, loco
non calido, fenestris patentibus, sic, ut perflatus
quoq; aliquis accedat. Tertium auxilium est im-
becillitati iacentis, vino ciboq; succurrere. Cibus
non multus quidem, sed sæpe tamen nocte ac die
dandus est, ut nutriat, neq; oneret. Is esse de-
bet ex infirmissima materia, et stomacho aptus.
Nisi autem necesse est, ad uinum festinare non
oportet. Si verendum est ne deficiat, tum & in-
trita ex hoc, & hoc ipsum austerum quidem,
sed tamen tenue meracum. Egelidum subinde et
liberaliter dandum est adiecta polenta, si modo
is aeger parum cibi assumit. Idq; vinum esse de-
bet, neq; nullarum virium, neq; ingentium: recteq;
tota die ac nocte, vel tres heminas aeger bibet.
Si vastius corpus est, plus etiam. Si cibum non
accipit,

accipit, perunctum antè perfundere aqua frigida conuenit, & tum dare. Quòd si stomachus resolutus parum continet, et ante cibum & post eum sponte vomere oportet, rursusq; post vomitum, cibum sumere. Si ne id quidem manserit, sorbere vini cyathum, interpositaq; hora sumere alterum: si id quoq; stomachus reddiderit, totum corpus bulbis contritis superillinendum est. Qui ubi inaruerunt, efficiunt, ut vinum in stomacho contineatur, exq; eo toti corpori calor, venisq; vis redeat. Vltimum auxilium est, in aluum ptisanæ vel alicæ cremorem ex inferioribus partibus ^{*indere}, siquidem id quoq; vires tuetur. ^{*inijcere} Neq; alienum est, naribus quoq; æstuantis ad-mouere, quod reficiat, id est rosam, & vinum. Et si qua in extremis partibus frigent, vnctis & calidis manibus fouere. Per quæ si consequi potuimus, ut & sudoris impetus minuatur, & vita prorogetur, incipit iam tempus ipsum esse præsidio. Vbi in tuto esse videtur, verendum est tamen, ne ad eandem imbecillitatem citò recidat. Itaq; vino tantum remoto, quotidie validiorem cibum debet assumere, donec satis virium corpori redeat.

De Lethargo, & eius curatione. CAP. XX.

Alter quoq; morbus est, aliter phrenetico contrarius. In illo difficilis somnus, prompta ad omnem audaciã mens est: at in hoc marcor, & inexpugnabilis penè dormiendi necessitas, (*Ἀδάργῳ* Græcè nominant) atq; id quoq;
genus

genus acutum est, & nisi succurritur, celeriter iugulat. Hos egros quidam subinde excitare nituntur, ad motus his, per quæ sternutamenta euocantur, & his, quæ odore fædo mouent, qualis est pix cruda, lana succida, piper, veratrum, castoreum, acetum, allium, cepa, iuxta etiam galbanum incendunt, aut pilos, aut cornu ceruinum. Si id non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odorem fædum mouent. Tharrias verò quidam accessione esse id malum dixit, leuariq; cum ea decessit. Itaq; eos qui subinde excitant sine vsu, male habere. Interest autem in decessione expergiscatur eger, an cum febris non leuetur, aut leuata quoq; ea somnus vrgeat. Nā si expergiscitur, adhibere ei vt sopito superuacuum est. Neq; enim vigilando melior fit, sed perse, si melior est, vigilat. Si verò continens ei somnus est, utiq; excitandus est, sed his temporibus quibus febris leuissima est, vt & excernat aliquid, & sumat. Excitat autem validissimè repente aqua frigida infusa post remissionem. Itaq; perunctum oleo multo corpus tribus aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc vtemur, si equalis agro spirituserit, si mollia præcordia. Sin aliter hæc erunt, ea potiora, quæ supra comprehensa sunt. Et quod ad somnum quidem pertinet, commodissima hæc ratio est. Medendi autem causa caput radendum, deinde postea fouendum est aqua, in qua laurus aut ruta decocta sit. Altero die imponendum

dum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri bacca, aut hedera cum rosa & aceto. Praecipueq; proficit & ad excitandum hominem naribus admotum, & ad morbum ipsum depellendum capiti fronti'ue impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest, maximeq; opportune cibus datus, id est in remissione, quanta maxime inueniri poterit. Aptissima autem sorbitio est, donec morbus decrefcere incipiat: sic, ut si quotidie grauis accessio est, haec quotidie detur. Si alternis, post grauiorem sorbitio, post leuiorem, malsa aqua. Vinum quoq; cum tempestiuo cibo datum, non mediocriter adiuuat. Quod si post longas febres eiusmodi torpor corpori accessit, cetera eadem seruanda sunt. Ante accessionem autem tribus quatuor'ue horis castoreum (si venter astrictus est) mixtum cum scamonea: si non est, per se ipsum cum aqua dandum est. Si praecordia mollia sunt, cibus vtendum est plenioribus. Si dura, in iisdem sorbitienibus subsistendum, imponendumq; est praecordijs, quod simul & reprimat, & emolliat.

De Aqua inter cutem, hoc est Hydropico morbo.

C A P. XXI.

Sed hic quidem acutus est morbus. Longius vero fieri potest eorū, quos aqua inter cutem male habet, nisi primis diebus discussus est, ὕδρωπας Graeci uocat. Atq; eius tres species sunt. Nam modo ventre vehementer intento, creber intus ex motu spiritus sonus est. Modo corpus inaequa

inæquale est, tumoribus aliter aliterq; per totum
 id orientibus. Modò intus in vñ aqua contra-
 hitur, & moto corpore ita mouetur, vt impetus
 eius conspici possit. Primum τυμπανίτην, se-
 cundū λανκοπλεγματίαν vel ὑποσάρκα, ter-
 tium ἀσπίτην Græci nominant. Cōmunis tamen
 omnium est humoris nimia abūdantia, ob quam
 ne vlcera quidē in his ægris facillè sanescunt. Sæ-
 pe verò hoc malū per se incipit. Sæpe alteri ve-
 tusto morbo, maximeq; quartana superuenit.
 Facilius in seruis, quàm in liberis tollitur, quia
 cum desideret famem, sitim, mille alia tædia, lon-
 gamq; patiētiam, promptius his succurritur, qui
 facillè coguntur, quàm quibus inutilis libertas est.
 Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto si-
 bi temperare non possunt, ad salutem perducun-
 tur. Ideoq; non ignobilis medicus, Chrysippi di-
 scipulus, apud Antigoniū regem, amicum quen-
 dam eius notæ intemperantiæ, mediocriter eo
 morbo implicitum negauit posse sanari. Cumq;
 alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum
 polliceretur, respondit illum ad morbum ægri re-
 spicere, se ad animum. Neq; eum res fefellit. Ille
 enim cum summa diligentia nō medici tantum-
 modo, sed etiam regis custodiretur, tamen ma-
 lagmata sua deuorando, bibendoq; suam vrinam
 in exitium se precipitauit. Inter initia tamen
 non difficilima curatio est, si imperata sunt cor-
 pori, quies, sitis, inedia. At si malum inueteraue-
 rit, non sine magna molestia discutitur. Metro-
 dorum

dorum tamen Epicuri discipulum referunt, cum hoc morbo tentaretur, neque equo animo ferret necessariam sitim, ubi diu abstinuerat, bibere solitum, deinde euomere. Quod si redditur quicquid receptum est, multum tædio demit: si à stomacho retentum est, morbum auget. Ideoq; in quolibet tentandum non est. Sed si febris quoque est, hæc in primis submouenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est, tum demum ad ea veniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. Atque hic quoque quæcunque species est, si nondum nimis occupauit, iisdem auxilijs opus est. Multum ambulandum, currendum*aliquid est. Superiores maxime partes sic perfricandæ, ut spiritum ipse con-
 *aliquid
 tineat, euocandus est sudor non exercitatione tantummodo, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusq; alijs, maximeq; utiles naturales & siccæ sudationes sunt, quales super Baijs habemus in myrtetis: balneum atq; omnis humor alienus est. Ieiuno recte catapotia dantur facta ex absinthij duabus, myrrhæ tertia parte. Cibus esse debet ex media quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est, quam ut vitam sustineat, optimaq; est, quæ urinam mouet. Sed id ipsum tamen molliri cibo, quam medicamento melius est. Si
 *ut ex his
 tamē res coget, ex his aliquid, quæ id præstent, aliquid de-
 erit decoquendum, eaq; aqua potui danda. Viden-
 tur autem hanc facultatem habere iris, nardum, ter id de-
 coquendū.
 l
 crocum,

crocum, cinamum, amomum, cassia, myrrha, balsamum, galbanum, ladanum, cenanthe, panace, cardamomum, hebenus, cupressi semen, ruatyminia, quàm $\sigma\alpha\phi\acute{\iota}\delta\alpha\ \alpha\gamma\gamma\acute{\iota}\alpha\upsilon$ Græci nomināt: abrotanum, rosæ folia, acorum, amara nuces, tragoriganum, styrax, costum, iunci quadrati, & rotundi semen, illud cyperon, $\chi\acute{o}\iota\upsilon\alpha\upsilon$ hoc Græci vocant. Quæ quoties posuero, non quæ hic nascuntur, sed quæ inter aromata afferuntur, significabo. Primo tamen quæ leuissima ex his sunt, id est rosæ folia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vinum quoque vtile est & austerum, sed quàm tenuissimum. Commodum est etiam lino quotidie ventrē metiri, & qua comprehendit aluum, notam imponere, postero die videre, si plenius corpus sit, an extenuetur. Id enim quod tenuetur, medicinam sentit. Neque alienum est metiri & potionem eius & urinam. Nam si plus humoris excernitur, quàm assumitur, ita demum secundæ valetudinis spes est. Asclepiades in eo, qui ex quartana in hydropa deciderat, se abstinentia bidui & frictione vsum, tertio die iam & febre & aqua liberato, cibum & vinum dedisse, memorie prodidit. Hactenus communiter de omni specie dici potest. Si vehementius malum est, deducenda ratio curandi est. Ergo si inflammatio & ex ea dolor creber est, utilis quotidianus aut alterno quoque die post cibum vomitus est. Fomentis siccis, calidisq; vtendum est. Si per hæc dolor non finitur, necessariæ sunt sine ferro curbit

cucurbitule. Si ne per has quidem tormentum tollitur, incidenda cutis est, & tum his utendum. Vltimum auxilium est, si cucurbitule nihil profuerunt, per aluum infundere copiose aquam calidam, eamq; recipere. Quinetiam quotidie ter quater ne opus est uti frictione vehementi, cum oleo & quibusdam calefacientibus. Sed in hac frictione à ventre abstinendum est. Imponendum verò in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat, ferramentisq; candentibus pluribus locis venter exulcerandus est, & seruanda vlcera diutius. Vtiliter etiam scilla cocta delinitur cutis, sed diu post has inflammationes abstinendum est ab omnibus inflantibus. At si id vitium est, cui leucophlegmatias nomen est, eas partes quæ tument, subijcere soli oportet, sed non nimium, ne febricula incidat: si is vehementior est, caput velandum est, utendumq; frictione madefactis tantum manibus aqua, cui sal & nitrum & olei paulum sit adiectum, sic ut aut pueriles, aut muliebres manus adhibeantur, quo mollior earum tactus sit. Idq; si vires patiuntur, ante meridiem tota hora, post meridiem semihora fieri oportet. Vtilia etiam sunt cataplasmata, quæ reprimunt, maximeq; si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talum quatuor ferè digitis ex parte interiore, qua per aliquot dies frequēs humor feratur, atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Concutiendumq; multa gestatione corpus est: atq; ubi inductæ vulneribus ci-

l 2 catric

catrices sunt, adiiciendum & exercitationibus est, & cibus, donec corpus ad pristinum habitum reuertatur. Cibus valens esse debet, & glutinosus, maximeq; caro. Vinum (si per stomachum licet) dulcius. Sed ita, vt inuicem biduo triduo'ue, modò aqua, modò id bibatur. Prodest etiam lactuca marinæ (quæ grandis iuxta mare nascitur) semen, cum aqua potui datum. Si valens est qui id accipit, ei scilla cocta (sicut suprâ dixi) delinitur. Autoresq; multi sunt inflatis vesicis pulsandos tumores esse. Si vero id morbi genus est, quo in vterum multa aqua contrahitur, ambulare, sed magis modicè oportet, malagma quod digerat impositum habere, idq; ipsum super imposito triplici panno, fascia non nimium tamen vehementer astringere. Quod à Tharria profectum, seruatum esse à pluribus video. Si iecur aut lienem affectum esse manifestum est, ficum pinguem contusam adiecto melle superponere. Si per talia auxilia venter non siccatur, sed humor nihilominus abundat, celeriore via succurrere, vt is per uentrem ipsum emittatur. Neque ignoro Erasistrato displicuisse hanc curandi viam. Morbum enim hunc iocineris putauit. Ideoq; ita illum esse sanandum, frustra q; aquam emitti, quæ vitiato illo subinde nascatur. Sed primò non huius visceris vnus hoc vitium est. Nam splene affecto, & in totius corporis malo habitu fit: deinde, vt inde cœperit, tamen aqua nisi emittitur, quæ contra naturam ibi subsistit,

&

& iocineri & ceteris* interioribus partibus no- * inferio-
 cet. Conuenitq; corpus nihilominus esse curandū. ribus
 Neque enim sanat emissus humor, sed medicinae
 locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac
 ne illud quidem in controuersiam uenit, quin non
 omnes in hoc morbo sic curari possint, sed iuue-
 nes robusti, qui vel ex toto carent febre, uel certè
 satis liberales intermissione habent. Nam quo-
 rum stomachus corruptus est, qui'ue ex atra bile
 huc deciderunt, quiq; malum corporis habitū ha-
 bent, idonei huic curationi non sunt. Cibus au-
 tem quo die primum humor emissus est, supernua-
 cuus est, nisi si uires desunt. Insequentibus die-
 bus & his uinum meracius quidem, sed non ita
 multum dari debet, paulatimq; euocandus aeger
 est ad exercitationes, frictiones, solem, sudatio-
 nes, nauigationes, & idoneos cibos, donec ex to-
 to conualescat. Balneum rarum res amat, fre-
 quentior in ieiunio vomitum. Si aestas est, in
 mare natare commodum est. Vbi conualuit ali-
 quis, diu tamen alienus ei ueneris usus est.

De Tabe, & eius speciebus, & curatio-
 nibus.

C A P. XXII.

Dlutius saepe et periculosius Tabes eos ma-
 le habet, quos inuasit. Atq; huius quoque
 plures species sunt. Vna est, qua corpus non ali-
 tur, & naturaliter semper aliquibus decedenti-
 bus, nullis verò in eorū locū subeuntibus, summa
 macies oritur, & nisi occurritur, tollit: ἀτρε-
 φία hanc Græci vocant. Ea duabus fere de
 l 3 causis

causis incidere consuevit. Aut enim nimio timore aliquis minus, aut auaritia nimia plus quam debet, assumit : ita vel quod deest, infirmat : vel quod superat, corrumpitur. Altera species est, quam Græci *ναρξία* appellāt, ubi malus corporis habitus est, ideoq; omnia alimenta corrumpuntur. Quod serè fit, cum longo morbo vitata corpora, etiam si illo vacant, refectiōem tamen non accipiunt, aut cum malis medicamentis corpus affectum est, aut cum diu necessaria defuerunt, aut cum inusitados et inutiles cibos aliquis assumpsit, aliquidue simile incidit. Huic præter tabem illud quoq; nonnunquam accidere solet, ut per assiduas pustulas aut vlcera summa cutis exasperetur, vel aliquæ corporis partes intumescant. Tertia est, longeq; periculosissima species, quam Græci *φθίσις* nominauerunt. Oritur serè à capite, inde in pulmonē destillat : huic exulceratio accedit, ex hac febricula leuis fit, quæ etiam cum quieuit, tamen & repetit. Frequens tussis est, pus excreatur, interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem impositum est, mali odoris est. Itaq; qui de morbo dubitant, hac nota utuntur. Cum hac genera tabis sint, animaduertere primum oportet, quid sit in quo laboratur. Deinde, si tantummodo non ali corpus apparet, causam eius attendere : & si cibi minus aliquis quam debet, assumit, adicere, sed paulatim, ne si corpus insuetum, subita multitudine onerauerit, concoctionem impediat. Si verò
plus

plus iusto quis assumere solitus est, abstinere vno die, deinde ab exiguo cibo incipere, quotidie adijcere, donec ad iustum modum perueniat. Præter hæc conuenit ambulare locis quàm minime frigidis, sole vitato, per manus quoq; exerceri. Si infirmior est, gestari, ungi, perfricari, si potest, maxime per seipsum, sæpius eodem die, & ante cibum & post eum sic, vt interdum oleo quedam adijciantur calefaciētia, donec insudet. Prodestq; ieiuno prehendere per multas partes cutem, & attrahere, vt relaxetur, aut imposita resina & abducta subinde idem facere. Vtile est etiam interdum balneum, sed post cibum exiguum. Atq; in ipso solio recte cibi aliquid assumitur, aut si sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi verò esse debent ex his, qui facile concoquuntur, qui maxime alunt. Ergo vini quoq;, sed austeri necessarius vsus est, mouenda vrina. At si malus corporis habitus est, primū abstinendum est, deinde aluus ducēda, tum paulatim cibi dandi, adiectis exercitationibus, vnctionibus, frictionibus. Vtilius his frequens balneum est, sed ieiuniis etiam vsq; ad sudorē. Cibi verò opus est copiosis, varijs, boni succi, quiq; etiam minus facile corrumpantur, vino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est, sed paulatim quotidieq; pluribus diebus, cum eo, vt cætera quoq; eodem modo seruentur. Quòd si mali plus est, & vera phthisis est, inter initia protinus occurrere necessarium est. Neq; enim facile is morbus cum

inueterauerit, euincitur. Opus est, si vires patiuntur, longa navigatione, cœli mutatione, sic, ut densius quam id est, ex quo discedit ager, petatur. Ideoq; aptissimè Alexandriam ex Italia itur. Fereq; id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus etate firmissima maximè oriatur, id est ab anno duodecimo ad annū quintum & trigésimum. Si id imbecillitas non finit, naue tamen non longe gestari commodissimum est. Si navigationem aliqua res prohibet, lectica, vel alio modo corpus dimouendum est, tum à negotijs abstinentum est, omnibusq; rebus, quæ sollicitare animum possunt, somno indulgendum, cauendæ destillationes, ne si quid cura leuaret, exasperent, & ob id vitanda cruditas, simulq; sol & frigus. Os obtegendum, fauces velandæ, tussicula suis remedijs finiendæ, et quàm diu quidem febricula incurfat, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestiuus cibus medendum. Eoq; tempore bibenda aqua. Lac quoque, quod in capitis doloribus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia sitis, siue præcordia tument, siue biliosa vrina est, siue sanguis fluxit, pro veneno est, in phthisi tamen, sicut in omnibus longis difficilibusq; febribus, rectè dari potest. Quod si febris aut nondum incurfat, aut iam remisit, recurrendum est ad modicas exercitationes, maximeq; ambulationes, item lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet primo acer, ut allium, porrum, idq; ipsum ex aceto, vel

ex

ex eodem intubus, ocymum, lactuca. Dein lenis, ut sorbitio ex ptisana, vel ex alica, vel ex amylo, lacte adiecto. Idem oryza quoque, & si nihil aliud est, far præstat. Tum inuicem, modo his cibis, modo illis vtendum est. Adijciendaq; quædam ex media materia, præcipueq; vel ex aprugna, cerebellum, vel pisciculus, & his similia. Farina etiam cum seuo ouillo, caprino'ue mixta, deinde incocta, pro medicamento est. Vinum assumi debet lene, austerum. Hactenus non magna mole pugnatur. Si uehementior noxa est, ac neq; febricula neq; tussis quiescit, tenuariq; corpus apparet, validioribus auxilijs opus est. Exulcerandus est ferro candenti, vno loco sub mēto, altero in gutture, duobus ad mammam vtranq; itē sub imis ossibus scapulari (quas ὠμοπλάτας Græci vocant) sic, ne sanescere vlcera sinamus, nisi tussi finita. Cui per se quoque mendendum esse, manifestum est. Tunc ter quaterq; die uehementer extremæ partes perfricandæ, thorax leui manu pertractandus, post cibum intermittenda hora, & perfricanda crura, brachiaq;. Interpositis denis diebus demittendus est æger in solium, in quo sit aqua calida, & oleum: cæteris diebus bibenda aqua, tum & vinum: si tussis non est potui frigidum dandum: si æstas est, egelidum. Vtile est etiam cibos in remissionibus quotidie dari, frictiones, gestationesq; similiter adhiberi: *itemq; acria quarto aut quin- *eadem to die sumere, interdum herbam sanguinalem acria

l 5 ex

ex aceto vel plantaginem esse. Medicamentum etiam est, vel plantaginis succus per se, vel mar-
rubium ex melle concoctum, ita ut illius cyathus
sorbeatur, huius cochleare plenum paulatim de-
lingatur, vel inter se mista & incocta resina te-
rebinthina pars dimidia, butyri & mellis pars
altera. Precipua tamen ex his omnibus sunt vi-
ctus, vehiculum, & naus, & sorbitio. Aluus
cita utique vitanda est. Vomitus in hoc morbo
si frequens est, perniciosus est, maximeq; san-
guinis. Qui meliusculus esse coepit, adycere de-
bet exercitationes, frictiones, cibos deinde, ipse
se, suppresso spiritu, perfricare, diu abstinere à
vino, balneo, venere.

De Comitialis morbi curationibus. C A. XXIII.

INter notissimos morbos est etiam is, qui Co-
mitialis, vel maior nominatur. Homo subito
concidit, ex ore spuma mouentur, deinde inter-
posito tempore ad se redit, & per seipsum con-
surgit. Id genus saepius viros quam foeminas
occupat, ac solet quidem etiam longum esse, vsq;
ad mortis diem, & vita non periculosum. Inter-
dum tamen cum recens est, hominem consumit,
& saepe eum, si remedia non sustulerunt, in pue-
ris veneris, in puellis menstruorum initium tollit:
modò cum distentione membrorum aut neruo-
rum prolabitur aliquis, modò sine illa quidem.
Hos quoque iisdem, quibus lethargicos excitare
conantur, quod admodum superuacuum est, &
quia ne lethargicus quidem his sanatur, & quia
cum

cūm possit iste nunquam expergisci, atq; ita fame interire, hic ad se utiq; reuertitur. Vbi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utique sanguis mitti debet. Si accessit, non utiq; mittendus est, nisi alia quoque hortantur. Necessarium autem est ducere aluum, vel nigro veratro purgare, vel utrunq; facere, si vires patiuntur: tunc caput tondere, oleoq; & aceto perungere, cibū post diem tertium, simul cum transit hora, qua concidit, dare. Neque sorbitiones autem his, alijq; molles, & faciles cibi, neq; caro, minimeq; suilla conuenit, sed mediæ materiæ. Nam & viribus opus est, & cruditates cauendæ sunt, cum quibus fugere oportet solem, balneum, ignem, omniaq; calefacientia: item, frigus, vinum, venerem, loci præcipitis conspectum, omniumq; terrentium, vomitum, lassitudinem, solitudines, negotia omnia. Vbi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & inuicem alterum quenque eadem hora cibi seruata, donec quatuordecim dies transeant. Quos ubi morbus excessit, acuti vim deposuit. At si manet, curandus iam ut longus est. Quod si non quo die primum id incidit, medicus accessit, sed is qui cadere consuevit, ei traditus est, protinus eo genere victus*habito, qui supra cōprehensus est, expectandus est dies, quo prolatur, utendumq; tum *dabitur, vel sanguinis missione, vel ductione alui, vel nigro veratro, sicut præceptum est. Insequentibus deinde diebus per eos cibos quos proposui, vita-

tis omnibus, quæ cauenda dixi, nutriendus. Si per hæc morbus finitus non fuerit, cōfugiendum erit ad album veratrum, ac ter quoq; aut quater eo vtendum, non ita multis interpositis diebus: sic tamen, ne iterum vnquā sumat, nisi conciderit. Medijs autē diebus vires eius erūt nutriendæ, quibusdam, præter ea quæ scripta sunt, adiectis. Vbi mane experrectus est, corpus eius leuiter ex oleo vetere, cum capite (excepto ventre) permulceatur, tum ambulatione quàm maxime longa & recta vtatur: post ambulationem loco tepido vehementer & diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde per caput multa aqua frigida perfundatur, paulum cibi assumat, conquiescat, rursus ante noctem ambulatione vtatur, iterum vehementer perfricetur, sic vt neque venter, neque caput contingatur, post hæc cœnet, interpositisq; tribus aut quatuor diebus, vno aut altero acria assumat. Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, caput radatur, vngatur oleo vetere, adiecto aceto & nitro, perfundatur aqua salsa, bibat ieiunus ex aqua castoreum, nulla aqua nisi decocta potionis causa vtatur.* Quidam iugulati gladiatoris calido sanguine epoto, tali morbo sese liberarunt. Apud quos miserum auxilium, tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicum verò pertinet, vltimum est iuxta talum, ex utroque crure paulum sanguinis mittere, occipitium incidere, & cucurbitulas adnouere, ferro candēte
in

in occipitio quoq; & infra, quâ summa vertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, vt per ea perniciosus humor euadat. Quibus si finitum malum non fuerit, propè est, vt perpetuum sit. Ad leuandum id tantummodo vtendum erit exercitatione multa, frictione, cibisq; his, qui supra comprehensi sunt, præcipueq; vitanda omnia, quæ ne fierent, excepimus.

De Regii morbi curatione. CAP. XXIIII.

AEque notus est morbus, quem interdum Arquatum, interdum Regium nominant, Quem Hippocrates ait, si post septimum diem febricitante agro superuenit, tutum esse, mollibus tantummodo præcordijs substatibus. Diocles ex toto, si post febrem oritur etiam prodesse: si post hunc febris, occidere. Color autem eum morbum detegit maxime oculorum, in quibus quod album esse debet, fit luteum. Soletq; accedere & sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & præcordiorum dextra parte durties et vbi corporis vehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumq; resolutio, atq; vbi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodâ inalbescit. Primo die abstinere egrum oportet, secundo ducere aliuum, tum si febris est, eam victus genere discutere. Si non est, scamoneam potui dare, vel cum aqua betam albam contritam, vel cum aqua mulsâ nuces amaras, absinthium, anisum, sic, vt pars huius minima sit. Asclepiades aquâ quoq; salsam, & quidem per biduum purgationis

nis caussa bibere cogebat, ijs quæ urinā mouent reiectis. Quidā superioribus omiſſis, per hæc & per eos cibos, qui extenuant, idem ſe conſequi dicunt. Ego ubiq; ſi ſatis virium eſt, validiora, ſi parum, imbecillia auxilia præfero. Si purgatio fuit, poſt eam triduo, primo modicè cibum oportet aſſumere ex media materia, & vinum bibere græcum, ſalſum, vt reſolutio ventris maneat, tum altero triduo validiores cibos, & carnis quoq; aliquid eſſe, intra aquā manere, deinde ad ſuperius genus victus reuerti, cum eo, vt magis ſatietur, omiſſo græco vino, bibere integrū auſterum: atq; ita per hæc variare, vt interdum acres quoq; cibos interponat, interdum ad ſalſum vinum redeat. Per omne verò tempus vtêdum eſt exercitatione, frictione, ſi hyems eſt, balneo, ſi æſtas, frigidis nationibus, lecto etiam & conclau cultiore claſſo loco vti, ludis, laſciuiâ, per quæ mens exhilaretur. Ob quæ regius morbus dictus videtur. Malagma quoque quod digerat, ſuper præcordia datum prodeſt, vel arida ibi ficus impoſita, ſi iecur aut lienis affectus eſt.

De Elephantia curatione. C. A. P. XXV.

I Gnotus autem penè in Italia, frequētiffimus in quibuſdā regionibus iſ morbus eſt, quem ἐλεφαντία Græci vocant, iſq; longis annumeratur. Totum corpus afficitur, ita vt oſſa quoq; vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebroſq; tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa
cutis

cutis inequaliter crassa, tenuis, dura, mollisq;
 quasi squamis quibusdam exasperatur, corpus
 emacrescit, os, surae, pedes intumescunt. Vbi ve-
 tus morbus est, digiti in manibus pedibusq; sub
 tumore conduntur, febricula oritur, quæ facile
 tot malis obrutum hominem consumit. Protinus
 ergo inter initia sanguis per biduum mitti de-
 bet, aut nigro veratro venter solui, adhibenda
 tum quanta sustineri potest, inedia est, paulum
 deinde vires reficienda, & ducenda alius: post
 hæc, ubi corpus leuatum est, vtendum est exer-
 citatione, præcipueq; cursu, sudor primum labore
 ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus
 euocandus, frictio adhibenda, moderandumq;
 inter hæc, vt vires conseruentur, balneum ra-
 rum esse debet. Cibus sine pinguibus, sine gluti-
 nosis, sine instantibus. Vinum præter quàm pri-
 mis diebus, rectè datur. Corpus contrita planta-
 go, & illita, tueri optime videtur.

De Attonitis, & eorū curatione. CAP. XXVI.

Attonitos quoq; raro videmus, quorum &
 corpus & mens stupet. Fit interdum ictu
 fulminis, interdum morbo, ἀποπλεξία hunc
 Græci appellant. His sanguis mittendus est. Ve-
 ratro quoque albo, vel alui ductione vtendum.
 Tum adhibenda frictiones, & ex media mate-
 ria minime pingues cibi, quidam etiam acres,
 & à vino abstinentum.

De resolutione neruorum, quæ Apoplexia vel
 παράλυσις dicitur. CAP. XXVII.

At

AT resolutio neruorum, frequens ubiq; mor-
 bus est. Sed interdum tota corpora, inter-
 dum partes infestat. Veteres autores illud Ἀπο-
 πλεξία, hoc Paralyfin nominauerunt. Nunc
 utrūq; Paralyfin appellari video. Solent autem
 qui per omnia membra vehemēter resoluti sunt,
 celeriter rapi, ac si correcti non sunt, diutius qui-
 dem viuunt, sed raro tamen ad sanitatem perue-
 niunt, & plerunq; miserum spiritum trahunt,
 memoria quoq; amissa. In partibus verò nunquā
 acutus, sæpe longus, ferè sanabilis morbus est. Si
 omnia membra vehemēter resoluta sunt, sangui-
 nis detractio vel occidit, vel liberat. Aliud cu-
 rationis genus, vix vnquam sanitatem restituit,
 sæpe mortem tantum differt, vitam interim in-
 festat. Post sanguinis missionē, si non redit, &
 motus & mens, nihil spei superest. Si redit, sa-
 nitas quoque prospicitur. At ubi pars resoluta
 *providet est, *proderit malo corporis, vel sanguis missus,
 vel alius ducta. Cetera eadem in utroq; casu fa-
 cienda sunt. Siquidem vitare præcipue conuenit
 frigus, paulatimq; ad exercitationes reuertendū
 est, sic, vt ingrediatur ipse protinus, si potest. Si
 id crurum imbecillitas prohibet, vel gestetur,
 vel motu lecti concutiatur, tum id membrum,
 quod deficiet, si potest, per se: si minus, per
 alium moueatur, et vi quadam ad consuetudinē
 *torpenti suam redeat. Prodest etiam *torpentis membri
 bus mem summam cutem exasperasse, vel vrticis caesam,
 bris vel imposito sinapi, sic vt ubi rubere cœperit
 corpus,

corpus, hæc remoucantur. Scilla quoq; contrita, bulbiq; contriti cum thure rectè imponuntur. Neq; alienum est, resina cutem tertio quoque die diutius vellere, pluribus etiam locis, aliquando sine ferro cucurbitulis admouere. Vnctioni verò aptissimum est vetus oleum, vel nitrum aceto & oleo mistum. Quinetiam fouere aqua calida marina, vel si ea non est, tamen salsa magnopere necessarium est. At si quo loco vel naturales, vel etiam manufactæ tales natationes sunt, ijs potissimū vtendum est, præcipueq; in his agitando membra, quæ maxime deficiunt. Si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeq; ex venatione: potio sine vino aqua calida. Si tamen vetus morbus est, interponi, quarto vel quinto die purgationis causa vinum Græcū, salsum prodest. Post cœnā utilis vomitus est. Interdum verò etiam nervorum dolor oriri solet. In hoc casu non oportet vomere, non medicamentis vrinā mouere, non sine exercitatione sudores, vt quidā præcipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die. In lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est, deinde retento spiritu, ab ipsa exercitatione potius superiores partes mouendæ, balneo raro vtendum, mutandum subinde peregrinationibus cælum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo nitro ex aqua perungenda est, deinde inuoluenda, & subiicienda pruna lenis, & sulphur, atq; ita id suffumigandum, idq; aliquandiu faciendum. Sed ieiunio, cum bene

in iam

iam concoxerit, cucurbitula quoque sepe dolenti
 parti admonenda sunt, pulsandusq; leuiter infla-
 tis vesicis bubulis is locus est. Vtile est etiam se-
 num miscere cum hyoscyami & vrtice contri-
 tis seminibus, sic, vt omnium par modus sit, idq;
 imponere, fouere aqua, in qua sulphur decoctum
 sit. Viriculi quoque rectè imponuntur aqua ca-
 lida repleti, aut bitumen cum hordeacea farina
 mixtum, atque in ipso potissimum dolore vten-
 dum gestatione vehementi est, quod in alijs do-
 loribus pessimum est. Tremor autem nervorum
 aequè vomitu, medicamentisq; vrinam mouen-
 tibus *intenditur. Inimica etiam habet balnea,
 affasq; sudationes. Bibenda aqua est, acri am-
 bulatione vtendum, item vnctionibus, frictioni-
 busq; maxime per seipsum, pila, similibusq; su-
 periores partes dimouende, cibo quolibet vten-
 dum, dummodo concoctioni vtique studeatur.
 Secundum cibum curis abstinendum. Rarissima
 venere vtendum est. Si quando quis in eam pro-
 lapsus est, tum oleo leuiter diuq; in lectulo per-
 fricari manibus puerilibus potius, quàm viri-
 libus debet. Suppurationes autem, quæ in ali-
 qua interiori parte oriuntur, vbi notæ fuerint,
 primum id agere oportet per ea cataplasmata
 quæ reprimunt, ne coitus inutilis materiæ fiat.
 Deinde, si hæc victa sunt, per ea malagmata
 quæ digerunt, dissipentur. Quod si consecuti non
 sumus, sequitur vt euocetur, deinde vt mature-
 scat, omnis tunc vomice finis est, vt rumpatur.

Indic

*impedi-
tur

Indiciumq; est, pus vel aluo, vel ore redditum: sed nihil facere oportet, quominus quicquid est puris excedat. Utendum maxime sorbitionibus est & aqua calida. Vbi pus fieri desijt, transeundum ad faciles quidem, sed tamen validiores et frigidos cibos, frigidamq; aquam, sic vt ab egelidis tamẽ initium fiat, primoq; cum melle quedam edenda, vt nuclei pinei, vel Græcæ nuces, vel auellanae. Postea submouendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamētum eo tempore vlceri est succus assumptus, vel porri, vel marrubij, & omni cibo porrum ipsum adiectum. Oportebit autem vti in his partibus, quæ non afficiuntur, frictionibus, item ambulationibus lenibus. Vitandumq; erit, ne vel luctando, vel currendo, vel alia ratione sanescientia vlcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoq; omnimodo cauendus sanguinis vomitus est.

LIBER IIII.

De humani corporis interioribus sedibus.

CAP. I.



ACTENVS reperiuntur ea genera morborum, quæ in totis corporibus ita sunt, vt ijs certæ sedes assignari non possint. Nunc de his dicam, quæ sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi curationesq; in noti-

m 2 tiam

tiam venient, si prius eorum sedes breuiter ostendero. Caput igitur eaq; quæ in ore sunt, non lingua tantummodo, palatoq; terminantur, sed etiã quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra sinistraq; circa guttur venæ grandes, quæ ophthalmodes nominantur, itemq; arteriæ (quæ parotidas vocant) sursum procedentes vltra aures feruntur. Atq; in ipsis ceruicibus glandule posite sunt, quæ interdum cum dolore intumescunt.

Deinde duo itinera incipiunt. Alterum asperã arteriam nominant, alterum stomachum. Arteria exterior ad pulmonem: Stomachus interior ad ventriculũ fertur. Illa spiritum, hic cibum recipit: à quibus cum diuersæ viæ sint, quæ coeunt, exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est, quæ cum spiramus attollitur, cum cibum potionemq; assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria, dura, & cartilaginosa in gutture assurgit, cæteris partibus residet. Constat ex circulis quibusdam compositis ad imaginem earum vertebrarũ, quæ in spina sunt: ita tamen, vt ex parte exteriori aspera, ex interiori stomachi modo leuis sit, eaq; descendens ad præcordia cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoq; spiritus capax & à tergo spine ipsi iunctus in duas fibras ungula bubulæ modo, diuiditur. Huic cor annexum est, natura musculosum in pectore, sub sinistrore mamma situm, duoq; quasi ventriculos habet. At sub corde atq; pulmone transversum ex valida membrana septum est, quod à præ-

Stomach^o
hic pro i-
psa gula ac-
cipitur, vt
& infra li-
bro 4 cap.
5. quamuis
aliquando
& pro ven-
triculi par-
te inferiori
stoma-
chi vocabu-
lo vtatur
Celsus, vt
cũ ait,
Stomach^o
verò inte-
rioru præ-
cipuũ est.

à præcordijs vterum diducit æquò neruosum,
 multis etiam venis per id discurrentibus à su-
 periore parte, non solum intestina, sed iecur quo-
 que lienemq; discernit. Hæc viscera proxima,
 sed infrà tamen posita dextra sinistraq; sunt. Ie-
 cur à dextra parte sub præcordijs ab ipso septo
 ortum, intrinsecus cauum, extrinsecus gibbum,
 quod prominens leuiter ventriculo insidet, &
 in quatuor fibras diuiditur. Ex inferiore ve-
 ro parte ei fel inheret, at lienis sinistra non ei-
 dem septo, sed intestino innexus est, natura
 mollis & rarus, longitudinis, crassitudinisq;
 modicæ, isq; paulum à costarum regione in vte-
 rum excedens ex maxima parte sub his condi-
 tur, atque hæc quidem iuncta sunt. Renes. Renes verò
 diuersi, qui lumbis sub imis coxis inhaerent à par-
 te earum resimi, ab altera rotundi, qui & venosi
 sunt, & vetriculos habent, & tunicis super con-
 teguntur. Ac viscerum quidem hæc sedes sunt.
 Stomachus verò, qui intestinorum principium Stoma-
chus. est, neruosus à septimæ spinæ vertebra incipit,
 ac circa præcordia, cum ventriculo committi-
 tur. Ventriculus autem, qui receptaculum ci- Ventricu-
lus. bi est, constat ex duobus tergoribus, isq; inter
 lienem & iecur positus est, utroque ex his pau-
 lum super eum ingrediente. Suntq; etiam mem-
 branulae tenues, per quas inter se tria ista con-
 nectuntur, iungunturq; ei septo, quod transuersum
 esse supra posui. Inde ima ventriculi pars pau-
 lum in dexteriore partem conuersa, in summum

intestinum coarctatur. Hanc iuncturam πυλωρον
 Græci vocant, quoniam portæ modo in inferio-
 res partes, ea quæ excreturi sumus, emittit. Ab
 Ieiunū in- ea ieiunum intestinum incipit, non ita impli-
 testinum. citum: cui tale vocabulum est, quia nunquam
 quod accipit, continet: sed protinus in inferiores
 Tenue in- partes transmittit. Inde tenue intestinum est, in
 testinum. sinus vehementer implicitum. Orbes verò eius
 per membranulas singuli cum inferioribus con-
 nectuntur, qui in dexteriores partē conuersi, et
 è regione dexteroris coxæ finiti, superiores ta-
 men partes magis complent. Deinde id intesti-
 num cum crassiore altero transuerso cōmittitur,
 quod à dextra parte incipiens, in sinisteriore
 peruium & longum est, in dexteriores non est,
 Cæcum it- ideoq; cæcum nominatur. Ad id quod peruium
 testinum. est, late fusum atq; sinuatum, minusq; quàm su-
 periora intestina neruosum, ab utraq; parte huc
 atq; illuc volutū, magis tamen sinisteriores infe-
 rioresq; partes tenens, contingit iecur atq; ven-
 triculum. Deinde cū quibusdam membranulis à
 sinistro rene venientibus iungitur, atq; hinc de-
 xtra recuruatum in imo dirigitur quæ excernit,
 Rectū in- ideoq; id ibi rectum intestini nominatur. Con-
 testinum. tegit verò vniuersa hæc omentum ex *interiore
 Omentū. *inferiore parte leue & strictum, ex superiore mollius. Cui
 adeps quoq; innascitur, quæ sensu, sicut cerebrū
 quoq; & medulla, caret. At à renibus singulæ
 venæ colore albæ ad vesicam feruntur, ἡγρῆγες
 Græci vocant, quod per eas inde descendentes
 urinam

urinam in vesicam destillare concipiunt. Vesica autem in ipso sinu nervosa & duplex, cervice plena atq; carnosae, iungitur per venas cum intestino, eoq; osse, quod pubi subest. Ipsa soluta atq; liberior est, aliter in viris atq; in foeminis posita. Nam in viris iuxta rectum intestinum est potius in sinistram partem inclinata. In foeminis super genitale earum posita est, superq; elapsa ab ipsa vulva sustinetur. Tum in masculis iter urinae spatiosius, & compressius à cervice huius descendit ad colem. In foeminis brevius & plenius super vulvae cervicem se ostendit. Vulva autem in virginibus quidem admodum exigua est. In mulieribus vero, nisi ubi grauidae sunt, non multo maior, quam ut manu comprehendatur. Ea recta continuataq; cervice (quem canalem vocant) contra mediam aluum orsa, inde paulum ad dexteriores coxas conuertitur, deinde super rectum intestinum progressa ilij foeminae latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas & pubem imo ventre posita sunt, à quibus ac pube abdomen sursum versus ad praecordia pervenit, ab exteriori parte evidenti cute, ab interiori levi membrana inclusum, quae omento iungitur, *περιτόναι* & autem à Graecis nominatur.

Canalis.

De curationibus morborum, qui nascuntur à capite: & primò de eius dolore, deinde de morbo, qui circa faciem nascitur, tum de linguae resolutione, postremò de destillatione, ac gravedine.

CAP. II.

m 4 His

HIs veluti in conspectum quendam (quatenus scire curanti necessarium est) adductis, remedia singularum laborantium partium exequar, orsus à capite: sub quo nomine nunc significo eam partem, quæ capillo tegitur. Nam oculorum, aurium, dentium dolor, & si qui similis est, aliàs erit explicandus. In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est, quem *φολαια* Greci vocant. Cuius notæ sunt horror calidus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sic ut vox supprimatur, vel sanguinis ex naribus cursus, sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maximè circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neq; gravis, neq; periculosa, per hominis ætatem est. Interdum gravior dolor, sed brevis, neq; tamen mortiferus, qui vel vino, vel cruditate, vel frigore, vel igne, aut sole contrahitur. Hiq; omnes dolores modo in febre, modo sine hac sunt, modo in toto capite, modo in parte, interdum sic, ut oris quoq; proximam partem excrucient. Præter hæc etiam unum inuenitur genus, quod potest longum esse, ubi humor cutem inflat, eaq; intumescit, & prementi digito cedit, *ὕδρονέφαλον* Græci appellant. Ex his, id quod secundo loco positum est, dum leue est, qua sit ratione curandum dixi, cum persequer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberet. Quæ verò auxilia sint capitis, ubi cum febre dolor est, eo loco explici

explicitum est, quo februm curatio exposita est. Nunc de ceteris dicendum: Ex quibus id quod acutum est, & id quod supra consuetudinem intenditur, idque quod ex subita causa, etsi non pestiferum, tamen vehemens est, primam curationem habet qua sanguis mittatur. Sed id, nisi intolerabilis est dolor, superuacuum est. Satiusque est abstinere a cibo, si fieri potest, etiam a potione. Si non potest, aquam bibere. Si postero die dolor remanet, aluum ducere, sternutamenta euocare, nihil assumere, nisi aquam. Sæpe enim dies unus aut alter totum dolorem hac ratione discutit, utique si ex vino vel cruditate origo est. Si vero in his auxilij parum est, tonderi oportet ad cutem: deinde considerandum est, quæ causa dolorem excitarit: si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit, spongiam concavam imponere subinde in aqua frigida expressam, ungere rosa & aceto, vel potius his tinctam lanam succidam imponere, aliaque refrigerantia cataplasmata. Ac si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida maritima, vel certè salsa, aut in qua laurus decocta sit, tum caput vehementer perfricare, deinde calido oleo implere, veste velare. Quidam etiam id deuinciunt. Alij cervicalibus vestimentisque onerant, & sic leuantur, alios calida cataplasmata adiuvant. Ergo etiam ubi causa incognita est, videre oportet, refrigerantia magis, an calefacientia leniant, & his uti, quæ experimentum approbarit. At si

Aqua frigida.

m s parum

parum caussa discernitur, perfundere caput primum aqua calida, sicut supra præceptum est, vel salsa, vel ex lauro decocta, tñ frigida posca. Illa in omni vetusto capitis dolore communia sunt, sternutamenta excitare, inferiores partes vehementer perfricare, gargari & are his, quæ salinā mouent, cucurbitulis temporibus & occipitio admouere, sanguinem ex naribus detrahare, resina subinde tempora peruellere, & imposito sinapi exulcerare ea quæ male habent, antè lin-teolo subiecto, ne vehementer arrodant: candentibus ferramentis ubi dolor est, vlcera excitare, cibum permodicum cum aqua sumere: ubi leuatus est dolor in balneū ire, ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi. Si discussus ex toto dolor est, etiam ad vinum reuerti, sed postea semper antequam quicquam aliud, aquam bibere. Dissimile est id genus quod humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad cutem necessarium est. Deinde imponere sinapi, *profluit sic vt exulceret. Si id parum *profluit, scalpello vtendum est. Illa cū hydropicis communia sunt, vt exerceatur, insudet, vehementer perfricetur, cibis, potionibusq; vtatur, vrinam præcipue mouentibus.

De morbo qui circa faciem nascitur, quem
Græci κυνικόν σπασμόν vocant.

Circa faciem verò morbus innascitur, quem
Græci κυνικόν σπασμόν nominant. Is cū
acuta ferè febre oritur. Os cū motu quodam per-
uertitur,

uertitur, ideoq; nihil aliud est, quàm distentio oris. Accedit crebra coloris in facie totoq; corpore mutatio. Somnus in proptu est. In hoc sanguinem mittere, optimum est. Si finitum eo malum non est, ducere aluum: si ne sic quidem discussum est, albo veratro vomitum mouere: præter hæc necessarium est vitare solem, lassitudinem, vinum. Sed si discussum his non est, vtendum est cursu, frictione, in eo quod læsum est, leni & multa, in reliquis partibus breuiore, sed vehementi: prodest etiam mouere sternutamenta, caput radere, idq; perfundere aqua calida, vel marina, vel certè salsa, sic vt ei quoq; sulphur adijciatur. post perfusionem iterum perfricari, sinapi māducare, eodemq; tempore affectis oris partibus ceratum, integris idem sinapi, donec arrodant, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

De resolutione linguæ.

AT si lingua resoluta est, quòd interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit, sic vt sermo hominis non explicetur, oportet gargari & are ex aqua, in qua vel thymum, vel hyssopum, vel nepeta decocta sit, aquam bibere, caput & os et ea quæ sub mento sunt, & ceruicem vehementer perfricare, laesere linguam ipsam linere, manducare quæ sunt acerrima, id est sinapi, allium, cepam, magna vi luctari, vt verba exprimantur, exerceri retento spiritu, caput sæpe aqua frigida perfundere, nonnunquam multam esse radiculam,

diculam, deinde vomere.

De Destillatione ac Grauedine.

Destillat autē humor ex capite interdum in nares, quod leue est: interdum in fauces, quod peius est: interdū etiam in pulmonem quod pessimum est. Si in nares destillat, tenuis per has pituita profluit, caput leuiter dolet, grauitas eius sentitur, frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces, has exasperat, tussiculam mouet. Si in pulmonem, prater sternutamenta & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, aestus, biliosa vrina. Aliud autem (quamuis non multum distans malum) Grauedo est. Hæc nares claudit, vocem obtundit, tussim siccam mouet, sub eadem salsa est saliuā, sonant aures: venæ mouentur in capite, turbida vrina est. Hæc omnia nos *ῥῆσας* Hippocrates nominat. Nunc video apud Grecos in grauedine hoc nomen seruari, destillationes *ναρὰς αἵματος* appellari. Hæc autem & breuia, & si neglecta sunt, longa esse consueuerunt. Nihil pestiferum est, nisi quod pulmonē exulcerauit. Vbi aliquid eiusmodi sensimus, protinus abstinere à sole, balneo, vino, venere debemus. Inter quæ vinctio, & assueto cibo nihilominus vti licet, ambulatione tantum aceri, sed tecta vtendū est, & post eam caput atq; os supra quinquagies perfricandū. Raroq; fit, vt si biduo, vel certe triduo nobis temperauimus, id vitium non leuetur. Quo leuato, si in destillatione crassa facta pituita est, vel in grauedine nares magis

magis patent, balneo vtendum est, multaq; aqua prius calida, post egelida fouendum os, caputq;, deinde cu cibo pleniore vinum bibendum. At si equè tenuis die quarto pituita est, vel nares equè clausæ videntur, assumendum est, vinum amineum, austerum, deinde rursus biduo aqua, post quæ ad balneum & ad cõsuetudinem reuertendum est. Neq; tamẽ illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, expedit tanquã egros agere, sed cetera omnia quasi sanis facienda sunt, præterquã si diutius aliquẽ & vehementius ista sollicitare cõsueuerunt. Huic enim quadã curiosior obseruatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces destillauit, præter ea quæ supra retuli, protinus primis diebus multum ambulandum est, perfricandæ vehementer inferiores partes, leuior frictio adhibenda thoraci erit, leuior capiti, demẽda assueto cibo pars dimidia, sumenda oua, amyllum, similiaq;, quæ pituita faciunt crassiore. Siti quanta maxime sustineri potest, pugnandũ est. Vbi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoq; vsus est, adiiciendus est cibo pisciculus, aut caro, sic tamen ne protinus iustus modus cibi sumatur. Vno meraco copiosius vtendum est. At si in pulmonẽ quoq; destillat, multoq; magis & ambulatione, & frictione opus est, eademq; adhibita ratione in cibi, si nõ satis illi proficiunt, acrioribus vtendum est, magis somno indulgendũ, abstinendumq; a negotijs omnibus aliquãdo, sed serius, & balneũ tentandum.

dum. In grauedine autem primo die quiescere, neq; esse, neq; bibere, caput velare, fauces lana circumdare, postero die surgere, diu abstinere à potione, aut si res coegerit, non ultra heminam
 * tam aquæ assumere. Tertio die panis non* ita multum ex parte interiore cum pisciculo, vel leni carne sumere, aquam bibere. Si quis sibi temperare non potuerit, quo minus pleniore victu utatur, vomere. Vbi in balneum ventus est, multa aqua calida caput & os fouere usq; ad sudorem, tum ad vinum redire: post quæ vix fieri potest, ut idem incommodum maneat. Sed si manserit, utendum erit cibis frigidis, aridis, leuibus, humore quam minimo, seruatis frictionibus, exercitationibusq; quæ in omni tali genere valetudinis necessariae sunt.

De cernicis morbis, curationibusq; CAP. III.

A Capite transitus ad cernicem est, quæ grauius admodum morbis obnoxia est. Neq; tamen alius importunior, acutiorq; morbus est, quam is qui quodam rigore nervorum, modo caput scapulis, modo mentum pectori annectit, modo rectam & immobilem ceruicem intendit. Priorem Græci ἀπιδόζονον, insequentem ἐμπαδόζονον, vltimam τέτανον appellant, quamuis minus subtiliter, quidam indiscretis his nominibus utuntur. Ea sæpe intra quartum diem tollunt. Si hunc euaserunt sine periculo sunt. Omnia eadem ratione curantur, idq; conuenit. Sed Asclepiades utiq; mittendum sanguinem credidit. Quod quidam vitandum esse dixerunt, eò quod maxime
 tum

tum corpus calore egeret, isq; esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est. Neq; enim natura sanguinis est, ut utiq; caleat, sed ex his, quæ in homine sunt, is celerrime vel calefcit, vel refrigescit. Mitti verò nec ne debeat, ex his intelligi potest quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Utiq; autè recte datur castoreum, & cum hoc piper vel laser. Deinde opus est fomento humido & calido. Itaq; pleriq; aqua calida multa ceruices subinde perfundunt. Id in præsentia leuat, sed opportuniore nervos frigore reddit. Quod utiq; vitandum est. Utilius igitur est cerato liquido primum ceruicem perungere, deinde ad mouere vesicas bubulas, vel utriculos oleo calido repletos, vel ex farina calidum cataplasma, vel piper rotundum cum fico contusum. Utilissimum tamè est humido sale fouere. Quod quomodo fieret, iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est, ad mouere ad ignem, vel si æstas est, in sole, ægrum oportet, maximeq; oleo vetere, si id non est, syriaco, si ne id quidem est, adipe quàm vetustissima ceruicem, & scapulas, & spinas perfricare. Frictio cum omnibus in homine vertebribus utilis sit, tum is præcipuè, quæ in collo sunt. Ergo die nocteq; interpositis tamè quibusdam temporibus, hoc remedio vtendum est. Dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefacientibus. Cauendū verò præcipuè frigus. Ideoq; in eo conclau, in quo cubabit æger, ignis continuus esse debet, maximeq; tempore

tempore antelucano, quo præcipue frigus intensitur. Neq; inutile erit, caput attonsum habere, idq; irino vel cyprino calido madefacere, & superimposito pileo velare, nonnunquam etiam in calidum oleum totum descendere, vel in aquam calidam, in qua sænum græcum decoctum sit, et adiecta olei pars tertia. Alius quoq; ducta sæpe superiores partes resoluit. Si verò etiam vehementius dolor creuit, admoenda ceruicibus cucurbitulae sunt, sic, vt cutis incidatur, eadem aut ferramentis, aut sinapi adurenda. Vbi leuatus est dolor, moueriq; ceruix cœpit, scire licet cedere remedijs morbum. Sed diu vitandus cibus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus vtendum, itemq; ours sorbilibus, aut à pullis mollibus ius aliquod assumendum. Id si bene processerit, iamq; ex toto recte se habere ceruices videbuntur, incipiendum erit à pulicula, vel intrita bene madida. Celerius tamen etiam panis mandendus, quam vinum gustandum. Siquidem huius vsus præcipue periculosus, ideoq; in longum tempus differendus est.

De faucium morbis, ac curationibus, & primum de Angina, deinde de Difficultate spirandi, vltimo de Tussi.

CAP. IIII.

VThoc autem morbi genus circa totam ceruicem, sic alterū æquè pestiferū acutumq; in faucibus esse consuevit. Nostri Anginam vocant, apud Græcos nomen prout species est. Interdum enim neq; rubor, neq; tumor vllus apparet,

ret, sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur, membra soluuntur, id σνωάγχλω vocant. Interdum lingua faucesq; cum rubore intumescunt, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies pallet, singultusq; est, id ὡς σνωάγχι vocatur. Illa communia sunt, eger non cibum deuorare, non potionem potest, spiritus eius includitur. Leuius est, vbi tumor tantummodo, & rubor est, cetera non sequuntur, id παρὰ σνωάγχλω appellant. Quicquid est, si vires patiuntur, sanguis mittendus est, si non abundat, secundum est ducere aluum. Cucurbitula quoq; rectè sub mento, & circa fauces admouetur, vt id quod strangulat, euocet. Opus est deinde fomentis humidis. Nam sicca spiritum elidunt. Ergo admouere spongas oportet, quæ melius in calidum oleum, quàm in calidam aquam subinde demittuntur. Efficacissimusq; est hic quoq; salis calidi succus. Tum commodum est hyssopum, vel nepeta, vel thymū, vel absinthium, vel etiam furfures, aut ficus aridas, aut mulsam aquam decoquere, eaq; gargarizare: post hæc, palatum vngere vel felle taurino, vel eo medicamento, quod ex moris est, polline etiam piperis id rectè respergitur. Si per hæc parū proficitur, vltimum est incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, & in palato citra vnam, vel eas venas, quæ sub lingua sunt, vt per ea vulnera morbus erumpat. Quibus si non fuerit eger adiutus, scire licet, malo victum esse. Si verò his morbus leuatus est, iamq; fauces, &

n cibum

cibum et spiritum capiunt, facilis ad bonam va-
letudinē recursus est. At interdum natura quoq;
adiuuat, si ex angustiore sede vitium transit in
latiorē. Itaq; rubore & tumore in præcordiis or-
to, scire licet fauces liberari. Quicquid autē eas
leuauit, incipiendum est ab humidis, maximeq;
aqua mulsa decocta, deinde assumēdi molles &
non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum
habitum reuertantur. Vulgò audio, si quis pullum
hirundinis ederit, angina toto anno non pericli-
tari, seruatumq; eum ex sale, cum is morbus vr-
get, comburi, carbonemq; eius contritū in aquam
mulsam (que potui datur) infricari, & pro-
desse. Id cum idoneos autores ex populo habeat,
neq; habere quicquam periculi possit, quamuis in
monumentis medicorum non legerim, tamen in-
serendum huic operi meo credidi.

De difficultate spirandi.

Est etiam circa fauces malum, quod apud
Græcos aliud atq; aliud nomē habet, prout
se intendit. Omne in difficultate spirandi con-
sistit. Sed hæc dum modica est, neq; ex toto stran-
gulat, *δυσπνοια* appellatur. Cum vehementior
est, ut spirare æger sine sono & anhelatione non
possit, *ἀσπνοια*. Cum accessit id quoq; ne nisi re-
cta ceruice spiritus trahatur, *ὀρθόπνοια*. Ex qui-
bus id, quod primum est, potest diutius trahi.
Duo insequentia acuta esse consuerūt. His com-
munia sunt, quod propter angustias, per quas
spiritus euadit, sibilum elidit, dolor in pectore
præcord

præcordijsq; est, interdum etiam in scapulis, isq;
 modo decedit, modo reuertitur, ad hæc tussicula
 accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet in
 sanguinis detractio. Neq; id satis est, sed lacte
 quoq; venter soluendus est. Liquanda aluus, in-
 terdum etiam ducenda, quibus extenuatum cor-
 pus incipit spiritum trahere commodius. Caput
 autē etiam in lecto sublime habendum est, thorax
 fomentis, cataplasmatissq; calidis, aut siccis, aut
 etiam humidis adiuuandus est, et postea vel ma-
 lagma superimponendum, vel certe ceratum ex
 cyprino vel irino vnguento. Sumenda deinde ie-
 iuno potui malsa aqua, cum qua uel hyssopus co-
 cta, vel contrita capparis radix sit. Datur etiam
 vtiliter, aut nitrum, aut nasturtium, allium fri-
 ctum, deinde contritū & cum melle mistum, si-
 mulq; coquantur mel, galbanum, resina terebin-
 thina, & vbi coierunt, ex his quod fabæ magni-
 tudinem habet, quotidie sub lingua liquatur, aut
 sulphuris ignem non experti * pondo et quadrās, * pondo
 abrotani pondo in vini cyatho teruntur, idq; te- denarij &
 pefactum sorbetur. Est etiam non vana opinio quadrans,
 vulpinum iecur, vbi siccum & aridum factum abrotani
 est, contundi oportere, polentamq; ex eo potioni pōdo dena-
 aspergi, vel eiusdem pulmonem quā recentissi- rij in vini.
 mum assum, sed sine ferro coctum, edendum esse.
 Præter hæc sorbitionibus, & lenibus cibis vten-
 dum est, interdum vino tenui austero, nonnun-
 quam vomitu. Prosunt etiam quacunq; urinam
 augent, sed nihil magis quā ambulatio lenta
 n 2 penè

penè vsq; ad lassitudinem, frictio multa, præcipue inferiorū partium, vel in sole, vel ad ignem, & per seipsum, & per alios, vsq; ad sudorē. In interiore verò faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac plerique extrinsecus cataplasmatibus calidis, fomentisq; humidis vtuntur. Volunt etiam vaporem calidum ore recipi, per quem molliores alij partes eas fieri dicunt, opportunioreq; vitio iam hærenti. Sed si bene sic vitari morbus potest, tuta illa præsidia. Si metus eius est, superuacua sunt. Vtiq; autē perfricare fauces periculosum est: exulcerat enim, neq; vtilia sunt, quæ vrine mouendæ sunt apta, quia possunt dum transeunt, ibi quoq; pituitam extenuare, quam suppressi melius est. *Asclepiades.* multarum rerū, quas ipsi quoq; secuti sumus, auctor bonus, acetum ait quàm acerrimum esse sorbendū: hoc enim sine ulla noxa comprimere ulcera. Sed id suppressere sanguinem potest, vlcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei lycium est, quod idem quoq; æquè probat, uel porri, uel marubij succus, vel nuces Græcæ cum tragacantho contrite, & cum passo mistæ, vel lini semē contritum, & cum dulci vino mistum. Exercitatio quoq; ambulandi, currendiq; necessaria est. Frictio à pectore vehemēs toti inferiori parti adhibenda. Cibi verò esse debent, neq; nimium acres, neq; asperi, mel, lenticula, tragum, lac, ptisana, pinguis quoq; caro, præcipueq; porrum, & quicquid cum hoc mistum est. Potionis quamminimū

num esse conuenit. Aqua dari potest, vel pura, vel in qua mala cydoneum, palmulæ uel decoctæ sunt. Gargariſationes quoque lenes: ſin hæ parum proficiunt, reprimentes utiles ſunt. Hoc genus neque acutum eſt, & poteſt eſſe non longum, curationem tamen maturam, ne vehementer & diu ledat, deſiderat.

De Tuſſi.

Tuſſis verò ferè propter faucium exulcerationem moleſta eſt, quæ multis modis contrahitur. Itaque illis reſtitutis ipſa finitur. Solet tamen interdum per ſe quoque male habere, & vix cum vetus facta eſt eliditur, ac modò arida eſt, modò pituitam citat. Oportet hyſſopum altero quoq; die bibere, ſpiritu retento currere, ſed minime in puluere, ac lectione vti vehementi, quæ primo impeditur à tuſſi, poſt eam vincit, tum ambulare, deinde per manus quoq; exerceri, & pectus diu perfricare. Poſt hæc quàm pinguiſſimæ ficus vncias tres ſupra prunas incoctas, eſſe. Præter hæc ſi humida eſt, proſunt frictiones validæ, cum quibuſdam calefacientibus, ſic, vt caput quoq; ſiccum vehementer perfricetur. Item cucurbitula pectori admota, ſinapi ex parte exteriore faucibus impositum, donec leuiter exulceret, potio ex menta, nucibusq; Græcis & amylo, primoq; aſſumptus panis aridus, deinde aliquis cibus lenis. At ſi ſicca tuſſis eſt, cum ea vehementiſſime vrget, adiuuat vini aſteri cyathus aſſumptus, dum ne amplius id interpoſito

n 3 temp

tempore aliquo, quàm ter aut quater fiat. Item laseris quàm optimi paulum deuorare opus est, porri vel marrubij succum assumere, scillam delingere, acetum ex ea, vel certe acre sorbere, aut cum spica allyi contriti duos vini cyathos. Vtilis etiam in omni tussi est peregrinatio, nauigatio longa, loca maritima, natationes. Cibus interdum mollis, vt malua, vt vrtica: interdum acer, vt lac cum allio coctum, sorbitiones quibus laser sit adiectum, aut in quibus porrum incoctum tabuerit, ouum sorbile sulphure adiecto, potus primum aqua calida, deinde inuicem alijs diebus hæc, alijs vinum. Magis terreri potest aliquis, cum sanguinem expuit. Sed id modò minus, modò plus periculi habet. Exit enim modò ex gingiuis, modò ex ore, & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine vlcere, sine gingiuarum vllò vitio, ita vt nihil excreetur. Verum vt ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atq; interdum sanguis profluit, interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is à summis faucibus fertur, modò exulcerata ea parte, modò non exulcerata, sed aut ore vene alicuius adaperto, aut tuberculis quibusdam natis, ex his sanguine erumpente. Quod vbi incidit, neque ledit potio aut cibus, neq; quicquam aut ex vlcere excreatur. Aliquando gutture & arterijs exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque extundit. Interdum etiam fieri solet, vt aut ex pulmone, aut

ex pectore, aut ex latere, aut iocinore feratur. Sæpe fœminæ, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc expiunt, autoresq; medici fuerunt, vel exesa parte aliqua sanguinem exire, vel rupta, vel ore alicuius venæ patefacto. Primam *διὰ θώρακος*, secundam *ἐκ γαστρίδος*, tertiam *ἐκ σπλινός* appellant. Ultima minime nocet, prima grauissimè. Ac sæpe quidem euenit, uti sanguinem pus sequatur: interdum autem qui sanguinem ipsam suppressit, satis ad valetudinem profuit. Sed si secuta vlcera sunt, si pus, si tussis est, prout sedes ipsa est, ita varia & periculosa genera morborum sunt. Si verò sanguis tantum fluit, expeditius & remedium & finis est. Neq; ignorari oportet, eis quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæ ue, aut post cursum vehementem vel ambulationem, dum febris absit, non esse inutile sanguinis mediocri profluvium, idq; per urinam redditum, ipsam quoque lassitudinem soluere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decidit: si tamen in eius urina nihil nouabit. Neq; vomitum huius afferre periculum, etiam cum repetit, si antè confirmare & implere corpus licuit: & ex toto nullum nocere, qui in corpore robusto, neque nimius est, neque tussim aut calorem mouet. Hæc pertinent ad uniuersum. Nunc ad ea loca quæ proposui veniam. Si ex gingiuis exit, portulacam manducasse satis est: si ex ore, continuasse eo merum vinum: si id parum

proficit, acetum: si inter hæc quoque grauer
erumpit (quia consumere hominem potest) com-
modissimum est, impetum eius admota occipi-
tio cucurbitula, sic vt cutis quoque incidatur,
auertere. Si id mulieri, cui menstrua non ferun-
tur, euenit, eandem cucurbitulam incisus ingui-
nibus eius admouere. At si ex faucibus, in-
terioribus'ue partibus processit, & metus ma-
ior est, & cura maior adhibenda: sanguis mit-
tendus est, & si nihilominus ex ore processit,
iterum tertioq; & quotidie paulum aliquid,
protinus autem debet sorbere vel acetum, vel
etiam cum thure plantaginis aut porri succum,
imponendaq; extrinsecus supra id quod dolet la-
na succida ex aceto est, & id sponsia subinde
refrigerandum. Erasistratus horum crura quo-
que & femora, brachiaq; pluribus locis deliga-
bat. Id Asclepiades adeo non prodesse, vt etiam
inimicum esset, proposuit. Sed id sæpe commodè
respondere experimenta testantur. Neque ta-
men pluribus locis deligari necesse est, sed sat est
infra inguina & super talos, summosq; hume-
ros, etiam brachia. Tum si febris vrget, danda
est sorbitio, & potui aqua, in qua aliquid ex
his quæ aluum astringunt, decoctum sit: ac si
abest febris, vel elota alica, vel panis ex aqua
frigida, & molle quoque ouum dari potest po-
tui vel idem quod supra scriptum est, vel vinum
dulce, vel aqua frigida, sed sic bibendum erit,
vt sciamus huic morbo sitim prodesse: præter hæc
necessar

necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput huius quoque cubantis sublime esse debet, re-
cteque tondetur. Facies sæpe aqua frigida foven-
da est. At inimica sunt vinum, balneum, ve-
nus, in cibo oleum, acriora omnia, item calida
fomenta, conclaue calidum & inclusum, multa
vestimenta corpori iniecta, etiam fricationes,
ubi bene etiam sanguis conquieuit. Tum verò in-
cipiendum est à brachijs, cruribusque, à thorace
abstinendum. In hoc casu per hyemem locis ma-
ritimis, per æstatem mediterraneis opus est.

De stomachi morbis, & curationibus.

C A P. V.

Faucibus subest stomachus, in quo plura
longa vitia incidere consuerunt. Nam mo-
dò ingens calor, modò inflatio hunc, modò in-
flammatiō, modò exulceratio afficit. Interdum
pituita, interdum bilis oritur, frequentissimumque
est eius malum, quo resoluitur, neque vlla re ma-
gis aut afficitur, aut corpus afficit. Vt diuersa
autem vitia eius, sic etiam remedia sunt. Vbi
exæstuat, aceto cum rosa extrinsecus subinde fo-
uendus est, imponendusque pulvis cum oleo, &
ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt, &
mollunt. Potui (nisi quid obstat) gelida aqua
præstanda. Si inflatio est, prosunt admota cu-
curbitula: neque incidere cutem necesse est: pro-
sunt sicca & calida fomenta, sed non vehemen-
tissima. Interponenda abstinētia est. Vtilis in
ieiunio potio est absinthij aut hyssopi aut rutæ.

n 5 Exerc

Exercitatio primò lenis, deinde maior adhibenda est, maximeq; quæ superiores partes moueat. Quod genus in omnibus stomachi vitijs aptissimum est. Post exercitationem opus est vñctione, frictione, balneo quoque nonnunquam, sed rarius, interdum alui ductione. Cibus deinde calidis, neque instantibus, eodemq; modo calidis portionibus, primò aque, post, vbi resedit inflatio, vini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi vitijs præcipiendum est, vt quo modo se quisque eger refecerit, eo vt sanus vtatur. Nam redit huic imbecillitas sua, nisi iisdem defendatur bona valetudo, quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est, quam ferè tumor & dolor sequitur, prima sunt quies & abstinentia, lana sulphurata circumdata, in ieiuno absinthium. Si ardor stomachum vrget, aceto cum rosa subinde fouendus est, deinde cibus quidem vtendum est modicis. Imponenda verò extrinsecus quæ simul & reprimunt & molliunt: deinde his detractis, vtendum calidis ex farina cataplasmatibus, quæ reliquias digerant. Interdum aluius ducenda. Adhibenda exercitatio, & cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem ferè facienda sunt, quæ in saucibus exulceratis præcepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi leues & glutinosi cibi, sed citra satietatem. Omnia acrida atque acida remouenda. Vino, si febris non est, dulci: aut si id inflat, certe leni vtendum, sed neq; præ frig

præfrigido, neque nimis calido. Si verò pituita
 stomachus impletur, necessarius modò in ieiunio,
 modò post cibum vomitus est. Vtilis exercitatio,
 gestatio, nauigatio, frictio. Nihil edendum, bi-
 bendumq; nisi calidum, vitatis tantum his, qua
 pituitam contrahere consuerunt. Molestius est,
 si stomachus bile vitiosus est. Solent autem hi,
 qui sic tentantur, interpositis quibusdam diebus
 hanc (& quidem quod pessimum est) atram vo-
 mere. His rectè aliis ducitur, potiones ex ab-
 synthio dantur: necessaria gestatio, nauigatio,
 & (si furi potest) ex nausea vomitus, vi-
 tanda cruditas, sumendi cibi faciles & stoma-
 cho non alieni, vinum austerum. Vulgatissimum
 verò pessimumq; stomachi vitium est resolutio,
 id est cum cibi non tenax est, soletq; desinere ali
 corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi insti-
 lissimum balneum est. Lectiones exercitatio-
 nesq; superioris partis necessariae. Item vnctio-
 nes, frictionesq; hinc perfundi frigida, atque in
 eadem natare, canalibus eiusdem subijcere etiam
 stomachum ipsum, & magis etiam à scapulis,
 id quod contra stomachum est. Consistere in fri-
 gidis, medicatisq; fontibus, quales cutiliarum
 *subcutiliarumq; sunt, salutare est. Cibi quoque
 assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter
 coquantur, quam facile vitiantur. Ergo ple-
 rique, qui nihil aliud concoquere possunt, bubu-
 lam coquant. Ex quo colligi potest, neque auem,
 neq; venationem, neque piscem dari debere, ni-
 si gen

*symbria
 narumq;

De aquis
 cutilijs, Plin-
 nius lib. 2.
 cap 95. ite
 lib. 31. ca. 2.
 & 6. de is-
 dem & vi-
 truni lib.
 8. cap. 14.

si generis durioris. Potui quidem aptissimum est
vinum frigidum, vel certè bene calidum mera-
tum, potissimum rheticum, vel allobrogicum,
aliud'ue, quod & austerum & resina conditum
est: si id non est, quàm asperrium, maximeq;
signinum. Si cibus non continetur, danda aqua,
& eliciendus plenior vomitus est, iterumq;
dandus cibus, & tum admouendæ duobus in-
tra stomachum digitis cucurbitula, ibiq; duabus
aut tribus horis continendæ sunt. Si simul &
vomitus & dolor est, imponenda supra stoma-
chum est lana succida, vel sponsia ex aceto, vel
cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda verò
non diu, sed vehementer brachia, & crura, &
calefacienda. Si plus doloris est, infra præcor-
dia quatuor digitis cucurbitula vtendum est,
protinus dandus panis ex posca frigida. Si non
continuit, post vomitum lene aliquid ex his,
quæ non aliena stomacho sint. Si ne id quidẽ te-
nuit, singuli cyathi vini singulis interpositis ho-
ris, donec stomachus consistat. Valens etiam me-
dicamentum est radicle succus, valentius aci-
di punici mali, cum pari modo succi, qui ex dul-
ci punico malo est, adiecto etiam intubi succo &
menta, sed huius minima parte, quibus tantun-
dem, quantum in his omnibus est, aquæ frigide
quamoptime miscetur. Id enim plus quàm vi-
num ad comprimendum stomachum potest, sup-
primendus autem vomitus est, qui per se venit,
sic, si nausea est. Sed si coacuit intus cibus, aut
comp

computruit, quorum utrumlibet ructus ostendit, eijciendus est, protinusq; cibis assumptis iisdem quos proxime posui, stomachus restituentus. Vbi sublatu est præsens metus, ad ea redeundum est, quæ supra præcepta sunt.

De laterum doloribus.

CAP. VI.

Stomachus lateribus cingitur, atque in his quoq; vehementes dolores esse consuerunt, & initium vel ex frigore, vel ex ictu, vel ex nimio cursu, vel ex morbo est. Sed interdum id malum intra dolorem est, isq; modo tardè, modo celeriter soluitur: interdum ad perniciem quoq; procedit, oriturq; acutus morbus, qui pleuriticus à Græcis nominatur. Huic dolori lateris febris, & tussis accedit, & per hanc excreatur: si tolerabilis morbus est, pituita: si grauis, sanguis. Interdum etiam sicca tussis est, quæ nihil emollitur. Idq; primo vitio grauius, secundo tolerabilius est. Remedium verò est magni & recentis doloris, sanguis missus. At siue lenior, siue vetustior casus est, vel supernuacuum, vel serum id auxilium est, confugiendumq; ad cucurbitulas est, antè summa cute incisa. Recte etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec vlcera pustulasq; excitet, & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc circumdare primum oportet latus ipsum lana sulphurata: deinde cum paulum, inflammatio se remisit, siccis & calidis fomentis uti. Ab his transitus ad malagmata est. Si vetustior dolor remanet, nouissimè resina

resina imposita discutitur. Utendum cibis, potio-
nibusq; calidis, vitandū frigus. Inter hæc tamen
non alienum, & extremas partes oleo & sul-
phure perfricare. Si leuata tussis est, leni lectione
vti, iamq; & acres cibos, & vinum meracius
assumere. Quæ à medicis præcipiuntur, vt tamē
sine hi, rusticos nostros epota ex aqua herba tri-
xago satis adiuvet. Hæc in omni lateris dolore
communia sunt, plus negotij est, si acutus quo-
que morbus is factus est. In hoc præter ea quæ
suprà posita sunt, hæc animaduertenda sunt, vt
cibus sit quammaxime tenuis & lenis, præci-
pueq; sorbitio, eaq; ex ptisana potissimum, aut
ius in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus
sit. Idq; non nisi tertio quoq; die detur, si tamen
per vires licebit: potio verò aqua mulsa, in qua
hyssopum aut ruta decocta sit. Quæ quibus tem-
poribus danda sint, ex ratione vel adiectæ, vel
leuata febris apparebit, sic, vt in remissione
quàm maxima dent, cum eo tamen, vt sciamus
non esse eius generis tussi aridas fauces commit-
tendas. Sæpe enim, vbi nihil est quod excrea-
tur, cōtinuatur, & strangulat. Ob quam causam
dixi etiam peius id genus esse tussis, quod nihil,
quàm quod pituitam moueret. Sed hic vinum
sorbere, vt suprà præcepimus, morbus ipse non
patitur, in vicem eius cremor ptisanæ sumendus
est. Vt his autē in ipso morbi feruore sustinendus
ager est, sic vbi paulū is se remisit, alimenta ple-
niora & vini quoq; aliquid dari potest, dum
nihil

nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectiōe quoq; manserit tussis, intermittere oportebit vno die, posteroq; cum cibo vini paulo plus assumere. Atque incipiente quoq; tussi, tum non erit alienum (vt supra quoq; positum est) vini cyathos sorbere. Sed in hoc genere valetudinis dulce, vel certè lene commodius est. Si malum inueterauit, athletico victu corpus firmandum est.

De viscerum morbis, & primo de Pulmone,
deinde de Iocinore, tum de Liene, postremo de Renibus.

CAP. VII.

A Compagine verò corporis ad viscera trās-
eundum est, & in primis ad pulmonem
veniendum, ex quo vehemens & acutus mor-
bus oritur, quem peripneumonicon Græci vo-
cant. Eius hæc conditio est. Pulmo totus affici-
tur, hunc eius casum subsequetur tussis, bilem vel
pus trahens, præcordiorum, totiusq; pectoris
grauitas, spiritus difficultas, magnæ febres,
continua vigilia, cibi fastidium, tabes. Id ge-
nus morbi plus periculi, quàm doloris habet.
Oportet, si satis validæ vires sunt, sanguinem
mittere: si minores, cucurbitulas sine ferro præ-
cordijs admoovere. Tum si satis valet, gestando
egrum, digerere: si parum, intra domum ta-
men dimouere. Potionem autem hyssopi dare,
cui ficus arida sit decocta, aut aquam mulsam,
in qua vel hyssopum vel ruta decocta sit. Fri-
ctione vti diutissime in scapulis, proximè ab his
in braci

in brachijs, & pedibus, & cruribus, leuiter contra pulmonem, idq; bis quotidie facere. Quod ad cibū verò pertinet, huic nec salsis opus est, neq; acribus, neq; amaris, neq; aluum astringentibus, sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus danda est sorbitio ptisanæ, vel alicæ, vel oryzae, cum qua recens adeps cocta sit. Cum hac sorbibile ouum, nuclei pinei ex melle, panis, vel elota alicæ, ex aqua mulsa: potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsa egelida: aut si æstas est, etiam frigida, nisi quid obstat. Hæc autem altero quoq; die incrementum morbo dare satis est. Vbi in incremento constitit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, præterquam aqua egelida. Si vires desunt, adiuuandæ sunt aqua mulsa, profuntq; aduersus dolores imposita calida fomenta, vel quæ simul & reprimunt & emolliunt. Prodest impositus super pectus sal bene contritus, cum cerato mistus, quia leuiter cutem erodit, eoq; impetum materiæ, quo pulmo vexatur, euocat. Vtile etiam aliquod malagma est ex his quæ materiam trahunt. Neque alienum est dum premit morbus, clausis fenestris ægrum continere. Vbi paulum lenatus est, ter aut quater die, fenestris aliquanto apertis, paruum aërem recipere. Deinde in refectione pluribus diebus à vino abstinere, gestatione, frictioe vti, lorū: uel, sorbitionibus, & prioribus cibis adycere, ex tyrunculis, oleribus porrum, ex carne ungulas, & summa* trunculorum, atque pisciculos, sic, ut diu nihil

Aqua mul-
sa.

*uētricu-
lorū:
tyruncu-
lorum.

nihil molle & lene sumatur.

De iocinoris morbo, & curatione. CAP. VIII.

Alterius quoq; visceris morbus, id est, iocinoris aequè modò longus, modò acutus esse consuevit, ἰππατινὸν Græci vocāt. Dextra parte sub præcordijs vehemens dolor est, idemq; ad latus dextrum, et ad iugulum, humerumq; partis eiusdem peruenit, nonnunquam manus quoq; dextra torquetur, horror calidus est. Vbi male est, bilis euomitur, interdū singultus propè strangulat. Et hæc quidem acuti morbi signa sunt: longioris verò, vbi suppuratio in iocinore est, dolorq; modo finitur, modò intenditur: dextra parte præcordia dura sunt, & tument, post cibum maior difficultas est, accedit maxillarum quedam resolutio, vbi inueterauit malum, venter & crura pedesq; intumescunt, pectus atque humeri, circaq; iugulum vtrunque extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est, tum venter soluendus est: si non potest aliter, per nigrum veratrum imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quæ reprimant, deinde calida quæ deducant, quibus rectè iris vel absynthium adiicitur, post hæc malagma. Dandæ verò sorbitiones sunt, omnesq; cibi & calidi, & qui non multum alant, & ferè qui pulmonis quoque dolori conueniunt, præterq; eos qui vrinam mouent, potionesq; ad id efficaces. Vtilia in hoc morbo sunt thymum, satureia, hyssopum, nepeta, amyllum, sisamum, lauri bacca, pini flos, herba
o sanguin

sanguinalis, menta, ex malo cotoneo medium, columba iecur recens & crudum. Ex quibus quaedam per se esse, quaedam adijcere vel sorbitioni, vel potioni licet, sic tamen ut parè assumantur. Neq; alienum est absynthium cōtritum ex melle, & pipere, eiusq; catapotium quotidie deuorare: abstinendum utiq; est ab omnibus frigidis: neq; enim res vlla magis iecur lēdit. Frictionibus vtendum in extremis partibus, vitandus omnis labor, omnis vehementior motus, ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, ictus, cursus, inimica sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua: si hyems est, calida: si aestas, tepida. Item liberalis vntio, & in balneo sudor. Si uerò iecur uomica laborat, eadem facienda sunt, quae in ceteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam contra id scalpello aperiunt, ipsam uomicam adurunt.

De lienis morbo, & curatione. C A P. I X.

AT lienis ubi affectus est, intumescit, simulq; cum eo pars sinistra, eaq; dura est, & prementi renititur, uenter intentus est, aliquis etiam cruribus est tumor. Vlcera aut omnino non sanescunt, aut certe cicatricem uix recipiunt. In intenta ambulatione, cursuq; dolor, & quaedam difficultas est. Hoc uitium quies augeat. Itaque exercitatione & labore opus est, habita tamen ratione, ne febre mista, si nimium processerit, excitetur. Vntiones, frictionesq;, & sudores necessarij sunt. Dulcia omnia inimica sunt.

sunt. Item lac & caseus. Acida autem maxime
conueniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, &
magis etiam, quod scilla conditum est, expedit.
Edenda sunt salsamenta: uel oleum ex muria dura
tincta in aceto lactuca, intubiq; & beta ex eo-
dem, ex sinapi asparagus, armoracia, pastina-
ca, ungula, rostra, aues macra, eiusdem generis
uenatio. Potui uero ieiuno dari debet absynthii
incoctum, at post cibum aqua à ferrario fabro,
in qua candens ferrum subinde tinctum sit.
Hac enim uel precipue lienem coercet: quod
animaduersum est in his animalibus, quæ apud
hos fabros educata, exiguos lienes habent. Po-
test etiam dari uinum tenue, austerum, omniaq;
in cibis & potionibus quibus urinæ mouendæ
sunt, precipueq; ad id ualet, uel trifolij semen,
uel cumini, uel apium, uel serpillum, uel cythisus
uel portulaca, uel nepeta, uel thymum, uel hys-
sopum, uel satireia. Hæc enim inde commodis-
simè uidentur humorem deducere. Lienis quo-
que bubulus utiliter esui datur: precipueq; eru-
ca & nasturtium lienem extenuant. Imponenda
quoq; extrinsecus sunt, quæ leuēt. Fit ex unguen-
to & palmulis, quod *μυγδαλαέρον* Græci uo-
cant. Fit ex lini & nasturtij semine, quo uinum
& oleum adijcitur. Fit ex cupresso uiridi, &
arida ficu. Fit ex sinapi, cui seui hircini à reni-
bus quarta pars ponderis adijcitur, teriturq; in
sale, et protinus imponitur. Multisq; modis huic
rei cappari aptum est. Nam & ipsum cum ci-

bo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere commodum est. Quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem eius cum fursuribus, aut ipsum cappari cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

De renum morbis, & curationibus. C A P. X.

ATrenes ubi affecti sunt, diu male habent. Peius est, si frequens biliosus vomitus accedit. Oportet conquiescere, cubare molliter, soluere aluum, si aliter non respondet, etiam ducere: saepe desiderare in aqua calida, neque cibum, neque potionem frigidam assumere, abstinere ab omnibus salsis, acerbis, acidis pomis, bibere liberaliter, adycere modò cibo, modò potioni piper, porrum, ferulam, album papauer. Quæ maxime inde urinam mouere consuerunt. Auxilio quoque his exulceratis sunt, si adhuc vlcera purganda sunt, cucumeris semina detractis corticibus sexaginta, nuclei ex pinu syluestri duodecim, anisi, quod tribus digitis sumi possit, croci paulum, contrita, & in duas mulsi portiones diuisa. Si verò dolor tantum leuandus est, eiusdem cucumeris semina triginta, ydem nuclei viginti, nuces Græcæ quinque, croci paululum, contrita & cum la-
* at super Ele potui data, * ac insuper quoq; recte quedam malagmata injiciuntur, maximeq; ea, quæ humori extrahendo sunt.

De intestinorum morbis, & primo de Cholera.

C A P. X I.

A visc

A Visceribus ad intestina veniendum est, quæ sunt & acutis, & longis morbis obnoxia. Primò equè facienda mentio est cholera, quia commune id stomachi, atq; intestinorum vitium videri potest. Nam simul & deiectio, & vomitus est, præterq; hæc inflatio est, intestina torquentur, bilis supra infraq; erumpit, primum aquæ similis, deinde vt in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnunquã nigra, vel varia. Ergo eo nomine morbum hunc *χολέρα* Græci nominarunt. Præter ea verò quæ supra cōprehensa sunt, sæpe etiam crura manusq; contrahuntur, vrget sitis, anima deficit: quibus concurrentibus non mirum est, si subito quis moritur. Neq; tamen vlli morbo minori momento succurritur. Protinus ergo vbi ista cœperunt, aquæ tepidæ quàm plurimum bibere oportet, & vomere. Vix vnquam sine vomitu sequitur, sed etiam si non incidit, miscuisse tamen nouam materiam corruptæ prodest, parsq; sanitatis est vomitum esse suppressum: si id incidit, protinus ab omni potione abstinendum est. Si verò tormina sunt, oportet frigidis, & humidis fomentis stomachum fouere: sed si venter dolet, ijsdem egelidis, sic vt venter ipse mediocriter calentibus inuenitur. Quod si vehementer & vomitus, & deiectio, & sitis vexant, & adhuc subcruda sunt quæ vomuntur, nondum vino maturum tempus est, aqua, neque ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est, adnouendumq; naribus est

pulegium ex aceto, vel polenta vino aspersa, vel menta, si nondum matura est. At cum discussa cruditas est, tum magis verendum est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad vinum. Id esse oportet tenue, odoratum, cum aqua frigida mistum, vel polenta adiecta, vel melle quoque assumere expedit, quotiesq; aliquid aut stomachus, aut venter effudit, toties per hæc vires restituere. Erasistratus primo tribus vini guttis, aut quinis aspergendam potionem esse dixit, deinde paulatim merum adiendum. Is si & ab initio vinum dedit, & metum cruditatis secutus est, non sine causa fecit. Si vehementem infirmitatem adiuuari posse tribus guttis putavit, erravit. At si inanis est homo, & crura eius contrahuntur, interponenda potio absynthij est. Si extremæ partes corporis frigent, ungenda sunt calido oleo, cui cereæ paulum sit adiectum, calidisq; fomentis nutrienda. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula admouenda est, aut sinapi super imponendum. Vbi his constitit, dormire oportet, postero die utique à potione abstinere, die tertio in balneum ire, paulatim se cibo reficere: somno, quisquis facile acquiescit, itemq; lassitudine, & frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, aluum duci necessarium est, tum cibus, vinoq; utendum est, sed hic quidem morbus & acutus est, & inter intestina, stomachumq;

chumq; versatur, sic ut cuius potissimum partis sit, non facile dici possit.

De Cœliaco ventriculi morbo. CAP. XII.

IN ipsius verò ventriculi porta consistit is, qui & longus esse consuevit, νοιδιανδς à Græcis nominatur. Sub hoc venter indurescit, dolorq; eius est. Aluus nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Extremæ partes frigescunt. Difficulus spiritus redditur. Comodissimum est inter initia calida cataplasmata toto ventri imponere, ut dolorem leniant, post cibum vomere, atq; ita ventrem exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro ventri, & coxis ad-mouere. Ventrem ipsum liquare dato lacte, & vino salso frigido. Si tēpus anni patitur, etiam viridibus ficis, sic tamen, ne quis aut cibus aut humor vniuersus detur, sed paulatim. Ergo per interualla temporis sat est cyathos binos ternos'ue sumere, & cibum pro portione huius: commodeq; facit cyatho lactis cyathus aquæ mistus, & sic datus. Cibiq; inflantes, et acres utiliores sunt, adeo ut lacti quoq; recte contritum allium adiiciatur. Procedente verò tempore opus est gestari, maximeq; nauigare, perfricari ter aut quater die, sicut nitrum oleo misceatur, perfundi aqua calida post cibum, deinde sinapi imponere per omnia membra, excepto capite, donec arrodatur & rubeat, maximeq; si corpus durum & virile est, paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ ventrem comprimunt.

Assa caro danda, valens & quæ non facile cor-
rumpatur: potui verò pluuiæ aqua decocta, sed
quæ per binos ternos' ve cyathos bibatur. Si ve-
tus vitium est, oportet laser quàm optimum ad
piperis magnitudinem deuorare, altero quoq; die
vinum, vel aquam bibere, interdum interposito
cibo singulos vini cyathos sorbere, ex inferiori
parte infundere pluuialem egelidâ aquam, ma-
ximeq; si dolor in imis partibus remanet.

De tenuioris intestini morbo. CAP. XIII.

Inter ipsa verò intestina cōsistunt duo mor-
bi, quorum alter in tenuiore, alter in pleniore
intestino est. Prior acutus est. Insequens esse lon-
gus potest. Diocles Carystius tenuioris intesti-
ni morbum $\chi\omicron\gamma\delta\alpha\psi\omicron\nu$, plenioris $\epsilon\lambda\epsilon\delta\omicron\nu$ nomina-
uit. A plerisq; video nunc illum priorem $\epsilon\lambda\epsilon\delta\omicron\nu$,
hunc $\chi\omicron\gamma\delta\epsilon\omicron\nu$ nominari. Sed prior modò supra
umbilicum, modò sub umbilico dolorem mouet.
Fit ex alterutro loco inflammatio, nec aliud, nec
spiritus infrâ transmittitur. Si superior pars af-
fecta est, cibus: si inferior, stercus per os reddi-
tur: si utrumlibet vetus est, adijcitur periculo
vomitibus biliosus, mali odoris, aut varius, aut ni-
ger. Remedium est sanguinem mittere, vel cu-
curbitulas pluribus locis admouere, nō ubiq; cu-
te incisa. Id enim duobus aut tribus locis satis
est. Ex cæteris spiritū euocare, abunde est. Tum
animaduertere oportet, quo loco malum sit. Solet
enim contra id tumere. Et si supra umbilicum
est, alui ductio utilis nō est. Si infrâ est, aluum
ducere

ducere (vt Erasistrato placuit) optimum est, & sepe id auxilij satis est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore cum oleo & melle, sic vt præter ea nihil adiiciatur. Si nihil tumet, duas manus imponere oportet, supra summum ventrem, paulatimq; deducere. Inuenietur enim mali locus qui necesse est renitatur, & ex eodem deliberari poterit, ducenda nec'ne alius sit. Illa communia sunt, calida cataplasmata ad mouere, eaq; imponere à mammis vsq; ad inguina, & spinam, ac sepe mutare: brachia, cruraq; perfricare, demittere totum hominem in calidum oleum. Si dolor non quiescit, etiam in aluum ex parte inferiore tres, aut quatuor cyathos calidi olei dare. Vbi per hæc consecuti sumus, vt iam ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui mulsum tepidum non multum. Nam antè magna cura vitandum est, ne quid bibat. Si id commodè cessit, adycere sorbitionem. Vbi dolor & febricula quierunt, tum demum vti cibo pleniore, sed neq; inflante, neq; duro, neq; valido, ne intestina adhuc imbecilla ledantur, potui verò nihil præterquam puram aquam. Nam siue quid vinolentum, siue acidum est, id huic morbo alienum est. Ac postea quoq; vitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, cæterosq; corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit, & siue cum frigus subit, siue aliqua iactatio, nisi bene iam confirmatis intestinis, reuertitur.

De morbo intestini plenioris. CAP. XIII.

IS autem morbus, qui in intestino plenior est, in ea maxime parte est, quam cecam esse proposui. Vehemens inflatio, vehementes dolores dextra magis parte, intestinum quod verti videtur, prope spiritum elidit. In plerisque post frigora, cruditatesque oritur, deinde quiescit, et per aetatem saepe repetens, sic cruciat, ut vita spatio nihil demat. Vbi is dolor coepit, admonere sicca et calida fomenta oportet, sed primo lenta, deinde validiora, simulque frictiones, ad extremas partes, id est, crura, brachiaque; materiam reuocare. Si discussum non est, qua dolet, cucurbitulas sine ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei causa comparatum, quod νολινδον nominatur. Id se reperisse Cassius gloriabatur. Magis prodest potui datum, sed impositum quoque extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem leuat. Nisi finito vero tormento, recte neque cibus neque potio assumitur. Quo victu sit utendum, qui hoc genere tentantur, iam mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod νολινδον nominatur, ex his constat: Costi, anesi, castorei, singulorum P. denariorum III. *. petroselini P. denariorum III. piperis longi, et rotundi, singulorum P. *. II. papaueris lacrymae, iunci rotundi, myrrhae, nardi, singulorum P. VI. *. quae melle excipiuntur, id autem et deuorari potest, et ex aqua calida sumi.

De

De Torminibus, id est, δυσεντερίᾳ. CAP. XV.

Proxima his inter intestinorum mala, tormina esse consueuerunt, δυσεντερίᾳ Græce vocatur, intus intestina exulcerantur. Ex his cruor manat. Isq; modò cū stercore aliquo semper liquido, modò cum quibusdam quasi mucosis excernitur, interdum simul quedam carnosae descendunt. Frequens deiiciendi cupiditas, dolorq; in ano est. Cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur. Atq; eo quoq; tormentum intenditur. Idq; post tēpus aliquod leuatur, exiguaq; requies est, somnus interpellatur, febricula oritur, longoq; tempore id malum cum inueterauerit, aut tollit hominem, aut etiam (si finitur) excruciat. Oportet in primis cōquiescere. Siquidem omnis agitatio exulcerat, deinde ieiunium sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquefolij sit adiecta, imponere cataplasmata super ventrem, quæ reprimunt, quod in superioribus ventris morbis nō expedit, quotiesq; desidit, subluere aqua calida, in qua decoctæ verbenæ sint, portulacam vel coctam, vel ex dura muria edisse, cibos, potionesq; eas, quæ astringunt aluum. Si vetustior morbus est, ex inferioribus partibus tepidum infundere, vel ptisanæ cremorem, vel lac, vel adipem liquatam, vel medullam ceruinam, vel oleum, vel cum rosa butyrum, vel cum eadem album crudū ex ouis, vel aquam, in qua lini semen decoctum sit: vel si somnus non accedit, vitellos cum aqua, in qua rosæ floris folia cocta

cocta sint. Leuant enim dolorem hæc, & mitiora vlcera efficiunt, maximeq; vtilia sunt, si cibi quoq; secutum fastidium est. Themison muria dura quàm asperrima sic vtendum memoria prodidit. Cibi verò esse debent, qui leniter ventrem distringant, & ea quæ vrinam moueant. Si ea consecuta sunt, in aliam partem humorem auertendo, prosunt: si non sunt consecuta, noxam augent. Itaq; nisi in quibus promptè id facere consueuerunt, non sunt adhibenda. Potui si febricula est, aqua pura calida, vel ea quæ ipsa quoq; astringat, dari debet: si non est, vinum lene, austerum. Si pluribus diebus nihil remedia alia iuuerunt, vetusq; iam vitium est, aquæ bene frigide potio assumpta vlcera astringit, & initium secundæ valetudinis facit. Sed vbi venter suppressus est, protinus ad calidâ potionem reuertendum est. Solet autem interdum etiam putris sanies pessimiq; odoris descendere, solet purus sanguis profluere. Si superius vitium est, aluius aqua mulsa duci debet, tunc deinde eodem infundi, quæ supra comprehensa sunt. Valensq; est etiam aduersus vlcera intestinorum minij gleba, cum salis hemina contrita. Si minus, mista his aqua in aluum datur. Ac si sanguis profluit, cibi potionesq; esse debent, quæ astringant.

De læuitate intestinorum.

CAP. XVI.

EX torminibus interdum intestinorum læuitas oritur, quæ continere nihil possunt, et quicquid assumptum est, imperfectum protinus reddunt.

reddunt. Id interdum egros trahit, interdum
 precipitat. In hoc utiq; adhibere oportet com-
 primendia, quò facilius tenendi aliquid intesti-
 nis vis sit. Ergo & super pectus ponetur sinapi,
 exulcerataq; cute, malagma, quod humorē euo-
 cet, & ex verbenis decoctis aqua desidat, & Desidat,
subaudi æ-
ger: sic im-
frā cap.
proxi.
 cibos, potionesq; assumat, quæ aluum astringunt,
 & frigidis vtetur perfusionibus. Oportet tamen
 prospicere, ne simul his omnibus admotis vitium
 contrarium per immodicas inflationes oriatur.
 Paulatim ergo firmari intestina debebunt, ali-
 quibus quotidie adiectis. Et cum in omni fluore
 ventris, tum in hoc precipuè necessarium est, non
 quoties libet desiderare, sed quoties necesse est, vt
 hæc ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris
 intestina deducat. Alterum quoq; quod æquè
 ad omnes similes affectus pertinet, in hoc ma-
 xime seruandum est, vt cum pleraq; vtilia in-
 suauiua sint, qualis est plantago, & rubi, et quic-
 quid mali corio mistum est, ea potissimum ex his
 dentur, quæ maxime ager volet. Deinde si o-
 mnia ista fastidiet, ad excitandam cibi cupidi-
 tatem interponatur aliquid minus vtile, sed ma-
 gis gratum. Exercitationes, frictiones huic quoq;
 morbo necessariae sunt, & cum his sol, ignis, bal-
 neum, vomitus (vt Hippocrati visum est) etiam
 albo veratro (si cetera parum proficiunt) euo-
 catus.

De Lumbricis aluum occupantibus.

C A P.

XVII.

Nonnulli

Nonnunquam autem Lumbrici quoq; occupant alium, hiq; modò ex inferioribus partibus, modò fœdus ore redduntur. Atq; interdum latos eos, qui peiores sunt, interdum teretes videmus. Si lati sunt, aqua potui dari debet, in qua lupinum aut cortex mori decoctus sit, aut cui adiectum sit, contritum vel hyssopum, vel piperis acetabulum, vel scamoneæ paulum. Veletiam pridie cum multum allium ederit, vomat. Posteroq; die mali punici tenues radiculis colligat, quantum manus comprehendet, easq; contusas in aquæ tribus sextarijs decoquat, donec tertia pars supersit. Huc adiciat nitri paulum, & ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas potiones sumat, aut aquæ, vel murie duræ sic adiectæ, tum desidet subiecta calida aqua in pelue. Si verò teretes sunt, qui pueros maxime exercent, & eadem dari possunt, & quedam leniora, vt contritum semen vrticæ, aut brassicæ, aut cumini cum aqua, vel menta cum eadem, vel absinthium decoctum, vel hyssopum ex aqua mulsæ, vel nasturtij semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinum, & allium
**in alijs prodest, vel *maluæ oleum subter dedisse.*

De τρυγουῖο intestinorum morbo.

CAP. XVIII.

Est autem aliud lenius omnibus proximis, de quibus supra dictum est, quod τρυγουῖο Græci vocant, id neq; acutis, neq; longis morbis annumerari debet, cum & facile tollatur, neq;
unquam

vnquam per se iugulet, in hoc aquè atq; in torminibus frequens desidendi cupiditas est, aquè dolor vbi aliquid excernitur. Descēdunt autem pituita, nucisq; similia, interdum etiam leuiter subcruenta: sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoq; recte coacta: desiderare oportet in aqua calida, sæpiusq; ipsum manu nutrire, cui plura medicamenta idonea sunt, butyrum cum rosa, acacia ex aceto liquata, emplastrum id, quod τετραφάρμακον Græci vocant, rosa liquatum, alumen lana circumdatum, & ita appositum, eademq; ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt, eadem verbenæ decoctæ, vbi inferiores partes foveantur, alternis verò diebus aqua, alternis leue & austerum vinum bibendum est. Potio esse debet egelida & frigida: proprior ratio victus talis, qualem in tormina supra præcepimus.

De ventris fluxu, & curatione. CAP. XIX.

LEuior etiam dñ recens deiectio est, vbi & liquida aluus, & sæpius quàm ex consuetudine fertur: atque interdum tolerabilis dolor est, interdum grauissimus, idq; peius est: sed vno die fluere aluum sæpe pro valetudine est, atque etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem id conuirescat. Purgatur enim corpus, et quod intus læsurum erat, utiliter effunditur, verum spatium periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculis excitat, viresq; consumit: primo die quiescere satis est, neq; impetum

impetum ventris prohibere : si per se desūt, balneo vti, paulum cibi capere : si mansit, abstinere non solum à cibo, sed etiam à potione. Postero die si nihilominus liquida aluus est, equè conquiescere, paulum astringentis cibi sumere, tertio die in balneum ire, vehementer omnia præter ventrem perfricare, ad ignem lumbos, scapulasque admouere, cibis vti, sed ventrem contrahentibus, vino non multum meraco. Si postero quoque die fluet, plus edisse, sed vomere etiam ex toto, donec conquiescat. Contra sitim, famem, vomitu niti. Vix enim fieri potest, vt post hanc animaduersionem aluus non contrahatur. Alia via est vbi velis suppressere, cœnare, deinde vomere, postero die in lecto conquiescere, vesperi vngi, sed leniter, deinde panis circa sili-
bram, ex vino amineo mero sumere, tum assum
aliquid, maximeq; auem, et postea vinum idem
bibere aqua pluuiali mistum, idq; vsq; ad quin-
tum diem facere, iterumq; vomere. Frigidam au-
tem assidue potionem esse debere, contra priores
autores Asclepiades affirmavit, & quidem
quàm frigidissimam. Ego experimentis quenq;
in se credere debere existimo, calida potius an
frigida vtatur. Interdum autem euenit, vt id
pluribus diebus neglectum, curari difficilius
possit. A vomitu oportet incipere, deinde poste-
* oleo ro die vesperi, tepido* loco vngi, cibum modicum
assumere, vinum meracum quàm asperrium,
impositam super vëtre[m] habere cum cerato ru-
tam.

tam. In hoc autem affectu corporis neq; ambulatione, neq; frictione opus est, uehiculo sedisse, vel magis etiam equo prodest. Neque enim vlla res magis intestina confirmat. Si verò etiam medicamentis vtendum est, aptissimum est id quod ex pomis fit. Vindemia tempore in grande vas coniicienda sunt pira, atq; mala syluestria: si ea non sunt, pira tarentina viridia, vel signina, mala scandiana vel amerina, myrrhappia, hisq; adiicienda sunt cotonea, & cum ipsis corticibus suis punica, sorba, & quibus magis vtimur, etiam torminalia, sic vt hæc tertiam ollæ partem teneant, tum deinde ea musto implenda est, coquendumq; id, donec omnia quæ indita sunt, liquata in vnitatem quandam coeant. Id gustui non insuaue est, & quandocunque opus est, assumptum leuiter, sine vlla stomachi noxa ventrem tenet: duo aut tria cochlearia vno die sumpsisse, satis est. Alterum valentius genus est, myrti baccas legere, ex his vinum exprimere, id decoquere, vt decima pars remaneat, eiusq; cyathum sorbere. Tertium quod quandoque fieri potest, malum punicum excavare, exemptisq; omnibus seminibus, membranis quæ inter ea fuerunt, iterum coniungere, tum infundere cruda oua, radículaq; miscere, deinde malum ipsum super prunam imponere, quod dum humor intus est, non adurit. Vbi siccum esse cœpit, remouere oportet, extrahendumq; cochleari, quod intus est, edisse. Aliquibus adiectis maius momentū habet. Itaq; etiam

Myrrhappia Plinius
ab odore
dicta esse
dicit, li. 15.
cap. 15.

p in

Potio quæ
astringat.

in piperatum coniicitur, misceturq; cum sale, & pipere: est quid ex his edendum, est pulticula etiam, cum qua paulum ex fauo vetere coctum sit, & lenticula cum malo corio cocta, rubiq; cacumina in aqua decocta, & ex oleo atque aceto assumpta, efficacia sunt, atque ea aqua, in qua vel palmula, vel malum cotoneum, vel arida sorba, vel rubi decocti sunt, potata. Quod genus significo, quoties potionem dandam esse dico, quæ astringat. Tritici quoque hemina in vino amineo austero decoquitur, idq; triticum ieiuno, ac sitienti datur, superq; id vinum id sorbetur, quod iure valentissimis medicamentis annumerari potest, atque etiam potui datur vinum signinum, vel resinatum austerrum, vel quodlibet austerrum. Contunditurq; cum corticibus, seminibusq; suis punicum malum, vinoq; tali miscetur, idq; vel merum sorbet aliquis, vel bibit mistum. Sed medicamentis uti, nisi in uehementibus malis superuacuum est.

De vuluæ morbo, & curationibus. CAP. XX.

EX vulua quoque fæminis vehemens malum nascitur, proximeq; ab stomacho vel afficitur hæc, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat, ut tanquam comitiali morbo prosternat. Distat tamen hic casus, eò quod neque oculi vertuntur, nec spumæ profluunt, nec nervi distenduntur, sopor tantum est, idq; quibusdam fæminis crebro reuertens, perpetuum est. Vbi incidit, si satis virium est, sanguis missus adiuvat.

Si

Si parum est, cucurbitule tamen defigendæ sunt in inguinibus. Si diutius aut iacet, aut alioqui iacere consuevit, admouere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentum, uel aliud ex his quæ fœdioris esse odoris retuli, quod mulierem excitet. Idemq; aquæ frigida perfusio efficit, adiuuatq; ruta contrita cum melle, uel ex cyprino ceratum, uel quodlibet calidum, & humidum cataplasma, naturalibus pubetenus impositum. Intra hæc etiam perfricare coxas, & poplites oportet. Deinde ubi ad se redit, circumcidendum uinum est in totum annum, etiam si casus idem non reuertitur. Frictione quotidie utendum totius quidem corporis, præcipuè uerò uentris & poplitum. Cibus ex media materia dandus. Sinapi super inum uentrem, tertio quoque, aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire commodè uidetur solanum in lac demissum, deinde contritum, & cera alba, atque medulla ceruina cum irino, aut seuum taurinum, uel caprinum cum rosa mistum. Dandum potui etiam uel castoreum est, uel git, uel anethum. Si parum pura est, purgatur iunco quadrato: si uerò uulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet, & recens suilla adeps, & ex ouis album misceatur, idq; apponatur, uel album ex ouo cum resâ mistum, adiecto quo facilius consistat, contrita rosæ puluere. Dolens uerò ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitule cute incisa

p 2 inguin

inguinibus, vel etiam sub mammis admota: si
 *coëuntia maligna purgatio est, subiicienda sunt, *co-
 ercentia. Id faciunt etiam albæ oliuæ, & ni-
 grum papauer cum melle assumptum, & gum-
 mi cum trito semine apij liquatum, & cum cya-
 tho passi datum. Præter hæc in omnibus vesicæ
 doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus
 fiunt, id est spica nardi, croco, cinnamomo, casia,
 similibusq; Idemq; etiam decocta lentiscus præ-
 stat. Si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis
 profluit, etiam sanguinis detractio apta est, aut
 certè coxis admotæ cucurbitulæ cute incisa. At
 cum vrina super potionum modum etiam sine
 dolore profluens, maciem, & periculum facit, si
 tenuis est, opus est exercitatione & frictione,
 maximeq; in sole vel ad ignem. Balneum rarum
 esse debet, neque longa in eo mora, cibis compri-
 mens. Vinum austerum meracum, per æstatem
 frigidum, per hyemem egelidum, sed tantum, quan-
 tum minimum sit. Infima aluus quoque vel du-
 cenda, vel lacte purganda est. Si crassa vrina
 est, vehementior esse debet & exercitatio, &
 frictio, longior in balneo mora cibis opus est te-
 neris, vinum idem. In utroq; morbo vitanda o-
 mnia sunt, quæ vrinam mouere consuerunt.

De nimia profusione seminis ex naturalibus.

C A P. X X I.

Est etiam circa naturalia vitium, nimia
 profusio seminis, quod sine venere, sine no-
 cturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spa-
 tio

tio tunc hominem consumat. In hoc affectu salutare sunt vehemens frictions, perfusiones, natiuitatesq; quam frigidissimæ, neq; cibi, nec potio, nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet cruditates, omnia infantia, nihil ex his assumere, quæ contrahere semen videntur, qualia sunt, siligo, simila, oua, alica, amyllum, omnis caro glutinosa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neq; alienum est fouere inferiores partes, aqua decocta ex verbenis comprimentibus, ex iisdem aliqua cataplasmata imo ventri inguinibusq; circumdare, præcipueq; ex aceto rutam vitare, etiam ne supinus obdormiat.

De coxarum morbis, & curationibus.

C A P. XXII.

Superest vt ad extremas partes corporis veniam, quæ articulis inter se conseruntur, initium à coxis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit. Isq; hominem sæpe debilitat, & quosdam non dimittit. Eoq; id genus difficilimè curatur, quod ferè post longos morbos vis pestifera huc se inclinat, quæ vt illas partes liberat, sic hanc ipsam quoque affectam prehendit. Fouendum primum aqua calida est, deinde vtendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse videtur aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mistus capparis cortex concisus, vel lolij farina ex vino diluto cocta, & mista cum acida fece: *quæ, quia refrigescunt, impone- *quæq; re noctu malagmata commodius est. Inulæ quoq; frigescent

p 3 radix

radix contusa, & ex vino austero postea co-
cta, & late super coxam imposita, inter valen-
tissima auxilia est. Si ista non soluerunt, sale
calido & humido vtendum est. Si ne sic quidem
finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute
admouende sunt cucurbitulae, mouenda vrina.
Alius si compressa est, ducenda. Vltimum est,
& in veteribus quoque morbis efficacissimum,
tribus aut quatuor locis super coxam, cutem can-
dentibus ferramentis exulcerare. Sed frictione
quoque vtendum est, maximè in sole, & eodem
die sapius: quò facilius ea, quæ coeundo nocue-
runt, dirigantur. Eaq; si nulla exulceratio est,
etiam ipsis coxis, sicut & ceteris partibus adhi-
benda est. Cum verò saepe aliquid exulcerandum
candenti ferramēto sit, ut materia inutilis euoce-
tur, illud perpetuum est, non vt primū fieri potest,
huius generis ulcera sanare, sed ea trahere, donec
id vitium, cui per hac opitulantur, conquiescat.

De genuum doloribus, & cura. CAP. XXIII.

COxis proxima genua sunt, in quibus ipsis
nonnunquam dolor esse consuevit. In eisde
autem cataplasmatibus, cucurbitulisq; praesidium
est, sicut etiam cum in humeris, alijs'ue commis-
suris dolor aliquis exortus est. Equitare ei cui
genua dolent, inimicissimum omnium est. Omnes
autem eiusmodi dolores, vbi inueterauerunt,
vix citra vstionem finiuntur.

De articulorum doloribus, in manibus,
pedibusq;

CAP. XXIIII.

In

IN manibus pedibusq; articulorum vitia frequentiora, longioraq; sunt, quae in podagris, chiragris'ue esse consuerunt. Ea raro vel castratos, vel pueros ante scemina coitum, vel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt, tentant. Vbi sentiri coeperunt, sanguis mittendus est. Id enim inter initia statim factum, saepe annuam, nonnunquam perpetuam valetudinē totam praestat. Quidam etiam cum asinino * lotio epoto se * lacte eluissent, in perpetuū hoc malum euaserunt. Quidam cum toto anno à vino, mulso, venere sibi temperassent, securitatem totius vitae consecuti sunt. Idq; utiq; post primū dolorem seruandum est, etiam si quieuit. Quod si iam consuetudo eius facta est, potest quidem aliquis esse securior his temporibus, quibus dolor se remisit. Maiorem verò curam adhibere debent hi, quibus id reuertitur. Quod fere vere, autumnō'ue fieri solet. Cum verò dolor non vrget, manu gestari debet, deinde ferri, inambulatione leui se dimouere: & si podagra est, interpositis temporibus exiguis inuicē modò sedere, modò ingredi, tum antequam cibum capiat, sine balneo loco calido leuiter perfricari, sudare, perfundi aqua egelida, deinde cibum sumere ex media materia interpositis rebus urinam mouentibus, quotiesq; plenior est, euomere. Vbi dolor vehemens vrget, interest sine tumore is sit, an tumor cum calore, an tumor iam etiam obcaluerit. Nam si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquam marinam, vel mu-

riam durā feruefacere oportet, deinde in peluem
conijcere, & cum iam homo pati potest, pedes
demittere, superq; pallam dare, & vestimento
tegere, paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex
eadem aqua leuiter infundere, ne calor intus
destituatur, ac deinde noctu cataplasmata calefa-
cientia imponere, maximeq; hibisci radicem ex
vino coctam. Sin verò tumor calorq; est, utilio-
ra sunt refrigerantia, recteq; in aqua quam fri-
gidissima articuli continentur: sed neque quoti-
die, neque diu fit, ne nerui ledantur. Imponen-
scant dum verò est cataplasma quod refrigeret. Neque
* in hoc tamen * in hoc ipso permanendū, sed ad ea trans-
quotidie eundum, quæ sic reprimunt, vt emolliant. Si
perm. maior est dolor, papaueris cortices in vino co-
quendi, miscendiq; cum cerato sunt, quod ex ro-
sa factum sit. Vel ceræ, & adipis suillæ tantun-
dem vnā liquandum, deinde lris vinum miscen-
dum, atque vbi quod ex eo impositum est, inca-
luit, detrahendum, & subinde imponendū aliud
est. Si verò tumores etiam obcaluerunt, & do-
lent, leuat spongia, quæ imposita subinde ex oleo,
vel aceto, vel aqua frigida exprimitur, aut pari
portione inter se mista, pix, cera, alumen. Sunt
etiam plura idonea manibus, pedibusq; malag-
mata. Quod si nihil superimponi patitur, id
quod sine tumore est, fouere oportet spongia, quæ
in aquam calidam demittatur, in qua vel papa-
ueris cortex, vel cucumeris syluestris radix de-
cocta sit, tumi inducere articulis crocum cum suc-

eo papaueris, & ouillo lacte. At si tumor est, fouere quidem debet aqua* calida, in qua lenti- *egelida
scus, alia'ue verbenae ex reprimentibus decocta
sint: induci uero medicamentū ex nucibus ama-
ris cum aceto tritis, aut ex cerussa, cui contrita
herbæ muralis succus sit adiectus. Lapis etiam
qui carnem exedit, quem σαρκοφαγόν Græci
vocant, excisus, sic ut pedes capiat, demissos
eos cum dolent, retentosq; ibi leuare consuevit.
Ex quo in Asialapidi* Asio gratia est. Vbi
dolor, & inflammatio se remiserūt, quod intra
dies quadraginta sit, nisi vitium hominis acces-
sit, modicis exercitationibus, abstinentia, vn-
ctionibus lenibus vtendum est: sic, ut etiam aco-
po, vel liquido cerato cyprino articuli perfricen-
tur. Equitare podagricis quoque alienum est.
Quibus uero articulorum dolor certis tempori-
bus reuertitur, hos antè & curioso victu ca-
uere oportet, ne inutilis materia corpori super-
sit, & crebriore vomitu, & si quis ex corpore
metus est, vel alui ductione uti, vel lacte pur-
gari. Quod Erasistratus in podagricis expu-
lit, ne in inferiores partes factus cursus pedes
repleret, cum euident sit omni purgatione non
superiora tantummodo, sed etiam inferiora exi-
naniri. Ex quocunque autem morbo quis in-
ualescit, si tardè confirmatur, vigilare prima
luce debet, nihilominus in lecto conquiescere,
circa tertiam horam leuiter uinctis manibus cor-
pus permulcere. Deinde delectationis causa

P 3 (quant

(quantum iuuat) ambulare, circuncisa omni negotiosa cogitatione uel actione, tum gestari diu, multa fricatione uti, loca, cœlum, cibos sæpe mutare. Vbi triduo, quatruiduo'ue vinum bibit, uno aut etiam altero die interponere aquam. Per hæc enim fiet, ne in vitia tabem inferentia incidat, & ut maturè vires suas recipiat. Cum ex toto verò conualuerit, periculosè vitæ genus subito mutabit, & inordinate aget. Paulatim ergo debet omisissis his legibus, eò transire, ut arbitrio suo viuat.

LIBER V.

DIXI de his malis corporis, quibus victus ratio maxime subuenit. Nunc transeundum est ad eam medicine partem, quæ magis ^{*pugnat} dicamentis purgat. His multum antiqui auctores tribuerunt, & Erasistratus, & hi qui se Empiricos nominauerunt, præcipue tamen Herophilus, deductiq; ab illo viri, adeo ut nullum morbi genus, sine his curarent. Multaq; etiam de facultatibus medicamentorum memoriæ prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel Andree, vel Apollonii, qui Mlys cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte Asclepiades, non sine causa sustulit: & cum omnia ferè medicamenta stomachum ledant, maliq; succi sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam transt

transtulit. Verum ut illud in plerisque morbis utilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consuerunt, quæ sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia scire conuenit, quod omnes medicine partes ita innexæ sunt, ut ex toto separari non possint, sed ab eo nomen trahant, à quo plurimum petunt. Ergo ut illa quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet, & illa quæ præcipue medicamentis* purgat, adhibere etiam rationem vi-^{*pugna}ctus debet, quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac sæpe simplicia opitulentur, sæpe mixta, non alienum videtur ante proponere & nomina, & vires, & mixturas eorum, quo minor ipsius curationis ex sequentibus mora sit.

De simplicibus facultatibus quarūcunque rerum,
ex quibus medicamenta fiunt, & primo de
his quæ sanguinem supprimunt. C A P. I.

Sanguinem supprimunt, atramentum sutorium, quod Græci χαλκαραθρον appellant, chalcitis, acacia, & ex aqua lycium, thus, aloë, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta vel cimolia vel figularis, misy, frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinū, squama & ferri, & æris, atque huius quoque due species sunt, alia tantum æris, alia rubri æris. Vel figil-
laria.

Quæ vulnus glutinent. C A P. II.
Glutin

Glutinant vulnus, myrrha, thus, gummi, præcipueq; acanthinum psilleum, tragacantha, cardamomum, bulbi, lini semen, nasturtium, oui album, gluten, ichthyocolle, vitis alba, contusa cum testis suis cochleæ, mel coctum, spongia, vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa, ex iisdem lana succida, si levis plaga est, etiam aranea: reprimunt alumen & scissile (quod $\sigma\chi\iota\sigma\delta\upsilon$ vocatur) & liquidum, melinum, auripigmentum, erugo, chalcitis, atramentum sutorium.

Quæ concoquant, & moueant pus. C A P. III.

Concoquant & mouent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris & fuligo, & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, seuum, adeps, oleum.

Quæ aperiant vulnera. C A P. IIII.

Vulnera aperiant tanquam ora in corporibus, quod $\sigma\acute{o}\mu\alpha$ Græce dicitur, cinnamomum, balsamum, panaces, iuncus quadratus, **bdella* legium, flos albae violæ, **bdellium*, galbanum, resina terebinthina, & pinea, propolis, oleum **aminia* tus, piper, pyrethrum, chamæpitys, rui **taminia*, sulphur, alumen, rutæ semen.

Quæ purgant.

C A P. V.

Purgant, erugo, auripigmentum, quod $\alpha\gamma\gamma\epsilon\upsilon\iota\nu\delta\upsilon$ à Græcis nominatur. Huic autem et sandaracæ in omnia, eadem vis, sed validior est squama æris, pumex, iris, balsamum, styrax, thus, thuris cortex, resina & pinea, & terebinthina liquida

liquida, ænanthe, lacerti stercus, sanguis columbae, & palumbi, et hirundinis, ammoniacum bdellium, quod in omnia idem quod ammoniacum potest, sed valentius est, abrotanum, ficus arida, coccum gnidium, scobis eboris, omphaciū, radícula, coagulum, sed maxime leporinum, cui eadem quæ ceteris coagulis facultas, sed ubique validior est, fel, vitellus crudus, cornu ceruinum, gluten taurinum, mel crudum, misyos chalcitis, crocum, rûa* taminia, abrotanum, spuma* aminia argenti, galla, squama æris, lapis hematites, minium, costum, sulphur, pix cruda, seuum, adeps, oleum, ruta, porrum, lenticula, eruum.

Quæ rodant.

C A P. VI.

R Odunt, alumen, liquidum, sed magis rotundum, erugo, chalcitis, misy, squama æris, sed magis rubri, æs combustum, sandaraca, minium Synopicum, galla, balsamum, myrrha, thuris cortex, galbanum, resina terebinthina humida, piper vtrunque, sed rotundum magis, cardamomum, auripigmentum, calx, nitrum, & spuma eius, apij semen, narcissi radix, omphacium, alcyonium, oleum ex amaris nucibus, alium, mel crudum, vinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scamonea, rûa taminia, cinnamomum, styrax, cicuta semen, resina, narcissi semen, fel, nuces amaræ, oleumq; earum, at ramentum sutorium, chrysocolla, veratrum, cinis.

Quæ exedant corpus.

C A P. VII.

Exed

EXedunt corpus, acaciae succus, hebenus, ærugo, squama æris, chrysocolle, cinis Cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripigmentum, sulphur, cicuta, sandaraca, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum sutorium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac caprifici, vel lactucæ marinæ, quæ tithymallos à Græcis nominatur, alcyonium, fel, thuris fuligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hematites, & Phrygius, & Asiæ, & scissilis, misy, vinum, acetum.

Quæ adurant.

C A P. VIII.

ADurant, auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis, misy, ærugo, calx, charta combusta, sal, squama æris, sex combusta, myrrha, stercus & lacerti & columbæ, & palumbi, & hirundinis, piper, coccum Cnidium, allium, diphryges, lac utrunque (quod proximo capite supra comprehensum est) veratrum & album & nigrum, cantharides, corallium, pyrethrum, thus, salamandra, eruca, sandaraca, vutaminia, chrysocolle, ochra, alumen scissile, ouilum sterchus, ænanthe.

Quæ crustas vlceribus inducant. C A P. IX.

EAdem fere crustas vlceribus tanquam igne adustis inducunt, sed præcipuè chalcitis, utique si cocta est, flos æris, ærugo, auripigmentum, misy, & id, quò magis coctum.

Quæ crustas vlceribus resoluant. C A P. X.

Crust

Crustas verò has, resoluit farina triticea cum ruta, vel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

Quæ discentiant ea, quæ in aliqua parte corporis coierunt.

C A P. XI.

Ad discutienda verò ea, quæ in corporis parte aliqua coierunt, maxime possunt, abrotanum, helenium, amaracus, alba viola, mel, lilium, *sansucus, cyperus, lac, fertula campana, *sampsus, serpillum, cupressus, cedrus, iris, viola purpurea, *cus Cyprius, narcissus, rosa, crocum, passum, iuncus quadratus, nardum, cinnamomum, casia, ammoniacum, cera, resina, vua tannina, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini & narcissi semen, tumen, sordes ex gymnasio, pyrites lapis, aut molaris, crudus vitellus, amarae nuces, sulphur.

Quæ euocent, & educant.

C A P. XII.

EVocat & educit, ladanum, alumen rotundum, hebenus, lini semen, omphacium, fel, chalcitis, bdellium, resina terebinthina & pinea, propolis, ficus arida decocta, stercus columbae, pumex, farina lolij, grossi in aqua coeli, elaterium, lauri baccae, nitrum, sal.

Quæ exasperata leuent.

C A P. XIII.

Leuat id quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, oui album, lac, tragacanthum.

Quæ carnem nutrant, & vlcus impleant.

C A P. XIII.

*ocra a-

Carnem alunt, et vlcus implent, resina pinea, Etica, vel *ochra, actlice, mel, asteriace, cera, butyrum. asterica

Quæ

Quæ molliant.

CAP. XV.

erythria.

Mollunt, æs combustū, terra* ereτρια, nitrum, papaueris lacryma, ammoniacum, bdelliū, cera, seuum, adeps, oleum, ficus arida, sesamū, fertula Campana, narcissi et radix & semen, rosæ folia, coagulū, vitellus crudus, amara nuces, medulla omnis, stibi, pix, cochlea cocta, cicuta semen, plumbi recrementum, σινογίαν μολύβδου Græci vocant, panaces, cardamomū, galbanū, resina, rua taminia, styrax, iris, balsamū, sordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

Quæ cutem purgent.

CAP. XVI.

Cutem purgat mel, sed magis, si est cum gal-la, vel eruo, vel lentacula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro, vel ærugine.

De misturis simplicium rerum, & de ratione ponderum, & quid Malagma, & Emplastrum, & Pastillus inter se differant.

CAP. XVII.

Expositis simplicibus facultatibus, dicendum est quemadmodum misceantur, quæ ex his fiant. Miscentur autem varie, neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur, alia adijciatur, iisdemq; seruatis, ponderum ratio mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumerabilia misturarum genera sunt, quæ comprehendi si possent, tamen esset supernacuum. Nam & iisdem effectus inter paucas compositiones sunt, & mutare eas cuilibet (cognitis facultatibus) facile est. Itaque contentus his ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo,

cabo, quæ vel desiderari in prioribus potuerunt, vel ad eas curationes pertinent, quas protinus hic comprehendam, sic ut tamen quæ magis communia sunt, simul iungam. Si qua singulis, vel etiam paruis accommodata sunt, in ipsorum locum differam. Sed & antea sciri volo, in vncia pondus denariorum septem esse. Vnius deinde denarij pondus diuidi à me in sex partes, id est sex vncias, ut idem in vncia denarij habeam, quod Græci habent in eo, quem δβολον appellat. Id ad nostra pondera relatum, paulo plus dimidio scrupulo facit. Malagmata verò, atq; Emplastra Pastilliq; (quos τγοχίσκου Græci vocant) cum plurima eadem habeant, differunt eo, quòd Malagmata maximè ex floribus, earumq; etiā surculis: Emplastra Pastilliq; magis ex quibusdam metallicis fiunt: deinde malagmata contusa abunde mollescunt: nam super integram cutem inijciuntur. Laboriose verò conteruntur ea, ex quibus emplastra pastilliq; fiunt, ne ledant vulnera cum imposita sunt. Inter Emplastrum autem, & Pastillum hoc interest, quòd Emplastrum utiq; liquati aliquid accipit, in Pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum Emplastrum hoc modo fit, arida medicamenta per se teruntur, deinde mistis his instillatur aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus est, & ea rursus ex eo teruntur. Ea verò quæ liquari possunt, ad ignem simul liquantur, & si quid olei misceri debet, tum infunditur.

Vncia.
Denarius.

tur. Interdū etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt, quæ separatim fieri debuerunt, in vnum omnia miscentur. At Pastilli hæc ratio est: Arida medicamenta contrita humore non pingui, aut vino, vel aceto coquuntur, & rursus cocta, inarescunt. Atque vbi vten- dum est, eiusdem generis humore diluuntur, tum
 pastillis Emplastrum imponitur, pastillus illinitur, aut alicui molliori, aut cerato miscetur.

DE MALAGMATIS.

CAP. XVIII.

Malagma aduersus calidas podagras.

His cognitis, primum malagmata subiciā, quæ ferè non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare possit, ad calidas podagras aptum. Habet gallæ & immaturæ et alterius, coriandri seminis, cicutæ lacrymæ aridæ, gummi, singulorum plenum acetabulum, cerati eloti, quod $\pi\epsilon\pi\lambda\upsilon\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron\upsilon$ Græci vocant, selibram. Reliqua fere calefaciunt. Sed quædam digerunt materiam, quædam extrahūt, quæ $\epsilon\pi\iota\sigma\pi\alpha\sigma\iota\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron$ vocatur, pleraq; certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

Malagma ad materiam extrahendam.

Si materia extrahenda est, vt in hydropico, Sin lateris dolore, in incipiēte abscessu, in sup-
 puratione quoq; mediocri, aptum est id, quod habet resinæ aridæ nitri, ammoniaci, galbani, singulorum pondo *. cere pondo *. Aut in quo hæc sunt, eruginis rasæ, thuris, singulorū P. I I *. ammoniaci salis P. V I *. squamæ eris, cere, sin-
 gulorum

gulorum p. viii. *. resinæ aridæ p. * xii. *. * vii. r.
aceti cyathus. Idem præstat cumini farina cum
struthio, & melle p. i. i. *.

Malagma ad iecur dolens.

Siecur dolet, id in quo est balsami lacrymæ
p. xii. *. costi, cinamomi, casia, corticis
myrrhae, croci, iunci rotundi, balsami seminis, iri-
dis illyricæ, cardamomi, amomi, nardi, singulorum
p. xvi. *. Quibus adijcitur nardinum unguen-
tum, donec cerati crassitudo sit, & huius qui-
dem recentis usus est. Si verò seruandum est,
resinæ terebinthinæ p. xvi. *. cere p. x. *. ex
vino leni contunduntur, tum eo miscentur.

Malagma ad lienem.

At si lienis torquet, glandis (quam ἑλάνου
Græci vocant) cortex & nitrum paribus
portionibus contunduntur, respergunturq; aceto
quàm acerrimo. Vbi cerati crassitudinem habet,
linteo antea in aqua frigida madefacto illinitur,
& sic imponitur, supraq; farina ordeacea inij-
citur, sed manere ibi non amplius sex horis de-
bet, ne lienem consumat. Satiusq; est id bis, aut
ter fieri. Communem autem & iocineri, & lie-
ni, & abscessibus, & strumæ, parotidibus, ar-
ticulis, calcibus quoque suppurantibus, aut ali-
ter dolentibus, etiam concoctioni ventris, Lysias
composuit ex hyssopi, panacis, styracis, galbani,
resinæ, singulorum p. i. i. *. ammoniaci, bdellij,
cere, seni taurini, iridis aridæ p. i. i. i. *. ca-
chryos acetabulo, piperis granis quadraginta.

Quæ contrita, irino vnguento temperantur.

Malagma ad laterum dolores.

Ad laterum autem dolores compositio est Apollopheanis, in qua sunt resinae terebinthinae, thuris fuliginis, singulorum p. i i i i. *. bdellij, ammoniaci, iridis, seu vitulini, aut caprini à renibus sicci, singulorum p. i i i i. *. Hec autem eadem omnem dolorem leuant, dura emolliunt, mediocriter calefaciunt. Ad idem latus Andree quoque malagma est, quod etiam resoluit, educit humorem, pus maturat, ubi id maturum est, cutem rumpit, ad cicatricem perducit, prodest impositum minutis maioribusq; abscessibus, item articulis, ideoq; & coxis, & pedibus dolentibus: item si quid in corpore collisum est, reficit, præcordia quoque dura & inflata emollit, ossa extrahit, ad omnia deniq; valet, quæ adiuuare calor potest. Id habet cera p. * x i. *. visci sycamini, quam aliàs sycamorurum vocant, lacryme, singulorum p. * i. *. piperis & rotundi, & longi, ammoniaci, thymiamatis, bdellij, iridis illyricæ, cardamomi, amomi, xylobalсами, thuris masculi, myrrhæ, resinae aridae, singulorum p. x. *. pyrethri, cocci Gnidij, spuma nitri, salis ammoniaci, aristolochiae Creticæ, radicis ex cucumere agrestis, resinae terebinthinae liquida, singulorum p. x x v. *. Quibus adijcitur vnguenti irini, quantum satis est ad ea mollienda, atque coeunda.

Malagmata ad resoluenda quæ astricta sunt, & mollienda quæ dura sunt, & digerenda quæ coeunt.

Præcip

PRecipiunt verò est ad resoluenda quæ astringuntur sunt, mollienda quæ dura sunt, digerenda quæ coeunt, id quod ad Polyarchum autorem refertur. Habet iunci quadrati, cardamomi, thuris, fuliginis, amomi, cere, resinæ liquidæ, pares portiones.

Aliud malagma ad eadem.

Aliud ad eadē Nilei, crocomagmatis (quod quasi recrementum eius est) P. I I I I. *. ammoniaci, thymiamatis, cere, singulorum P. X X. *. ex quibus duo priora ex aceto teruntur, cera cum rosa liquatur, et tum omnia iunguntur.

Malagma Moschi ad molliendum

Propriè etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. Habet galbani unciam, thuris fuliginis P. *. 3. cere, ammoniaci, thymiamatis trientes, picis aridæ P. I I. *. aceti heminas tres.

Malagma Medi ad digerenda quæ coeunt.

Fertur etiam ad digerenda quæ coeunt sub autore Medo, quod habet cere P. *. 3. panacis P. *. semis, squamæ aris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum P. I. *. plumbi combusti P. I. *. & semis.

Malagma Panthemi ad eadem.

Ad eadē Panthemus utebatur calcis P. *. semis, sinapis contriti, item fœni Græci, aluminis, singulorum P. I. *. seu bubuli P. I I. *. & semis.

Malagma ad strumas.

Ad strumâ multa malagmata inuenio. Credo autē quo peius id malū est, minusq; facile

cide discutitur, eo plura esse tentata, quæ in personis varie responderunt. Andreas autor est, ut hæc misceantur, vrticæ seminis P. I. *. piperis rotundi, bdellij, galbani, ammoniaci, thymiamatis, resine aride, singulorum P. IIII. *. resine liquide, cera, pyrethri, piperis logi, lactucæ marine seminis, sulphuris ignem non experti (quod ἀπυρον vocatur) fecis aride, aceti, spuma nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis ex
 *P. V. cucumeris sylvestri, resine, singulorum P. *. VIII.
 *. Quæ ex leni vino conturbanduntur.

Aliud malagma ad idem valens.

*aliàs: semine, stercoris. Legē dum fortas
 sevel capri ni, vel bo- uilli ex Ga leno de strumis.
EXpeditius ad idem fit, quod habet visci, *felini stercoris, resine, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris. P. I. *. lapidis, quem pyriten vocant P. IIII. *. cumini acetabulum. Item in quo est lapidis eiusdem pars una, sulphuris due partes, resine terebinthine partes tres.

Malagma ad strumam, & phymata.

ARabis autem cuiusdam est ad strumam, et orientia tubercula, quæ φυμαξία vocantur, quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammoniaci, thuris, resine & liquide & aride, crocogrammatis, cera, singulorum P. I. *. lapidis eius, quem πυρίτης vocant, P. IIII. *. quibus quidam adiiciunt, sulphuris P. II. *.

Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.

Est etiam proficiens in struma, et in his tuberculis, quæ difficiliter concoquuntur, & in his

in his que carcinode vocantur, quod ex his constat: Sulphuris P. II. *. nitri P. IIII. *. myrrhæ P. VI. *. fuliginis, thuris P. *. semis, salis ammoniaci P. *. I I I. cere P. I. *.

Malagma Protarchi ad parotidas, & faunm,
& mala vlcera.

Protarchus autē ad parotidas, eaq; tubercula, quæ meliceria, id est, faui, vel phymata nominantur, item mala vlcera, punicis, resine pineæ liquidæ, thuris, fuliginis, spumæ nitri, iridis, singulorum P. VIII. *. cum cere P. IX. *. miscebat, hisq; olei cyathum, & dimidium adieciēbat.

Malagma, aduersus panum & phymata.

Ad aduersus panum, tum primum orientem (quod φύγεδρον Græci vocant) & omne tuberculum, quod phyma nominatur, miscetur ochra, quæ Attice nominatur, cum duabus partibus similē, hisq; contunditur, subinde mel instillatur, donec malagmatis crassitudo sit.

Malagma aduersus phymata.

Discutit etiam omne tuberculum (quod phyma vocatur) id quod habet calcis, nitri spumæ, piperis rotundi, singulorum P. I. *. galbani P. II. *. salis P. IIII. *. quæ excipiuntur cerato ex rosa facto.

Malagma ad supprimendum omne quod abscedit.

Supprimitq; omne quod abscedit id, in quo est galbani, fabæ* fresæ, singulorum P. I. *. *frixæ myrrhæ, thuris, ex radice capparis corticis, singulorum P. IIII. *. Satisq; omnia abscedentia
q 4 digerit,

digerit, murex combustus, & bene contritus,
aceto subinde adiecto.

Malagma ad sanguinem suppressendum,
& phymata.

AT si satis sanguis subit, rectè imponitur
quod aduersus phymata quoq; potest. Con-
stat ex his, bdellij, styracis, ammoniaci, galbani,
resinæ & aridæ & liquidæ pineæ. Item ex len-
tisci, thuris, iridis, singulorum P. II. *.

Malagma ad carcinodas, & phyma-
ta lenienda.

Carcinodæ verò & phymata commodè his
leniuntur: Galbani, visci, ammoniaci, resi-
næ terebinthinæ in singulis P. I. *. seu taurini
P. *. semis, fecis combustæ quàm maxima por-
tione, dum id siccius non faciat, quàm esse ma-
lagma oportet.

Malagma ad liuorem faciei contusæ.

Quod si facie cōtusa liuor subcruentus est,
hæc cōpositio nocte & die imposita tol-
lit: Aristolochiæ, thapsiæ, singulorum P. II. *.
bdellij, styracis, ammoniaci, thymiamatis, galba-
ni, resinæ aridæ, & ex lentisco liquidæ, thuris
masculi, iridis illyricæ, ceræ, singulorum P. IIII.
*. Item faba quoq; imposita proficit.

Malagmata stomachica ad aperiendum.

Sunt etiam quedam malagmata, quæ σωμα-
τικὰ Græci vocant, quoniam aperiendi vim
habent. Quale est quod ex his constat, piperis
longi, spumæ nitri, singulorum P. II. *. erisimi
P. *. IIII. quæ cum melle miscentur. Idoneaq;
etiam

etiam strumæ aperiendæ sunt eius generis. Vehementiusq; ex his est id quod habet calcis P. IIII.
 * piperis grana sex, nitri, ceræ, singulorum P.
 x. * mellis P. * 3. olei heminam.

Miconis malagma, ad resoluendum aperiendumq; ac purgandum.

MIconis quoq; est quod resoluit, aperit, purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitrum, pumicem, paribus portionibus, quibus tantum picis, & ceræ aducitur, ut fiat cerati crassitudo.

Malagma ad ossa, & nervos.

Ad ossa autem Aristogenis, fit ex his, sulphuris P. I. * resinæ terebinthinae, nitri spumæ, & ex scilla partis interioris, plumbi eloti singulorum P. II. * thuris, fuliginis P. VII. * ficus aride quàm pinguisimæ, seu taurini, singulorum P. VIII. * ceræ P. XI. * iridis Macedonice P. VI. * sesami fricti acetabulum, maximeq; nervis, & articulis malagma conuenit.

Malagma Enticlei ad articulos, & ad omnem dolorem.

Igitur Enticlei est, & ad articulos, & ad omnem dolorem, & ad vesicæ, & ad recentem cicatrice contractos articulos, quas αὐνὸν Græci nominant, quod habet fuliginis, thuris acetabulum, resinæ tantundem, galbani sine surculis fescunciam, ammoniaci, bdellij, singulorum P. * 3. ceræ P. * semis. Aliud item fit, quod habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum P. XIII. * resinæ liquidæ P. VI. * ceræ P. XVI. *

¶ Malag

Malagma Sofagoræ ad dolores articulorum.

Ad dolores articulorum Sofagoræ: Plumbi combusti, papaueris lacrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, seui, resine, cere, partes portiones.

Chrysippi malagma, ad idem valens.

Chrysippi, resine liquidæ, sandaracæ, piperis, singulorum P. XII. *. quibus cere paulum adijcitur.

* Ctesiphontis

* Ctesiphontis malagma ad idem valens, & ad parotidas, & phymata, & strumam.

Ctesiphontis, cere Creticæ, resine terebinthine, nitri quàm ruberrimi, singulorum P. *. semis, olei cyathi tres. Sed id nitrum antè per triduum instillata aqua teritur, et cum sextario eius incoquitur, donec omnis humor consumatur. Potest verò ea compositio etiam ad parotidas, phymata, strumam, omnemq; coitum humoris emolliendum.

Malagma ad articulos.

Ad articulos fici quoq; aridi, partem nepetæ mistam vel ruam taminiam sine seminibus cum pulegio rectè aliquis imponit.

Malagma Aristonis, aduersus podagras, & recentia phymata, & omnes dolores.

Eadem podagræ præsidio sunt. Sed ad eam fit Aristonis quoq;, quod habet nardi, cinnamomi, casie, chameleontis, iunci rotundi, singulorum P. VIII. *. seui caprini ex irino liquati P. XX. *. iridis P. I. *. que in aceto quàm acerrimo iacere per xx. dies debet. Idem autem etiam

tiam recētia phymata doloresq; omnes discutit.

*Theofeni malagma, ad pedum dolores.

*Theoni

AT Theofenus ad pedum dolores, seu à
arenibus partem tertiam, salis partes duas
miscebat, hisq; membranulam illitam impone-
bat, tum superiniiciebat ammoniacum, thymia-
ma in aceto liquatum.

Numenij malagma, ad podagram, cate-
rosq; articulos induratos.

AT Numenius podagram, ceterosq; articu-
los induratos hoc mollebat: abrotani, rosæ
arida, papaveris lacryma, singulorum p. iiii. *.
resine terebinthinae p. iiii. *. thuris, spuma ni-
tri, singulorum p. viii. *. iridis, aristolochiae, sin-
gulorum p. xii. *. cere p. iiii. *. quibus adijci-
tur cedri cyathus unus, olei laurini cyathi tres,
olei acerbi sextarius.

Dexij malagma, si quando callus in
articulis increuit.

SI quando autem in articulis callus increuit,
Dexius docuit imponere, calcis p. iiii. *.
ceruse p. viii. *. resinæ pineæ p. xx. *. piperis
grana p. xx. cere p. ii. *. Quibus dum contun-
duntur, hemina vini lenis instillatur.

DE EMPLASTRIS.

CAP. XIX.

EX emplastris autem nulla maiorem usum
præstat, quàm quæ cruentis protinus vul-
neribus iniiciuntur, ἐvacuα Græci vocant. Hæc
enim reprimunt inflammationem (nisi magna
vis eam cogit) atq; illius quoque impetum mi-
nuunt,

nuunt, cum glutinant vulnera, quæ id patiuntur, cicatricem ipsæ inducunt. Constant autem ex *aliparæ medicamentis non pinguibus, ideoq; *alipenæ nominantur.

Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus vulneribus inijcitur.

Optimum ex his est, quod Barbarum vocatur. Habet æruginis rasæ P. XII. *. spumæ argenti P. XX. *. aluminis, picis aridæ, resinæ pineæ, aridæ, singulorum P. I. *. quibus adjiciuntur olei & aceti singulæ heminæ.

Choaron emplastrum nigrum, ad idem valens.

Alterum ad idem, quod χόαρων vocant, habet spumæ argenti P. C. *. resinæ aridæ tantundem. Sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est, qui fere talis fit ex pice atq; resina. At ex bitumine nigerrimus: ex ærugine, aut æris squama, viridis: ex minoruber, ex cerussa albus.

Basilicon emplastrum nigrum ad idem.

Paucæ admodum cõpositiones sunt, in quibus aliquid mixturæ varietas nouat. Ergo id quoq; nigrum est, quod Basilicon nominatur. Habet panacis P. I. *. galbani P. II. *. picis, & resinæ singulorum P. X. *. olei dimidium cyathum.

Smaragdinum emplastrum nigrum
ad idem.

At quod peruiride est, smaragdinum appellatur, in quo sunt resinæ pineæ P. III. *. cære P. I. *. æruginis P. *. semis, thuris fuliginis P. II. *. olei tantundem, & aceti, quo fuligo

go & erugo in vnum cogantur.

Emplastrum rufum ad idem.

Est etiam coloris fere ruffi, quod celeriter ad cicatricem vulnera perducere videtur. Habet thuris P. I. *. resinæ P. II. *. squamæ æris P. IIII. *. spumæ argenti P. XX. *. cære P. C. *. olei heminam.

παγαλλήκον emplastrum ad idem.

Preterea est, quod παγαλλήκον glutinando vocant. Constat ex his: Bituminis, aluminis scissilis P. IIII. *. spumæ argenti *P. *P. XL. IIII. *. & olei veteris hemina.

Cephalicum emplastrum Philotæ capiti conueniens

Preterea sunt quedam generis eiusdem, quæ quia capitibus fractis maxime cōueniunt, Cephalica à Græcis nominantur. Philotæ compositio habet: Terræ *eretriæ, chalcitidis, singulo- *Ery- rum P. IIII. *. myrrhæ, æris combusti P. X. *. thræ ichthyocolle singulorum P. VI. *. æruginis rase, aluminis rotundi, misyos crudi, aristolochiæ, singulorum P. VIII. *. squamæ æris P. XX. *. thuris masculi P. II. *. cære P. I. *. rosæ, & olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum satis est, dum arida ex eo conteruntur.

Emplastrum viride ad idem valens.

Aliud ad idem viride, æris combusti, squamæ æris, myrrhæ, ichthyocholle, singulorum P. VI. *. misyos crudi, æruginis rase, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulorum P. VIII. *. cære *P. VII. *. olei hemina, aceti quod satis sit. *P. I.

Tetra

Tetrapharmacum emplastrum, ad pus mouendum.
Pri autē mouendo non aliud melius, quā
 quod expeditissimum est, Tetrapharmacum
 à Grecis nominatur. Habet pares portiones cera,
 picis, resinae, seui taurini, si id non est, vitulini.

Enneapharmacum emplastrum ad pus mo-
 uendum, & ad purgandum valens.

Alterum ad idem Enneapharmacum no-
 minatur, quod magis purgat. Constat ex
 nouem rebus, cera, melle, seuo, resina, myrrha,
 rosa, medulla vel ceruina, vel vitulina, vel bu-
 bula, hyssopo, butyro. Quorū ipsorum quoq; pon-
 dera paria miscentur. Sunt autem quedam em-
 plastra, quibus vtriusq; rei facultas est, quæ si
 singula habenda sunt, meliora sunt. Sed in copia
 reicienda sunt, his potius adhibitis, quæ proprie
 id, quod eo tempore opus est, consequuntur. E-
 xempli causa duo proponam.

Attalum emplastrum ad vulnera.

Est igitur ad vulnera Attalum, quod habet
 * P. VI. squamæ aeris * P. xvi. * fuliginis P. xv. *
 ammoniaci tantundem, resinae terebinthinae li-
 quida P. xxv. * seui taurini tantundem, aceti
 heminis tres, olei sextarium.

Iudæi emplastrum, fracto capiti accommodatum.

At inter ea quæ fracto capiti accommo-
 dantur, habent quidam id quod ad au-
 torem Iudæum refertur. Constat ex his, salis
 P. * .iiii. squamæ aeris rubri, aeris combusti, sin-
 gulorum P. xii. * ammoniaci, thymiamatis,
 thuris, fuliginis, resinae arida, singulorum P. vi.
 * res.

*.resina Colophoniacæ,cera,seui vitulini cura-
ti,singulorum P.XX.*.aceti sesquicyathum, olei
minus cyathum, τελεγοννον μέν x Græci appel-
lant, quæ curata vocant, cum ex seuo, puta o- Curata.
mnes membranule diligenter exemptæ sunt aut
ex alio medicamento.

Dia daphnidon emplastrum, ad extrahendum.

Sunt etiam quedam emplastra nobilia ad
extrahendum. Quæ ipsa quoq; ἐπισωστικὰ
nominantur. Quale est, quod quia lauri baccas
habet, dia daphnidon appellatur. In eo est, resi-
nae terebinthinae P.X.*. nitri, cera, picis arida,
baccarum lauri, singulorū P.XX.*. olei paulum.
Quoties aut baccam, aut nucem, aut simile ali-
quid posuero, scire oportebit, antequam expen-
datur, ei summam pelliculam esse demendam.

Aliud dia daphnidon ad extrahendum,
& pus mouendum.

Aliud eo nomine, quod puri quoq; mouen-
do est: Seui vitulini, ammoniaci, thymia-
matis, picis, cera, nitri, baccarum lauri, resina
arida, aristolochiæ, pyrethri, pares portiones.

Philocratis emplastrum ad extrahendum,
& pus mouendum.

Preter has, est Philocratis, quod habet sa-
lis ammoniaci P. VII.*. aristolochiæ P.
VIII.*.cera, resina terebinthina, fuliginis, thu-
ris, singulorum P.XV.*. spume argenti. *P.LII. *P.XXXII
*. Quibus ut pus quoq; moveant, iridis P.III.
. & galbani P.VI.. adijciuntur.

Rhypodes emplastrum, ad extrahendum.

Optimum

Optimum tamen ad extrahendum est id quod à similitudine sordiū *ῥηπιδες* Græci appellant. Habet myrrhæ, croci, iridis, propolis, bdellij, capitulorum punici mali, aluminis & scissilis & rotundi, misyos, chalcitis, atramenti sutorij cocti, panacis, salis ammoniaci, visci, singulorum P. IIII. *. aristolochiæ P. VIII. *. squamæ eris P. XVI. *. resinæ terebinthinæ P. LXXV. *. cæræ, & seui vel taurini, vel hircini P. C. *.

Emplastrum Hecatæi, ad extrahendum.

Hecatæo quoq; autore emplastrum generis eiusdem fit ex his, galbani P. II. *. fuliginis thuris P. IIII. *. picis P. VI. *. cæræ, & resinæ terebinthinæ, singulorum P. VIII. *. quibus paulum irini unguenti miscetur.

Alexandrinum emplastrum viride, ad extrahendum.

Valensq; ad idem emplastrum viride Alexandrinum est. Habet aluminis scissilis P. VIII. *. salis ammoniaci P. *. VIII. 3. squamæ eris P. XVI. *. myrrhæ, thuris, singul. P. XVIII. *. cæræ P. CL. *. resinæ Colophoniacæ, aut pineæ

*P. C C *P. CXC. *. olei heminam, aceti sextarium.

De emplastris exedentibus

Quedam autem sunt emplāstra exedentia, quæ *ῥηπιδες* Græci vocant, quale est id quod habet resinæ terebinthinæ, fuliginis thuris, singulorum P. *. 3. squamæ eris P. I. *. ladani P. II. *. aluminis tantundem, spumæ argenti P. IIII. *.

Emplastrum quod exest corpus, & ossa resoluit, & supercrescentem carnem coërcet.

Exest

EXest etiam vehementer corpus, atque ossa quoq; resoluit, & supercrescentem carnem coërcet, id quod habet spumæ argenti, squamæ aris, uncias singulas, nitri ignem non experti, lapidis Asij, aristolochiæ ꝑ. sextātes, cæra, resina terebinthinæ, thuris, olei veteris, atramēti sutorij, salis ammoniaci ꝑ. semis, æruginis rasa ꝑ. bessem, aceti stillitici heminam, uini aminei tantundem.

Emplastra aduersus morsus, & alia recentiora vulnera.

Sunt etiam aduersus morbus quedam accommodata, quale est Diogenis nigrū, quod habet bituminis, cæra, resina pineæ aridæ singulorum ꝑ. xx. *. spumæ argenti ꝑ. c. *. olei sextariū. Aut in quo sunt squamæ aris ꝑ. iiii. *. cerussæ, & æruginis * rasa, singulorum ꝑ. viii. *. *passæ *. ammoniaci ꝑ. xii. *. cæra, resina pineæ, singulorum, ꝑ. xv. *. spumæ argenti ꝑ. c. *. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ aris ꝑ. xiii. *. galbani ꝑ. vi. *. cerussæ, & æruginis rasa, singulorum ꝑ. viii. *. ammoniaci ꝑ. xii. cæra, resina pineæ, singulorum * ꝑ. l. v. *. *p. xl. v. ex quibus spuma argenti concoquitur.

Ephesium emplastrum rubrum, ad idem valens.

Rubrum quoque emplastrum quod * Ephe- * Ethesium sum vocatur huc aptum est. Habet resina terebinthinæ ꝑ. ii. *. galbani ꝑ. *. iiii. minij sinopici ꝑ. vi. *. thuris fuliginis ꝑ. vi. *. cæra ꝑ. viii. *. spumæ argenti ꝑ. l. vi. *. olei veteris heminam.

r

Aliud

Aliud emplastrum ad idem valens.

Item id quod ex his constat, squame aris, thuris fuliginis, singulorum P. I I I I. *. galbani P. VI. *. salis ammoniaci P. *. X I I. .3 cere P. XXV. *. olei tribus heminis. Hæc autem alijs quoq; recetioribus vulneribus recte imponitur.

Λευὰ ἐμπλάστρα non grauib; vulneribus accommodata, & maxime senilibus.

Sunt enim alba lenia, λευὰ Græci vocant, sferè non grauib; vulneribus accommodata, præcipueq; senilibus. Quale est quod habet
*P. XXX cerussæ *P. L I I. *. seui vitulini curati, & cere, singulorum P. L V I I I. *. olei heminas tres, ex quibus ea cerussa coquitur.

Elephantinum emplastrum.

Aliud quod habet cerussæ P. XX. *. cere
*P. XXXV. *P. LV. *. olei heminam, aque sextarium. Quæ quoties adiiciuntur cerussæ, vel spuma argenti, scire licet illa ex his coquenda esse. Est autem ea percandida compositio, quæ suprâ posita est, ideoq; elephantina nominatur.

Lenia emplastrum.

Lenia quoq; quedam emplastrum sunt, quas λιπαρὰς ferè Græci nominant, ut id quod habet minij P. I I I I. *. spumæ argenti P. XXV. *. cere, & adipis suille, singulorum P. XXVII. vitellos quatuor.

Emplastrum lenis.

Alia compositio generis eiusdem, cere, resine terebinthinæ, singulorum P. VI. *.
*P. VIII. cerussæ *P. VI. *. spumæ argenti, plumbi recrementi,

menti, scoriam molybdi Græci vocant, singulorū
P. X X. cicini olei, & myrti, singulorum hemina.

Archaghati emplastrum lene.

Tertia quæ ad autorem Archaghatum re-
fertur, Misysos cocti, aris combusti, sin-
gulorum, P. I I I I. *. cerussæ coctæ P. V I I I. *.
resinæ terebinthi. P. X. *. spumæ argenti P. V I. *.

Emplastra eiusdem generis ad lenien-
dum apta.

Etiamnum generis eiusdem, spumæ argen-
ti, cæræ, adipis suillæ, singulorū P. X X V I I.
*. vitelli cocti, rosæ hemina. Aut cerati ex oleo
myrteo facti partes tres, adipis suillæ pars quar-
ta, paulum ex plumbi recremento. Aut spumæ
argenti selibra, ex olei hemina, & aquæ marinæ
altera coctæ donec bullire desierit, cui paulum
cæræ sit adiectum, aut pares portiones cæræ, se-
ui, sibi, spumæ argenti, cerussæ.

De pastillis, & primo de his qui ad recētia vulnera
glutinanda, sanandāq; apti sunt. CAP. X X.

Pastilli quoq; facultates diuersas habent.
Sunt enim ad recentia vulnera glutinan-
da, sanandāq; apti. Qualis est qui habet chalcitis,
misysos, spumæ nitri, floris aris, gallæ, aluminis
scissilis modice cocti, sing. P. I. *. aris combusti,
capitulorum mali punici, singulorum P. I I I. *.
Hunc oportet diluere aceto, sic ubi vulnus glu-
tinandus est, illinere. At si neruosus aut muscu-
losus is locus est, commodius est cerato miscere,
sic ut illius octo partes, nona huius sit.

Alius pastillus ad glutinanda vulnera.

r 2

Alius

Alius ad idem constat ex his, bituminis, aluminis scissili, singulorum p. i. *. aris combusti p. i i i i. *. spumæ argenti p. x i. *. olei sextario.

De sphragide pastillo, quem Polybus confecit ad glutinandum vulnus.

Sed longe Polybi celeberrimus est, Sphragis autem nominatur, qui habet aluminis scissilis p. *. i. 3. atramenti sutorij p. i i. *. myrrhæ p. v. *. aloës tantundem, capitulorū punici mali, fellis taurini, singulorum p. v i. *. Quæ contrita vino austero excipiuntur.

Pastillus ad vlcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, & in obscænis partibus, inflammationesq; eorum.

Ad vlcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, obscænis partibus, inflammationesq; eorū: Chrysocolle p. i. *. atramenti sutorij, aluminis scissilis, sing. p. i i. *. halicacabi corticis p. i i i i. *. minij p. v i. *. spumæ argenti p. x i i. *. cerussæ p. x v i. *. Quæ ex aceto & coguntur, & vbi vtendum est, diluuntur.

Pastillus Andronis ad vuam inflammata, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia.

Andronis verò est ad vuam inflammata, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia: Galle atramenti sutorij, myrrhæ, singulorum * p. i i. *. aristolochiæ, aluminis scissilis, singulorū p. i i. *. capitulorū punici mali p. x x v. *. ex passo coactorum, & (cum vsus exigit) aceto vel vino dilutorum, prout valentius aut lenius

lenius vitium est, cui medendum est.

Pastillus ad fissa ani, vel ora venarum fundentia sanguineum vel cancrum.

Propriè autem ad ani fissa, vel ora venarum fundentia sanguine, vel cancrum: Aeruginis P. I I. * myrrhae P. X I I. * stibis, lacrymae papaueris, acaciae singulorum. P. X V I. * Quae ex vino & teruntur, & in ipso usu deliquantur.

Pastillus ad expellendum calculum cum vrina.

Expellere autem ex vesica cum vrina calculum videtur hæc compositio: Casia, croci, myrrhae, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radicis, balsami, hyperici pares portiones conteruntur, deinde vinum lene instillatur, & pastilli fiunt, qui singuli habeant P. *. 3. hiq; singuli quotidie mane ieiuno dantur.

De pelsis.

C A P. XXI.

Haec tria compositionum genera, id est, quae in malagmatis, pastillis, emplastrisq; sunt, maximum, præcipueq; varium usum præstant. Sed alia quoq; utilia sunt, ut ea quae foeminae subiiciuntur (πεῖσσις Graeci vocant.) Eorum hæc proprietas est: Medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaq; lana naturalibus conditur.

Ad sanguinem euocandum.

Ad sanguinem autem euocandum, caueis duabus adijcitur nitri* P. I. *. aut allij se- * P. I I. men conteritur, adijcitur myrrha paululum, & unguento susino miscetur, aut cucumeris sylvestris pars interior, ex lacte muliebri diluitur.

r 3 Ad

Ad vuluam molliendam.

Ad vuluam molliendam, oui vitellus, & fœnum Græcum, & rosa & crocum temperantur. Aut elaterij p. ✱. 3. salis tantundem vuae taminie p. v. i. ✱. melle excipiuntur.

Alia pessi compositio ad idem valens.

Aut Boëtho autore, croci, resinæ terebinthinae, singulorum p. ✱. i. i. i. i. myrrhae p. ✱. 3. rosæ 8. i. ✱. seu vitulini p. ✱. 3. ceræ p. i. i. ✱. miscentur.

Ad inflammationes vuluæ Numenij pessus.

Optima autem aduersus inflammationes vuluæ, Numenij compositio est, quæ habet croci p. ✱. 3. ceræ p. i. ✱. butyri p. v. i. i. i. ✱. adipis anserini p. x. i. i. ✱. vitellos coctos duos, rosæ minus cyatho.

Ad eijciendum è vulua infantem mortuum.

Si verò infans intus decessit, quo facilius eijciatur, malicorium ex aqua terendum, eoq; vtendum est.

Si mulier vitio locorum concidit, qua curatione vtendum sit.

Si concidere vitio locorum mulier solet, cochleæ cum testis suis comburendæ, conterendæq; deinde his mel adijciendū est. Si non comprehendit, adeps leonina ex rosâ mollienda est.

De medicamentis quibus aridis vtimur.

C A P. XXII.

Ad carnem supercrescentem exedendam.

Quædam autem misturæ medicamentorum sunt, quibus aridis neq; coactis vtimur, sic vt inspergamus, aut cum aliquo liquido mista

mixta illinamus, quale est ad carnem supercre-
scantem exedendam, quod habet squama, fuligi-
nis thuris, singulorum p. i. *. eruginis p. i i. *.
Hec autē eadem cum melle purgant vlcera, cum
cera implēt. Misſy quoq; et galla, si paribus por-
tionib. misceatur, corpus consumūt, eaq; vel ari-
da inspergere licet, uel excepta cadmia, illinire.

Ad putrem carnem continendam, ne vltra serpat,
eamq; leniter exedendam plures compositiones.

Putrem vero carnē continet, neq; vltra ser-
pere patitur, & leniter exest, mel, vel cum
lenticula, vel cum marrubio, vel cum olea folijs,
antē ex vino decoctis. Item sertula campana in
mulso cocta, deinde contrita, aut calx cum cera-
to, aut amara nuges cum allio, sic vt huius pars
tertia sit, paulumq; his croci adijciatur. Aut
quod habet spume argenti p. v i. *. cornu bubuli
combusti p. x i i. *. olei myrtei, & vini cyathos
ternos. Aut quod ex his constat: Floris punici
mali, atramenti sutorij, aloës, singulorū p. i i. *.
aluminis scissilis, thuris singul. p. i i i i. *. gallæ
p. v i i i. *. aristolochiæ p. x. *. Vehementius
idem facit etiam adurendo auripigmentum cum
chalcitide, & aut nitro, aut calce, aut charta
combusta. Item sal cum aceto. Vel ea compositio
quæ habet chalcitidis, capitulorum punici mali,
aloës, singulorum p. i i. *. aluminis scissilis, thu-
ris, singulorū p. i i i i. *. gallæ p. v i i i. *. ari-
stolochiæ p. x. *. mellis quantū satis sit ad ea co-
genda. Vel cantharides p. i. *. sulphuris p. i. *.

r 4 lolij

loliꝝ p. i i i. *. Quibus adijcitur picis liquida quantum satis est, adiungendum mel, chalcitis quoq; cum resina & ruta mista, aut cum eadem resina diphryges, aut vna taminia, cum pice liquida. Idem verò possunt feces vini combustæ, & calcis, & nitri pares portiones, vel aluminis scissilis p. *. 33. thuris, sandaracæ, nitri, singulorum p. *. i. gallæ p. v i i i. *. aristolochiæ p. x. *. mellis quantum satis est.

Hierę compositio.

Est etiam Hierę compositio quæ habet myrrhæ, chalcitidis, singulorū p. i i. *. aloës, thuris, aluminis scissilis, singulorum p. i i i i. *. aristolochiæ, gallæ immaturæ, singul. p. v i i i. *. *p. x. mali corij contriti * p. x x. *.

Iudęi compositio.

Est & Iudęi, in qua sunt calcis partes due, nitri quàm ruberrimi pars tertia, quæ urina impuberis pueri coguntur, donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

Iollę compositio.

At Iollas, chartæ combustæ, sandaracæ, singulorum p. i. *. calcis p. i i. *. auripigmenti tantundem miscebat.

Ad sanguinis profluvia vel ex mēbrana cerebri, vel alijs locis, & ad cancerū, & ad inducendam cicatricē, & ad coërcendam carnē crescentem.

Si verò ex membrana, quæ super cerebrū est, profluit sanguis, vitellus combustus & contritus inspergi debet, si alio loco sanguinis profluvium

fluuium est, auripigmenti, squamæ æris, singulorum P. I. *. sandaracæ P. II. *. marmoris cocti P. IIII. *. inspergi debet. Eadem cancro quoq; obsistunt. Ad inducendam cicatricem, squamæ æris, thuris fuliginis, sing P. I I. *. calcis P. I I I I. *. Eadem incrementem quoq; carnem coërcent.

Timei compositio ad ignem sacrum
vel cancrum.

TImæus autem ad ignem sacrum, vel ad cancrum his utebatur, myrrhæ P. I I. *. thuris, atramenti sutorij, singulorum P. I I I. *. sandaracæ, auripigmenti, squamæ æris, singulorum P. I I I I. *. gallæ P. V I. *. cerussæ combustæ P. V I I I. *. Eadē vel arida inspersa, vel melle excepta idem præstant.

Ad sternutamenta excitanda.

Sternutamenta verò vel albo veratro, vel struthio coniecto in nares excitantur, vel his mistis, piperis, veratri albi, singulorum P. *. 3. castorei pondo I. *. spumæ, nitri P. I I. *. struthij P. I I I. *.

Gargarizationes quibus fieri
debeant.

Gargarizationes autem aut leuandi causa fiunt, aut reprimendi, aut euocandi. Leuant lac, cremor, vel ptisana, vel fursurum. Reprimit aqua, in qua vel lenticula, vel rosa, vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmula decoctæ sunt. Euocant, sinapi, piper.

r 5 De

De antidotis, & quibus malis opitulentur.

C A P. XXIII.

Antidota raro, sed precipue interdum necessaria sunt, quia grauissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem dantur collisis corporibus vel per ictus, vel ubi ex alto deciderunt, vel in viscerum, laterum, faucium, interiorumque partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt aduersus uenena, uel per morsus, vel per cibos, aut potiones nostris corporibus inserta.

Compositio antidoti.

VNum est quod habet lacrymæ papaueris P. .x. 3. acori malobatri P. v. .x. iridis illyricæ, gummi, singulorum P. i i .x. anisi P. i i i .x. nardi gallici, foliorum rosæ aridorum, cardamomi, singulorum P. i i i i .x. petroselini P. .x. i i i i 3. trifolij P. v. .x. casia nigra, silis, bdellij, balsami, seminis piperis albi, sing. P. .x. 3. styracis P. .x. v. 3. myrrhæ, opoponacis, nardi syri, thuris masculi, hypocistidis succi, sing. P. v i .x. castorei P. v i .x. costi, piperis albi, galbani, resinæ terebinthinæ, croci, floris iunci rotundi, singulorum P. .x. v i 3. dulcis radicis P. v i i i .x. 3. Quæ vel melle vel passo excipiuntur.

Aliud antidotum Ambrosia nominatū, quod Zopyrus Ptolemæo regi composuit.

Alterum quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse, atq; Ambrosiam nominasse, ex his constat: Costi, thuris masculi, singulorum P. v. .x. piperis albi P. .x. 3. floris iunci rotundi P. i i .x. cinamomi P. i i i .x. casia nigra P.

P. I I I I. *. croci Cilicij P. *. I I I I. 3. myrrhæ
quam staeten nominat P. V. *. nardi indici P. *.
V. 3. Quæ singula cōtrita melle cocto excipiuntur.
Deinde ubi utendū est, id quod Aegyptiæ fabæ
magnitudinē impleat in potione vini diluitur.

Antidotum Mithridatis.

Nobilissimum autem est Mithridatis, quod
quotidie sumendo rex ille dicitur aduer-
sus uenenorum pericula tutum corpus suum red-
didisse. In quo hæc sunt, costi P. *. s. 3. acori
P. V. *. hyperici, cumini, sagapeni, acaciæ succi,
iridis Illyricæ, cardamomi, singulorum P. I I. *.
anesti P. I I I. *. nardi gallici, gentianæ, radi-
cis, aridorum rosæ foliorum, singulorum P. I I I I.
*. papaueris lacrymæ, petroselini, singulorum
P. *. I I I I. 3. casie, silis, lolij, piperis longi, sin-
gulorum P. V I. *. styracis P. *. V. 3. castorei,
thuris, hypocistidis succi, myrrhæ, opopanax,
singulorum P. V I. *. malobathri folij P. V I. *.
floris iunci rotundi, resinæ terebinthinæ, gal-
bani, dauci cretici seminis, singulorum *P. *. V. *P. *. VI.
3. nardi, opobalsamum, singulorum P. *. V I. 3.
thlaspi P. *. V. 3. 3. radice ponticæ P. V I I. *.
croci, Zingiberis, cinnamomi, singulorum P.
*. V I I I. 3. Hæc contrita melle excipiuntur,
& aduersus venenum, quod magnitudinem nu-
cis Græcæ impleat, ex vino datur. In ceteris au-
tem affectibus corporis pro modo eorum, vel
quod Aegyptiæ fabæ, vel quod erui magnitu-
dinem impleat, satis est.

Acopum neruis vtile. C A P . X X I I I I .

A Copa quoque vtilia neruis sunt. Quale est quod habet floris iunci rotundi P. * . I I . 33 . costi, iunci quadrati, lauri baccarū, ammoniaci, cardamomi, sing. P. * . I I I . 3 . myrrhæ, æris combusti, singulorum P. * . V I I . iridis illyrica, cere, singulorum P. I I I I . * . alexandrini calami, iunci rotundi, aspalathi, xylobalsami singulorum P. X V I I I . * . seui P. I . * . vnguenti irini cyathum.

Acopum Euodes neruis vtile.

* ἐλαϊώ-
δες

A Lterū quod * εὐώδες vocāt, hoc modo fit, cere P. * . 3 . olei tantūdem, resina terebinthina ad nucis iuglandis magnitudinē simul incoquantur, deinde infusa in mortario teruntur, instillaturq; subinde quā optimi mellis acetabulum, tum irini vnguenti, & rosæ terni cyathi.

Enchrīsta ad vlcera purganda & implenda.

E Ἐγκρίστα autem Græci vocant liquida quæ illinuntur. Quale est quod fit, ad vlcera purganda, & implenda maxime inter neruos, paribus portionibus inter se mistis, butyri, medulle vitulina, seui vitulini, adipis anserina, cere, * cilini mellis, resina terebinthina, rosæ, olei * cicini. Quæ separatim omnia liquantur, deinde liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: magis verò emollit, si pro rosâ cyprus infunditur.

Ad sacrum ignem.

A D sacrum ignem spuma argenti P. V I . * . cornu bubuli combusti P. I I . * . conteruntur,

tur, adiiciturq; inuicem vinum, & id quod specialiter fil vocatur, & myrteum, donec vtriusq; terni cyathi conficiantur.

De Catapotiiis.

C A P. XXV.

• Catapotium ad somnum accersendum, & leuationem doloris, & simul ad coquendum.

Catapotia quoque multa sunt, varijsq; de causis fiunt. Anodyna vocant, quæ somno dolorem leuant. Quibus vti, nisi nimia necessitas vrget, alienum est. Sunt enim ex vehementibus medicamentis, & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papaueris lacrymæ, galbani, singulorū p. i. .x. myrrhae, castorei, piperis p. i i. .x. Ex quibus quod erui magnitudinem habet, satis est deuorasse.

Catapotium valentius ad somnum.

Alium stomacho peius, ad somnum valentius ex his fit, mandragoræ p. .x. .3. apij seminis, item hyoscyami seminis, singulorum p. i i i i. .x. Quæ ex vino teruntur. Vnum autem eiusdē magnitudinis, quæ suprà posita est, abunde est sumpsisse.

Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.

Sive autem capitis dolores, siue vlcera, siue slippitudo, siue dentes, siue spiritus difficultas, siue intestinorum tormenta, siue inflammatio vuluæ est, siue coxa, siue iecur, aut lienis, aut latus torquet, siue vitio locorū aliqua prolabitur, & obmutescit, occurrit dolori per quietē eiusmodi catapotium: Silij, acori, rutæ syluestris seminis,

nis, singulorum P. I. ✱. castorei, cinnamomi, singulorum P. I. I. ✱. papaveris lacryma, panacis, radicis mandragoræ, malorum aridorum, iunci rotundi floris, singulorum P. I. I. ✱. piperis grana LVI. Hæc per se cōtrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut deuoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

Catapodium aliud ad multa valens.

Quin etiam syluestris papaveris cum iam ad excipiendam lacrymam maturum est, manipulus, qui manu comprehendi potest, in vas demittitur, & superinfunditur aqua, quæ id contegat, atq; ita coquitur. Vbi iam bene manipulus is coctus est, ibidem expressus proijcitur, & cum eo humore, passi pari mēsurā miscetur, inferuetq; donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit, catapodia ex eo fiunt, ad nostræ fabæ magnitudinem, habentq; vsum multiplicē. Nam & somnū faciunt, vel per se assumpta, vel ex aqua data, & aurium dolores leuāt, adiectis exiguo modo rutæ succo, ac passi. Et tormina supprimunt ex vino liquata, & inflammationē vuluæ coërcent, mista cerato ex rosa factō, cum paulum his croci quoq; accessit, & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentē tenent.

Catapodium ad inducendum somnum, quod vulua dolens prohibuit.

Item si vulua dolens somnum prohibuit, croci P. I. I. ✱. anisi, myrrhæ, singulorum P. I. ✱. papaveris

pauēris lacrymæ p. iiii. *. cicutæ seminis p. viii. *. miscentur, excipiunturq; vino vete-
re, & quod lupini magnitudinem habet in tri-
bus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre pe-
riculose datur.

Ad iecur sanandum.

Ad sanandū iecur nitri p. *. 3. croci, myr-
rhæ, nardi Gallici, singulorum p. i. *. mel-
le excipiuntur, daturq; quod Aegyptiæ fabæ
magnitudinem habeat.

Ad finiendos dolores lateris.

Ad lateris dolores finiendos, piperis, ari-
stolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

Ad thoracis dolores finiendos.

Ad thoracis, nardi p. i. *. thuris, castiæ, sin-
gularum p. iiii. *. myrrhæ, cinamomi sin-
gul. p. vi. *. croci p. v. i. *. resinæ terebin-
thinæ quadrans, mellis hemine tres.

Catapodium Athenionis ad tussim.

Ad tussim Athenionis, myrrhæ, piperis,
singulorum p. i. *. castorei, papaueris la-
crymæ, singulorum p. i. *. Quæ separatim con-
tusa, postea iunguntur, & ad magnitudinem
fabæ nostræ, bina catapodia mane, bina noctu
dormituro dantur.

Catapodium Heraclidis Tarentini, ad
tussim, & somnum.

Si tussis somnū prohibet, ad utrūq; Heracli-
dis Tarentini, croci p. i. *. cinamomi, castorei,
papaueris lacrymæ, singulorum p. i. *. myrrhæ, pi-
peris longi, costi, galbani, singulorum p. *. 3.

Catap

Catapodium ad purganda vlcera in
faucibus tussientibus.

Quod si purgāda sunt vlcera in faucibus
tussientibus, panacis, myrrhæ, resine te-
rebinthinae, singulorum P. V. ✱. galbani P. ✱. 3.
hyssopi P. ✱. 3. conterenda sunt, hisq; hemina
mellis adijcienda, & quod digito excipi potest,
deuorandum est.

Colicę Casii medici.

Colice verò Casij ex his constat, croci, ani-
si, castorei, singulorum P. I I I. ✱. petrose-
limi P. I I I. ✱. piperis et longi, & rotundi, sin-
gulorum P. V. ✱. papaueris lacrymæ, iunci rotun-
di, myrrhæ, nardi, singulorum P. V I. ✱. Quæ
melle excipiuntur. Id autem & deuorari potest,
& ex aqua calida sumi.

Ad infantem mortuum aut secundas impellendas.

Infantem verò mortuum, aut secundas expel-
lit aque potio, cui salis ammoniaci P. I. ✱. aut
cui dictami Cretici P. I. ✱. adiectum est.

Laborantibus ex partu quid dari debeat.

Ex partu laborantibus erisimum, ex vino
tepidio ieiunæ dari debet.

Ad adiuuandum vocem.

Vocem adiuuat thuris P. I. ✱. in duobus
cyathis vini datum.

Aduersus difficultatem vrinę.

Aduersus vrinæ difficultatem, piperis lon-
gi, castorei, myrrhæ, galbani, papaueris la-
crymæ, croci, costi vnciæ singulæ, styracis, resine
serebinthinae pondo sextates, mel, absinthij cya-
thus.

thus. Ex quibus ad magnitudinem fabæ Aegyptiæ, & manè, & cœnato dari debet.

Arteriace compositio quomodo fiat.

Arteriace verò hoc modo fit, casie, iridis, cinamomi, nardi, myrrhæ, thuris singulorum P. I. *. croci P. I. *. piperis grana xxx. ex passi tribus sextarijs decoquantur, donec mellis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhæ, thuris, singulorum P. I. *. coniunguntur in passi eundem modum, eodemq; modo decoquantur. Aut eiusdem passi hemina tres vsque eò coquantur, donec extracta inde gutta indurescat, & adijcitur tritæ casie P. I. *.

De quinque generibus noxarum corporis, & primo de vulneribus, quæ maxime per tela inferuntur.

C A P. XXVI.

Cum facultates medicamentorū proposuerim, genera in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus læsit, ut in vulneribus. Cum quid intra seipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in vesica calculus. Cum quid increuit, ut vena, quæ intumescens, in varicem conuertitur. Cum quid deest, ut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus plus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ergo dilatis his, quæ præcipue scalpellum & manum postulant, nunc de his dicam, quæ maxime medicamentis egent. Diuidam autem hanc quoque curandi partem sicut priorem. Et antè dicam de his, quæ in quamlibet partem corporis incidunt.

s

Tum

Tum de his, quæ certas partes infestant. Incipiã
 à vulneribus. In his autem ante omnia scire me-
 dicus debet, quæ insanabilia sint, quæ difficilem
 curationem habeant, quæ promptiorem. Est enim
 prudentis hominis, primum eum qui seruari non
 spem potest, non attingere, nec subire speciem eius, vt
 occisi, quem fors ipsius peremit. Deinde vbi gra-
 uis metus, sine certa tamen desperatione est, in-
 spem dicare necessarijs periclitantis in difficili rem
 esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel
 fefellisse videatur. Sed vt hæc prudenti viro con-
 ueniunt, sic rursus histrionis est, paruum rem at-
 tollere, quò plus præstitisse videatur. Obligariq;
 æquum est, cõfessione promptæ rei, quò curiosius
 etiam circumspectat, ne quod per se exiguum est
 malum, maius curantis negligentia fiat.

Quæ vulnera insanabilia sint.

Seruari non potest, cui basis cerebri, cui cor,
 cui stomachus, cui iocinoris portæ, cui in spi-
 na medulla percussa est, cuiq; aut pulmo medius,
 aut ieinum, aut tenuis intestinum, aut ventricu-
 lus, aut renes vulnerati sunt, cui'ue circa fan-
 glandes, ces grandes venæ, vel arteriæ præcisæ sunt.

venæ vel
 arteriæ,
 etc.

Quæ vulnera difficilem curationem habeant.

Vix autem ad sanitatē perueniunt, quibus
 vlla parte pulmo, aut iocinoris crassum,
 aut membrana quæ continet cerebrum, aut lie-
 nis, aut vluva, aut vesica, aut vllum intestinum,
 aut ceptum trāsuersum vulneratum est. Hi quo-
 que in præcipiti sunt, in quibus usque ad gran-
 des.

des, intusq; conditas venas, in alis vel poplitibus mucro *desedit. Periculosa etiam vulnera *descēdit. sunt, ubicunq; venae maiores sunt, quoniam exhaurire hominem, profusione sanguinis possunt. Idq; euenit non in alis tantum, atq; poplitibus, sed etiam in his venis, quae ad anum, testiculosq; perueniunt. Præter hæc malum vulnus est, quodcunque in alis, vel feminibus, vel inanibus locis, vel in articulis, vel inter digitos est. Item quodcunq; musculum, aut neruum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem læsit.

Quæ vulnera tutiorem curationem habeant.

Tutissimū omnium, quod in carne est, & hæc quidem loco, vel peiora, vel meliora sunt. Modò verò periculū facit, quodcunq; magnū est.

Observationes quædam, & ætatis, & corporis & vitæ, & temporis in vulneribus.

Aliquid etiam in vulneris genere, figuraq; est. Nam peius est quod etiam collisum, quàm quod tantum discissum est, adeo ut acuto quoq; , quàm retuso telo vulnerari cōmodius sit. Peius etiā vulnus est, ex quo aliquid excisum est, ex quo'ue caro alia parte abscissa, alia dependet. Pessimaq; plāga in orbem est: tutissima, quæ lineæ modo recta est. Quò deinde propius huic, illi'ue figuræ vulnus est, eò vel deterius, vel tolerabilius est. Quin etiam confert aliquid ætatis, & corpus, & vitæ propositū, et anni tempus: quia facilius sanescit puer, vel adolescens, quàm senior, valēs, quàm infirmus: neq; nimis

tenuis, neq; nimis plenus, quàm si alterum ex his est. Integri habitus, quàm corrupti: exercitatus, quàm iners: sobrius, & temperans, quàm vino, veneriq; deditus. Opportunissimumq; curationi tempus vernum est, aut certè neq; feruens, neq; frigidum. Siquidē vulnera & nimius calor, & nimium frigus infestant: maximè tamen horum varietas, ideoq; perniciosissimus autumnus est. Sed pleraq; ex vulneribus oculis subiecta sunt, quorundam ipsæ sedes indices sunt, quas alio loco demonstrauimus, cū positis interiorum partium ostendimus. Veruntamen quia quedam vicina sunt, interest quoque vulnus in summa parte sit, an penitus penetrauerit: necessarium est notas subijcere, per quas quid intus actum sit, scire possimus, & ex quibus vel spes, vel desperatio oritur.

Signa percussi cordis.

Igitur corde percusso, sanguis multus effertur, venæ languescunt, color pallidissimus, sudores frigidi, maliq; odoris, tanquam in rotato corpore oriuntur, extremisq; partibus frigidis, matura mors sequitur.

Signa pulmonis icti.

Pulmone uerò icto, spirandi difficultas est, sanguis ex ore spumans, ex plaga rubens, simulq; etiam spiritus cum sono fertur: in vulnus inclinari iuuat, quidam sine ratione consurgunt. Multi si in ipsum vulnus inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

Signa

Signa iocinoris vulnerati.

Iocinoris autem vulnerati nota sunt, multus sub dextra parte præcordium profusus sanguis, ad spinam reducta præcordia, in ventrem cubandi dulcedo, punctiones, doloresq; vsque ad iugulum, iunctumq; ei latus scapularum, os intentum. Quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus accedit.

Signa percussorum renum.

Renibus verò percussis, dolor ad inguina, testiculosq; descendit, difficulter vrina redditur, eaq; aut est cruenta, aut cruor fertur.

Signa vulnerati lienis.

At liene icto, sanguis niger à sinistra parte prorumpit, præcordia cum ventriculo ab eadem parte indurescunt, sitis ingens oritur, dolor ad iugulum, sicut iocinore vulnerato venit.

Signa percussæ vuluæ.

At cum vulua percussa est, dolor inguinibus, & coxis, & femoribus est. Sanguinis pars per vulnus, pars per naturale descendit, vomitus bilis insequitur. Quædam obtumescent, quædam mente labuntur, quædam sui compotes, nervorum, oculorumq; dolore vrgeri se confitentur, morientesq; tandem, eadem qua corde vulnerato patiuntur.

Signa percussi cerebri, vel membranæ eius.

Sin cerebrum, membrana'ue eius vulnus accepit, sanguis per nares, quibusdā etiam per aures exit, fereq; bilis vomitus insequitur. Quorundam sensus obtunduntur, appellati'que

ignorant. Quorundam trux vultus est, quorundam oculi quasi resoluti, huc atq; illuc mouentur. Fereq; tertio vel quinto die delirium accedit. Multorum etiā nerui distenduntur. Ante mortem autē pleriq; fascias, quibus caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori obijciunt.

Signa percussi stomachi.

Vbi stomachus autem percussus est, singultus, & bilis vomitus insequitur. Si quid cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito. Venarum motus elanguescunt, sudores tenues oriuntur, per quos extremae partes frigescent.

Signa ieiuni intestini, & ventriculi vulnerati, & aliorum intestinorum.

Communes verò ieiuni intestini, & ventriculi vulnerati notae sunt. Nam cibus, & potio per vulnus exeunt, praecordia indurescunt, nunquam bilis per os redditur. Intestino tantum sedes inferior est. Cetera intestina icla vel stercus, vel odorem eius exhibent.

Signa percussae medullae, quae in spina est.

Medulla verò quae in spina est discussa, nerui resoluuntur, aut distenduntur, sensus intercedit: interposito tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam stercus excernunt.

Signa septi transversi percussi.

At si septum transversum percussus est, praecordia sursum contrahuntur, spinadolet, spiritus rarus est, sanguis spumans fertur.

Signa

Signa vesicę vulneratę.

Vesica verò vulnerata, dolēt inguina. Quod super pubē est, intenditur, pro vrina sanguis, aut ex ipso vulnere vrina descendit, stomachus afficitur. Itaq; aut bilem vomunt, aut singultiant, frigus, & ex eo mors sequitur.

De sanguine, & sanie, & pure, & eorum speciebus, quando meliora, deterioraue sint.

His cognitis, etiam nunc quedam alia noscenda sunt, ad omnia vulnera vlceraq; de quibus dicturi sumus, pertinētia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est. Sanies est tenuior hoc, varie crassa, et glutinosa, & colorata. Pus crassissimum, albissimumq; glutinosius & sanguine et sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti, aut iam sanescente. Sanies est inter vtrunq; tempus: Pus ex vlcere iam ad sanitatē spectante. Rursus & sanies, & pus quasdam species Græcis nominibus distinctas habent. Est enim quedā sanies, quę vel ἰχθὺς, vel *meliceria nominatur. Est pus, *μελίη quod ἐλαῖωδες appellatur. ἰχθὺς tenuis, subalbidus ex malo vlcere exit, maximeq; vbi neruo lēso inflammatio secuta est. Meliceria crassior, & glutinosior, subalbida melliq; albo subsimilis fertur. Hęc quoq; ex malis vlceribus, vbi nerui circa articulos lēsi sunt, & inter hęc loca, maxime ex genibus. Ελαῖωδες tenue, subalbidum, quasi vinctum colore atq; pinguitudine, oleo albo non dissimile, adparet in magnis vlceribus

s 4 sanescen

sanefcentibus. Malus autē est sanguis nimium aut tenuis, aut crassus, colore vel liuidus, vel niger, aut pituita mistus, aut varius. Optimus calidus, rubēs, modice crassus, nō glutinosus. Itaq; protinus eius vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itēq; postea spes in his maior est, ex quib⁹ melioris generis quæq; proueniunt. Sanies igitur mala est, multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum vlcus, & iunctā ei cutē erodit. Melior non multa, modice crassa, subrubicūda, aut subalbida. Ixōq; autem peior est multus, crassus, subliuidus, aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, qui cætera omnia contraria prioribus habet. Meliceria autem mala est multa, & percrassa, melior quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter hæc optimum est. Sed id quoq; peius est multum, tenue, dilutum, magisq; si ab initio tale est. Itemq; si colore sero simile, si pallidum, si liuidum, si feculentum est. Præter hæc, si male olet, nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius. Itemq; si leue est, si nihil olet, si æquale est, modo tamen conuenire, & magnitudini vulneris & tēpori debet. Nam plus ex maiore, plus nondum salutis inflammationibus naturaliter fertur. Elæodes quoq; peius est multum, & parum pingue, quo minus etiam, quoq; idipsum pinguius, eo melius est.

Curatio

Curatio aduersus profusionem sanguinis in vulneribus.

Quibus exploratis, ubi aliquis ictus est, qui seruari potest, protinus prospicienda duo sunt, ne sanguinis sit profusio, ne' ve inflammatio interimat. Si profusionem timemus, quod ex sede vulneris, & magnitudine eius, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest, siccis linamentis vulnus implendum est, supraq; imponenda spongia, ex aqua frigida expressa, ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, saepius linamenta mutanda sunt. Et si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad sanguinem suppressendum est. Ideoque quidam id vulnere infundunt. Sed alius rursus metus subest, ne nimis valenter ibi retenta materia magnam inflammationem postea moveat. Quae res efficit, ut neq; rodentibus medicamentis, neq; adurentibus, & ob id ipsum inducentibus crustam, sit utendum, quamuis pleraq; ex his sanguinem suppressunt. Sed si semel ad ea decurritur, potius quae mitius idem efficiunt. Quod si illa quoq; profluvio vincuntur, venae quae sanguinem fundunt apprehedendae, circaq; id quod ictum est, duobus locis deligandae, intercedendaeq; sunt, ut & in se ipse coeant, & nihilominus ora praclusa habeant. Vbi ne id quidem res patitur, possunt ferro candenti aduri. Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neque nervus, neq; musculus est, ut puta in fronte, vel

s s superio

superiore capitis parte, commodissimum tamen est, cucurbitulam admouere à diuersa parte, vt illuc sanguinis cursus reuocetur.

Curationes aduersus vulnerum inflammationem.

ET aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Aduersus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu, ea timeri possunt, vbi lesus est vel os, vel nervus, vel cartilago, vel musculus: aut vbi parum sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinem maturè suppressere non oportebit, sed pati fluere, dum tutum erit, adeo vt si parum fluxisse videbitur, mitti quoq; ex brachio debeat, vtiq; si corpus iuuenile, & robustum, & exercitatum est: multoq; magis, si id vulnus ebrietas præcessit. Quod si musculus lusus videbitur, præcidendus erit. Nam percussus mortiferus est: præcisus sanitatem recipit.

De glutinatione vulnerum.

Sanguine autem vel suppresso, si nimius erumpit: vel exhausto, si per se parum fluxit, longè optimum est vulnus glutinari. Poteest autem id vel quod in cute vel etiam in carne est, si nihil ei præterea mali accedit. Poteest caro alia parte dependens, alia inherens, si tamē etiamnū integra est, & coniunctione corporis fouetur. In his verò quæ glutinantur duplex curatio est. Nā si plaga in molli parte, sui debet, maximeq; si discissa auris ima est, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur

guttur cutis vel venter. Si verò in carne vulnus
 est, hiatq; neq; in vnum ora facile attrahuntur,
 sutura quidē aliena est. Imponendæ verò fibulæ
 sunt (αὐτῶν Ἰῆρας Græci nominant) quæ oras, pau-
 lum tamē, contrahunt, quo minus lata postea ci-
 catrix sit. Ex his autem colligi potest, id quoq;
 quod alia parte dependens, alia inhærebit, si a-
 lienatum adhuc nō est, suturam, an fibulā postu-
 let. Ex quibus nautra antè debet imponi, quàm
 intus vulnus purgatum est, ne quid ibi concreti
 sanguinis relinquatur. Id enim & in pus verti-
 tur, & inflammationē mouet, & glutinari vul-
 nus prohibet. Ne linamentū quidem, quod sup-
 primendi sanguinis causa inditū est, inibi relin-
 quendum est. Nam id quoq; inflamat. Compre-
 hendi vero sutura vel fibula non cutem tantum,
 sed aliquid etiā ex carne, vbi suberit hæc, oport-
 tebit, quò valentius hæreat, neq; cutem abrum-
 pat. Vtraq; optima est ex *acia molli non nimis * acu
 torta, quò mitius corpori insadat. Vtraq; neq; ni-
 mis rara, neq; nimis crebra iniicienda est. Si ni-
 mis rara est, non continet. Si nimis crebra est, ve-
 hementer afficit, quia quò sæpius acus corpus
 *transiit, quoq; plura loca iniectum vinculum *transiit
 mordet, eo maiores inflammationes oriuntur, ma-
 gisq; æstate. Neutra etiam vim illam desiderat:
 sed eatenus utilis est, quæ cutis ducentem, quasi
 sua sponte subsequitur. Ferè tamen fibulæ latius
 vulnus esse patiuntur. Sutura oras iungit, quæ
 ne ipsæ quidem inter se contingere ex toto de-
 bent

bent, ut si quid intus humoris cōcreuerit, sit quā
emanet. Si quod vulnus neutrum horum recipit,
id tamē purgari debet, deinde omni vulnere pri-
mo imponenda est spongia ex aceto expressa: si
sustinere aliquis aceti vim non potest, vino ven-
dum est. Levis plaga iuuatur etiam, si ex aqua
frigida expressa spongia imponitur. Sed ea quo-
cunq; modo imposita est, dū manet, prodest. Itaq;
ut inarescat, non est committendum. Licet q; si-
ne peregrinis, & conquisitis, & compositis me-
dicamentis vulnus curare. Sed si quis huic pa-
rum confidit, imponere medicamentum debet,
quod sine seuo compositum sit ex his, quæ cruen-
tis vulneribus apta esse proposui. Maximeq; si
caro est, barbarum: si nervi, vel cartilago, vel
aliquid ex eminentibus, quales aures, vel labra
sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum quoq;
viride nervis idoneum est, eminentibusq; parti-
bus ea, quam Græci πᾶντοσων vocant. Solet e-
tiā colliso corpore exigua parte findi cutis. Quod
ubi incidit, non alienum est scalpello latius ape-
rire, nisi muscoli, nerviq; iuxta sint, quos incidi
non expedit. Vbi satis deductum est, medica-
mentum imponendum est. At si id quod collisum
est, quamvis parum deductum est, latius tamen
aperiri propter nervos, aut musculos non licet,
adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extra-
hant precipueq; ex his, id quod rhypodes voca-
ri proposui. Non alienum est, etiam ubicunque
vulnus graue est, impositum, quo id iuuetur,
in super

in super circumdare lanam succidam ex aceto,
& oleo. Vel cataplasma, si mollis is locus est,
quod leniter reprimat, si nervosus aut masculo-
sus, quod emolliat.

Quomodo vulnus ligari conveniat.

Fascia verò ad vulnus deligandum, lintea
aptissima est, eaq; lata esse debet, ut semel
iniecta non vulnus tantum, sed paulum utrinq;
etiam oras eius comprehendat. Si ab altera par-
te caro magis recessit, ab ea melius attrahitur.
Si aequè ab utraq;, transversè cōprehendere oras
debet: aut si id vulneris ratio non patitur, media
primū injicienda est, ut tum in utranq; par-
tem ducatur. Si autem deliganda est, ut & con-
tineat, neq; astringat. Quod non continetur, ela-
bitur; Quod nimis astrictum est, cancro pericli-
tatur. Hyeme saepius fascia circuire debet, aestate
quoties necesse est, tum extrema pars eius in-
ferioribus acu assuenda est. Nam nodus *vulnus *vltus
ledit, nisi tamen longè est. Illo neminem decipi
debet, ut propriam viscerum curationem requi-
rat, de quibus supra posui. Nam plaga ipsa cu-
randa extrinsecus, vel sutura, vel alio medicinae
genere est. In visceribus nihil movendum est,
nisi aut si quid ex iocinore, aut liene, aut pulmo-
ne duntaxat extremo dependat, praecidatur. A-
lioquin vulnus interius, ea victus ratio, eaq;
medicamenta sanabunt, quae cuiq; visceri con-
venire superiore libro proposui.

De ratione victus, & notis vulnerum cu-
rationibûsq; eorum.

Hic ita

His ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est, isq; si graue vulnus est, abstinere, quantum vires patiuntur, ante inflammationem a cibo debet: bibere donec sitim finiat. aquam calidam: vel si aestus est, neq; febris, neq; dolor est, etiam frigidā. Adeo tamen nihil perpetuum est. Sed semper pro viribus corporis aestimandum, ut imbecillitas etiā cibum protinus facere necessarium possit, tenuem scilicet et exiguum, qui tantum sustineat. Multiq; etiam ex profluvio sanguinis intermorientes, ante ullam curationē vino reficiendi sunt, quod alioqui micissimum vulnere est. Nimis verò intumescere vulnus, periculosum: nihil intumescere, periculosissimum est. Illud indicium est magne inflammationis, hoc emortui corporis. Protinusq; si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet, maturē vulnus sanum fore. Ac ne febris quidē terrere debet, si in magno vulnere, diū
 *inflam- *inflatio est, permanet. Illa perniciofa est, quae
 matio vel leui vulnere superuenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel delirium mouet, vel si nervorum rigor, aut distentio, quae ex vulnere orta est, eam non finit. Vomitus quoq; biliosus non voluntarius, vel protinus ut percussus est aliquis, vel dum inflamatio manet, malum signum est in his duntaxat, quorum vel nervi, vel etiam nervosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere non alienum est, praecipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neq; protinus post cibum, neq;
 iana

iam inflammatione orta, neq; cū in superioribus partibus plaga est. Biduo sic vulnere habito, tertio die aperiendū; detergendaq; sanies ex aqua frigida est, eadēq; rursus injicienda sunt. Quinto iam die quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus detecto vulnere cōsiderandus color est. Quod si lividus, aut pallidus, aut varius, aut niger est, scire licet malum vulnus esse; idq; quādo cūq; animaduersum est, terrere nos potest. Album, aut rubicundum esse vlcus, commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculum ostendit. Bona signa sunt, vbi hæc sine dolore tenuis, et mollis est. Sed si glutinatur vulnus, aut leuiter intumuit; eadē sunt imponenda, quæ primò fuerunt. Si grauis inflamatio est, neq; glutinandi spes est, eaq; pus moueat, aquæ quoq; calidæ necessarius vsus est, vt & materiā digerat & duritiā emolliat, & pus citet. Ea sic tēperanda est, vt & manu contingēti iocunda sit, vsq; eò adhibenda donec aliquid ex tumore minuisse, coloremq; vlceri magis naturalē reddidisse videatur: maximeq; si grande vulnus est, tetrapharmacum: si in articulis, digitis, locis cartilaginosis, rhympodes. Post id fomentum, si lata plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet, & si latius hiat, illud emplastrum liquari ex irino vnguento oportet: eoq; illita linamenta disponi per plagam, deinde emplastrum suprā dari, & super id succidam lanā, minusq; etiam, quā primò, fasciæ astringendæ sunt.

Curatio

Curationes proprię articulorum.

Proprię quędam in articulis visenda sunt, in quibus si præcisi nerui sunt, qui continebant, debilitas eius partis sequitur. Si id dubium est, & ex acuto telo plaga est, ea transversa commodior est. Si retuso & graui est, nullum in figura discrimen est. At visendum est pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albūq; & crassum diu fertur, neruum præcisum esse credibile est. Magis quoq; maiores dolores inflammationesq; quò maturius excitate sunt. Quamuis autem non abscissus neruus est, tamen si circa tumor durus diu permanet, necesse est & diuturnum vlcus esse, & sano quoq; eo tumorem permanere, futurūq; est, vt tardè membrum id extendatur vel contrahatur. Maior tamen in extendendo mora est, vbi recuruato articulo curatio adhibita est, quàm in recuruando eo, quod rectum continuerimus. Collocari quoq; membrum quod ictum est ratione certa debet. Si glutinandum est, vt superius sit, si in inflammatione est, vt in neutram partem inclinatum sit. Si iam pus profluit, vt deuexum sit. Optimum etiam medicamentum quies est: moueri & ambulare, nisi sanis, alienum est. Molius tamen his est periculosum, qui in capite vel brachijs, quàm qui in inferioribus partibus vulnerati sunt. Molimeq; ambulatio conuenit, femine, aut crure, aut pede laborante. Locus in quo cubabit, tepidus esse debebit, Balneum quoque dum parum
vulnus.

vulnus purum est, inter res infestissimas est. Nam id & humidum, & sordidum reddit, ex quibus ad cancerum transitus esse consuevit. Levis frictio rectè adhibetur, sed his partibus, quæ longius absunt à vulnere.

Vulnus quomodo purgandum est.

Inflammatione finita, vulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta, supraq; id, emplastrum, vel enneapharmacum dandum est. Tum demum verò purum vlcus est, cum rubet, ac nimium neque siccum, neq; humidum est. Ac quodcumq; sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est: quod aut pallidum, aut albidum, aut liuidum, aut nigrum est, id purum non est.

Quomodo vulnus implendum est.

Purgato, sequitur vt impleatur, iamq; calida aqua eatenus necessaria est, vt sanies remoueat. Lana succida superuacuu vsus est. Lota melius circundatur. Ad implendum autem vulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua. Itaq; ea adhiberi non alienum est, vt butyrum cum rosa, exigua mellis parte, aut cum eadem parte, aut cum eadem rosa tetrapharmacu, aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rari. Cibi boni succi, vitatis omnibus acribus, sed iam plenioribus. Nam & auis, & venatio, & suilla elixa dari potest. Vinum omnibus dum febris, dum inflammatio est, alienu est. Itemq; vsque ad cicatricem, si nervi, musculi ue
vulner

vulnerati sunt, etiam si alte caro, aut si plaga in summa cute generis tutioris est, potest non perue-
tus, modicè tamen datum, ad implendum quoque proficere. Si quid molliendum est, quod in ner-
uosis locis, musculosisq; necessarium est, cerato quoque super vulnus vtendum est. At si caro su-
percreuit, modice reprimat siccum linamentum, vehementius squama aris. Si plus est, quod tol-
li opus est, adhibenda sunt etiamnum vehemen-
tiora, quæ corpus exedant. Cicatricem post o-
mnia hæc commodè inducit, lycium ex passo, aut lacte dilutum, vel etiam per se impositum sic-
cum linamentum.

De viceribus, quæ extrinsecus per vulnera in-
cidunt, curationibûsq; eorum.

Hic ordo felici curationis est. Sed quædam
tamen periculosa incidere consuerunt. In-
terdum enim uetustas vlcus occupat, induciturq;
ei callus, & circum ora crassæ liuent, post quæ
quicquid medicamentorum ingeritur, parû pro-
ficit, quod fere negligenter curato vlceri super-
uenit. Interdum vel ex nimia inflammatione,
vel ob æstus immodicos, vel ob nimia frigora,
vel quia nimis vulnus adstrictum est, vel quia
corpus aut senile, aut mali habitus est, cancer
occupat. Id genus à Grecis diductum in species
est, nostris vocabulis non est. Omnis autem can-
cer non solum id corrumpit, quod occupauit, sed
etiam serpit, deinde alijs alijsq; signis decerni-
tur. Nam modò super inflammationem rubor
vlcus

vlcus ambit, isq; cum dolore procedit, ὀδυνώ-
 δας Græci nominant. Modò vlcus nigrum est,
 quia caro eius corrupta est. Idq; vehementius
 etiam putrescendo intenditur. Vbi vulnus hu-
 midum est, & ex nigro vlcere humor pallidus
 fertur, maliq; odoris est, caruncula corruptæ.
 Interdum etiam nerui ac membranae resoluun-
 tur, specillumq; demissum descendit aut in latus,
 aut deorsum, eoq; vitio nonnunquam os quoque
 afficitur. Modò oritur ea, quàm Græci γάγρυπα-
 τος appellant. Priores in qualibet parte corpo-
 ris fiunt. Hæc in prominentibus membris, id est
 inter ungues, & alas vel inguina, fereq; in se-
 nibus, vel his quorum corpus mali habitus est.
 Caro in vlcere vel nigra, vel liuida est, sed sicca
 & arida, proximaq; cutis plerūq; subnigra * pu- * pusulis
 stulis impletur, deinde ei proxima vel pallida,
 vel liuida, fereq; rugosa sine sensu est. Vterior in
 inflammatione est, omniaq; ea simul serpunt.
 Vlcus in locum pustulosum: Pustula, in eum qui
 pallet aut liuet: Pallor aut liuor, in id quod in-
 flammatum est: Inflammatio, in id quod inte-
 grum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta
 oritur, ingensq; sitis, quibusdam etiam delirium
 accedit, alij quamuis mentis suæ compotes sunt,
 balbutiendo tamen vix sensus suos ore expli-
 cant. Incipit affici stomachus. Fit sædi spiritus
 ipse odoris. Atq; initium eius quidem mali reci-
 pit curationem. Vbi verò penitus insedit, insana-
 bile est, plurimiq; sub frigido sudore moriuntur.

t 2

Cyrat

*conci-
den-
dum

AC pericula quidem vulnerum hæc sunt. Vetus autem vlcus scalpello *incidendum est, excidendaq; eius ora, & quicquid super eas liuet, æquè incidendum. Si varicula intus est, quæ his sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde, vbi sanguis emissus, nouatumq; vulnus est, eadem curatio adhibenda, quæ in recentibus vulneribus exposita est. Si scalpello aliquis vti non vult, potest sanare id emplastrum, quod ex ladano fit, & cum vlcus sub eo exesum est, id quo cicatrix inducitur.

Curatio Erysipelarum.

ID autem quod Erysipelas vocari dixi, non solum vulnere superuenire, sed sine hoc quoq; oriri consuevit, atque interdum periculum maius affert, vtique si circa ceruices aut caput constitit. Oportet, si vires patiuntur, sanguinem mittere, deinde imponere simul reprimentia & refrigerantia, maximeq; cerussam solani succo, aut cimoliam cretam aqua pluuiali exceptam, aut ex eadem aqua subactam farinam cupresso adiecta, aut si tenerius corpus est, lenticulam. Quicquid impositum est, betæ folio contegendum est, & super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo, sulphuris P. I. *.

*P. XII. cerussæ & croci, singulorum *P. XX. *. eaq; cum vino conterenda sunt, & id his illinendum:

aut.

aut si durior locus est, solani folia contrita, suille adipi miscenda sunt, & illita linteolo superimponenda sunt, quæ carnem putrem lenius exedant, repurgatumq; vlcus sic vt cætera nutriendum est. Si magis putre est, iamq; procedit ac serpit, opus est vehementius erodentibus. Si ne hæc quidem euincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanum est, siccum est cum aduritur, post vstionem putris vlceris superponenda sunt quæ crustas à vino resoluant, eas ἐσχαρὰς Græci vocant. Vbi exciderunt, purgandum vlcus maxime melle & *resina est, sed alijs quoque purgari potest, qui *resina bus purulenta curantur, eodemq; modo ad sanitatem perducendum est. vsta

Curatio Gangrænæ.

Gangranam verò, si nondum planè tenet, sed adhuc incipit curare non difficilimum est, utiq; in corpore iuuenili, & magis etiam si muscoli integri sunt, si nerui vel lesi non sunt, vel leuiter affecti sunt, neque vlus magnus articulus nudatus est, aut carnis in eo loco paulum est, ideoq; non multum, quod putresceret, fuit, consistitq; eo loco vitium: quod maxime fieri in digito potest. In eiusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quicquid aridum est, & intentione quadam proximum quoque locum male habet, *vsq; ad sanum *vsq; eo corpus concidere. Medicamenta verò, dum ma-
sa.

lum serpit, adhibenda nulla sunt, quæ prius moue-
re consueverunt, ideoq; ne aqua quidem calida. Gra-
uia quoq; quamuis reprimantia, aliena sunt. Sed
his quàm leuissimis opus est, superq; ea quæ in-
flammata sunt, utendum est refrigerantibus. Si
nihil magis malum constitit, vti id, quod est in-
ter integrum ac vitiatum locum, debet. Precipueq;
in hoc casu petendum, non à medicamentis solum,
sed etiam à victus ratione præsidium est. Neque
enim id malum nisi corrupti vitiosiq; corporis est.
Ergo, primo, nisi imbecillitas prohibet, abstin-
tia utendum. Deinde danda quæ per cibum po-
tionemq; aluum, ideoq; etiam corpus, astringant,
sed ea leuia. Postea si vitium constitit, imponi
super vulnus eadem debent, quæ in putri vlcere
præscripta sunt. Ac tum quoq; plenioribus cibis
viti licebit ex media materia, sic tamen non nisi
aluum, corpusq; siccantibus: aqua verò pluuiali
frigida balneum (nisi iam certa fiducia redditæ
sanitatis est) alienum est, siquidem emollitum in
eo vulnus, cito rursus eodem malo afficitur. So-
lent uerò nonnunquam nihil omnia auxilia pro-
ficere, ac nihilominus serpere hic cancer. Inter
quæ miserum, sed vnicum, auxilium est, ut cæ-
tera pars corporis tuta sit, membrum quod pau-
latim emoritur, abscindere. Hæ grauissimorum
vulnerum curationes sunt. Sed ne illa quidem ne-
gligenda, vbi integra cute interior pars collisa
est, aut vbi dera sum, attritum'ue aliquid est,
aut vbi surculus corpori infixus est, aut vbi te-
nue,

ne, sed altum vulnus insedit. In primo casu commodissimum est malicorium ex vino coquere, interioremq; eius partem conterere, & cerato miscere ex rosa facto, idq; supponere: deinde ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lene medicamentum, quale λιπαρά est. Deraso verò, detrictoq; imponendum est emplastrū tetrapharmacum, minuendusq; cibus, & vinum subtrahendū. Neq; id quia non habebit altiores ictus, contemnendum erit. Siquidem ex eiusmodi casibus sæpe cancri fiunt. Quòd si leuius id erit, & in parte exigua, contenti esse poterimus eodem leni medicamento. Surculum verò (si fieri potest) oportet vel manu, vel etiam ferramento eijcere. Si vel praefractus est, vel altius descendit, quàm ut ita fieri possit, medicamento euocandus est. Optime autē educit superimposita arundinis radix, si tenera est protinus contrita: si iam durior, antè in mulso decocta. Cui semper mel adiciendum est, aut aristolochia cum eodem melle. Pessima ex surculis arundo est, quia aspera est. Eademq; offensa, etiam in filice est. Sed vsu cognitus est, utraq; aduersus alteram medicamentum esse, si contrita superimposita est. Facit autem idem in omnibus surculis, quodcūq; medicamentū extrahendi vim habet. Idem altis tenuibusq; vulneribus aptissimū est. Priori rei Philocratis, huic Hecatæi emplastrū maxime cōuenit.

Quomodo cicatrix vulneri inducenda,
purgandāq; sit.

t 4

Vbi

VBi vero in quolibet vulnere ventū ad inducendum cicatricem est, quod per purgatis iam repletisq; vlceribus necessarium est: primum ex aqua frigida linamentū, dum caro alitur: deinde cum iam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet, quo & reprimatur cicatrix, & colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix sylvestris cucumeris præstat. Idem compositio, quæ habet elaterij P. I. *. spumæ argenti P. I. I. *. vnguenti pondo I I I I. *. Quæ excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoque cicatrices leniter purgant paribus portionibus mixta, ærugo, plumbum elotum, eademq; rosa cocta, siue vngitur cicatrix, quod in facie fieri potest: siue id vt emplastrum imponitur, quod in alijs partibus commodius est. At si vel excreuit cicatrix, vel concava est, stultum est decoris causa rursus, & dolore & medicinam sustinere. Alioqui res utriq; succurri patitur. Siquidem utraq; cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mauult, idem efficiunt compositiones hæ, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnē exedentia medicamenta coniicienda sunt: super concavam implentia, donec vtrunq; vlcus sanæ cuti æquetur, & tum cicatrix inducatur.

De vulneribus quæ per morsus inferuntur, eorumq; curationibus. CAP. XXVII.

Dixi

DIxi de his vulneribus, quæ maxime per tela inferuntur. Sequitur, ut de his dicam, quæ morsu fiunt, interdum hominis, interdum simiæ, sæpe canis, nonnunquam ferorū animalium, aut serpentium. Omnis autem feræ morsus habet quoddam virus. Itaq; si vehemens vulnus est, cucurbitula admouenda est. Si leuius, protinus emplastrū injiciendum, præcipueq; * Diogesi. Si * Diogeni id non est, quodlibet ex his, quæ aduersus morsus nis proposui. Si ea non sunt, viride Alexandrinum. Si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex his quæ recentibus vulneribus accommodantur. Sal quoq; his, præcipueq; ei, quod canis fecit, medicamentū est, si manus uulneri imponitur, superq; id duobus digitis verberatur: Exaniat enim: ac salisamentū quoq; recte super id vulnus deligatur.

Curatio aduersus rabiosi canis morsum.

VTiq; autem si rabiosus canis fuit, cucurbitula virus eius extrahendum est. Deinde si locus neque neruosus neq; musculosus est, vulnus id adurendum est. Si vri non potest, sanguinem homini mitti non alienū est. Tum vsto quidem vulnere superimponenda, quæ cæteris vstis, sunt. Ei verò quod expertum ignem non est, ea medicamenta, quæ vehementer exedunt. Postq; nullo nouo magisterio, sed iam supraposito vlcus erit implendum, & ad sanitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in balneum mittunt, ibiq; patiuntur desudare, dum vires corporis sinunt, vlcere adaperto, quo ma-

t s gis

gus ex eo quoq; virus distillet, deinde multo, me-
 racoq; vino excipiunt: quod omnibus venenis
 contrarium est. Idq; cum ita per triduum factū
 est, tutus esse homo à periculo videtur. Solet au-
 tem ex eo vulnere, vbi parum occursum est, aquæ
 Timor timor nasci, ὁ ὀφθαλμὸς Græci appellant. Mi-
 aquæ. serimū genus morbi, in quo simul eger & siti,
 ὁ ὀφθαλμὸς & aqua metu cruciatur. Quo oppressis in angu-
 sto spes est. Sed vnicum tamen remedium est, nec
 opinantē in piscinam non antè ei prouisam pro-
 iicere. Et si natandi scientiam non habet, modò
 mersum bibere pati, modò attollere. Si habet, in-
 terdum deprimere, vt inuitus quoq; aqua satie-
 tur. Sic enim simul & sitis, & aquæ metus tol-
 litur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum
 corpus in aqua frigida vexatū, nervorū disten-
 sio absumat. Id ne incidat, à piscina protinus in
 oleum calidum demittendus est. Antidotum au-
 tem, præcipuè id, quod primo loco posui: vbi id
 non est, aliud, si nondum eger aquam horret, po-
 tui ex aqua dandū est, & si amaritudine offen-
 ditur, mel adiiciendum est. Et si iam is morbus
 occupauit, per catapotia sumi potest.

Curationes communes, aduersus omnes
 morsus serpentium.

Serpentium quoque morsus non nimium di-
 stantem curationē desiderant, quamuis in ea
 multum antiqui variarunt, vt in singula genera
 anguium singula medendi genera præciperent,
 atq; alijs alia. Sed in omnibus eadem maxime
 profic

proficiunt. Igitur in primis super vulnus id membrum deligandum est, non tamen nimium vehementer, ne torpeat. Dein venenum extrahendum est. Id cucurbitula optime facit. Neque alienum est, antè scalpello circa vulnus incidere, quo plus vitiatum sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est, quod tamē uix incidere potest, tum quodlibet simile vas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui vulnus exugat. Neque Hercules scientiam præcipuam habent hi qui Psylli nominantur, sed audaciam usu ipso Psylli confirmatam. Nam venenum serpentis, ut quædam etiam venatoria venena, quibus Galli præcipuè utuntur non gustu, sed in vulnere nocent. Ideoq; colubra ipsa tuto est, ictus eius occidit, & si stupente ea (quod per quædam medicamenta circulatores faciunt) in os digitum quis indidit, neque percussus est, nulla in ea salua noxa est. Ergo quisquis exempli Psylli secutus, id vulnus exuxerit, & ipse tutus erit, & tutum hominē præstabit. Illud ne intereat, antè debet attendere, ne quod in gingivis, palato'ue, alia'ue parte oris vlcus habeat. Post hæc is homo loco calido collocandus est, sic ut id, quod percussum erit, in inferiorem partē inclinetur. Si neque qui exugat, neque cucurbitula est, sorbere oportet ius anserinum, vel ouillum, vel vitulinum, & vomere. Vivum autem gallinaceum pullum per medium dividere, & protinus calidum super vulnus imponere, sic ut pars interior corpori iungatur. Facit
id

id etiam haedus, agnus uel discissus, & calida eius caro statim super vulnus imposita. Emplastrum quoque, quae supra comprehensa sunt. Aptissimumque est, vel Ephesium, vel id quod ei subiectum est. Praesensque in aliquo antidoto praesidium est. Sin id non est, necessarium est exorbere portionem meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud, quo calor mouendus est, ne humorem intus coire patiatur. Nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam mouentia, quia materiam extenuant, utilia sunt.

Speciales curationes aduersus ictus serpentium,
& primo aduersus ictum aspidis.

HAec aduersus omnes ictus communia sunt. *V*sus tamen ipse docuit, eum quem aspis percussit, acetum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri, qui cum ab hac ictus esset, & partim ob ipsum vulnus, partim ob immodicos aestus siti premeretur, ac locis siccis alium humorem non reperiret, acetum quod forte secum habebat, ebibit, & liberatus est. Credo quoniam id, quamuis refrigerandi vim *Aecti vis* *& natura.* habet, tamen habet etiam dissipandi. Quò fit, ut terra respersa eo, spumet. Eadem ergo vi verisimile est, spissescentem quoque intus humorem hominis ab eo discuti, & sic dari sanitatem.

Aduersus ictum scorpionis.

IN quibusdam etiam alijs serpentibus, certa quaedam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimum medicamentum est. *Qui-*
dam

dam contritum cum vino bibunt, quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt, quidam super prunam eo imposito, vulnus suffumigant, undique veste circumdata, ne is fumus dilabatur, tum carbonem eius super vulnus deligant. Bibere autem oportet herba solaris, quam ἡλιότροιον Græci vocant, semen, vel certe folia ex vino. Super vulnus vero etiam fursures ex aceto, vel ruta syluatica recte imponitur, vel cum melle sal tostus. Cognoui tamen medicos, qui ab scorpione ictis, nihil aliud quam ex brachio sanguinem miserunt.

Heliotropium herba solaris.

Aduersus aranei, & scorpionis ictum.

ET ad scorpionis autem, & ad aranei ictum, allium cum ruta recte miscetur, ex oleoq; contritum semper imponitur.

Aduersus cerasitis, & dipsas, & hæmorrhoidis ictum.

AT si cerasites, aut dipsas, aut hæmorrhoidis percussit* asphodeli, quod Aegyptiæ faba * catapasmæ magnitudinē æquet, arefactum, in duas portiones diuidentur, sicut ei rutæ paulum adijciatur. Trifolium quoq; & mentastrum, & cum aceto panaces æquè proficiunt. Costumq; & casia, & cinamomum recte per portionem assumuntur.

Aduersus chersydri ictum, & cerasitis.

ADuersus chersydri verò ictum, panaces, aut laser, quod sit scrupulorum * P. I. I. * vel * I I I S. porri succus cum hemina vini sumendus est, & * I. edenda multa satureia. Imponendum autem super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum, aut

ex

ex eodem ordeacea farina, aut ruta, vel nepeta, cum sale contrita melle adiecto. Quod in eo quoque vulnere, quod cerasites fecit, equè valet.

Aduersus phalangii ictum.

Vbi verò phalangium nocuit, præter eam curationem quæ manu redditur, sæpe homo demittendus in solium est, dandusq; ei myrrhe, & vuae taminiæ par modus ex passi hemina, vel radicle semen, aut lolij radix ex vino, & super vulnus furfures ex aceto coctæ, imperandumq; ut is conquiescat.

Aduersus ictus Italorum anguium, qui mious terribiles peregrinis sunt.

Verum hæc genera serpentium & peregrina, & aliquāto magis pestifera sunt, maximeq; æstuosis locis gignuntur. Italia, frigidioresq; regiones hac quoq; parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Aduersus quos satis proficit herba betonica, vel cantabrica, vel cætaurion, vel agrimonia, vel trixago, vel personina, vel marina pastinaca, singule binæ'ue trite, & cum vino potui datæ, & super vulnus impositæ. Illud ignorari non oportet, omnis serpentis ictum & ieiunii, & ieiunia magis nocere. Ideoq; perniciosissimi sunt cum incubat. Vtilissimumq; est, ubi ex anguib; metus est, non antè progredi, quàm quis aliquid assumpsit.

Remedium generale aduersus omnia venena, vel in cibo, vel in potione assumpta.

Non tam facile his opitulari est, qui venenum, vel in cibo, vel in potione sumpserunt.

runt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti, ita ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde, quia noxa non à cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen, ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto vomere. Deinde, ubi præcordia exhaustit, bibere antidotum. Si id non est, vel merum vinum.

Specialia remedia aduersus quædam venena,
& primo aduersus cantharidas.

Sunt tamē quædā remedia propria aduersus quædam venena, maximeq; leuiora. Nam si cantharidis aliquis ebibit, panaces cum lacto contusa, vel galbano, vino adiecto dari, vel lac per se debet.

Aduersus elcuram

Si elcuram, vinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est, deinde is vomere cogendus. Posteaq; laser ex vino dandum. Isq; si febre vacat, in calidum balneum mittendus. Si non vacat, vngendus ex calefacientibus est. Post quæ quies ei necessaria est.

Aduersus hyoscyamum.

Si hyoscyamum, feruens mulsum bibendum est, aut quodlibet lac, maxime tamen asininum.

Aduersus cerussam.

Si cerussam, ius malue, vel ius glandis ex vino contrite, maxime profunt.

Aduersus sanguisugam si epota est, & lac quod intus coit.

Si sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. Si lac intus coit, aut passum,

aut

aut coagulum, aut cum aceto laser.

Aduersus fungos inutiles.

Si fungos inutiles quis assumpserit, radícula aut epota, aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi verò hi & specie quidem discerni possunt *fieri ab vtilibus, & cocturae genere idonei* sunt. Nam siue ex oleo inferbuerit, siue piri surculus cum his inferbuit, omni noxa vacant.

De adustis corporis locis, & quomodo curari debent.

Adustis quoque locis extrinsecus vis inferitur, itaque sequi videtur, ut de his dicam. Hæc autem optime curantur folijs aut lilij, aut lingue caninae, aut betæ in vetere vino oleoque decoctis. Quorum quodlibet protinus impositum, ad sanitatem perducit. Sed diuidi quoque curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia reprimendaque, primò & pustulas prohibeant, & summâ pelliculam exasperent. Deinde ea quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticula cum melle, farina, vel myrrha, vel vino, creta cimolia cum thuris cortice contrita, & aqua cocta, atque ubi vsus necessitas incidit, aceto diluta. Ex insequentibus qualibet lipara. Sed idonea maxime est, quæ vel plumbi recrementum, vel vitellos habet. Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatio est, impositam habere cum melle lenticulam. Vbi ea declinauit farina cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec crusta cadant. Tum eruum cum melle, aut irim, aut resinâ tereb

terebinthinam, donec vlcus purum sit. Nouissi-
me siccum linamentum.

De interioribus vlceribus, quæ aliqua corporū
parte corrupta nascuntur. CAP. XXVIII.

De carbunculo, & eius curatione.

AB his quæ extrinsecus incidunt, ad ea ve-
niendum est quæ interius corrupta aliqua
corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud
carbunculo peius. Eius hæ notæ sunt: Rubor est,
superq; eum non nimium pustulæ eminent, ma-
xime nigre, interdum subliuide, aut pallide. In
his sanies esse videtur, infra color niger est.
Ipsam corpus aridū, & durius quàm naturali-
ter oportet. Circa quæ quasi crusta est, eaq; inflam-
matione cingitur, neq; in eo loco leuari cutis po-
test, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus
vrget, nonnunquam horror, aut febris oritur, aut
vtrunq;. Idq; vitium subteractis quasi quibusdā
radicibus serpit, interdum celerius, interdū tar-
dius, supra quoq; procedens inalbescit, dein liui-
dum fit, circumq; exiguae pustulæ oriuntur. Et si
circa stomachum fauces'ue incidit, subito spiritū
sepe elidit. Nihil melius est, quàm protinus adu-
rere. Neque id graue est. Nam non sentit, quo-
niam ea caro mortua est. Finisq; adurendi est,
dum ex omni parte sensus doloris est. Tum dein-
de vulnus, sicut cætera adusta, curandum est.
Sequitur enim sub medicamētis erodentibus cru-
sta vndique à viua carne diducta, quæ trahit se-
cum quicquid corruptum erat, purusq; iam si-

v nu

nus curari potest implentibus. At si in summa cute vitium est, possunt succurrere quadam vel exedentia tantum, vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcūq; verò medicamentum positum est, si satis proficiet, protinus à viua corruptam partem resoluit. Certa q; esse fiducia potest, ferè ut vndiq; vitiosa caro excedat, qua huiusce rei medicamen exest. Si id non fit, medicamentumq; malo vincitur, utique ad vstionem properandum est. Sed in eiusmodi casu abstinentum à cibo, à vino est. Aquam liberaliter bibere expedit. Magisq; ea seruanda sunt, si febricula quoque accessit.

De Carcinomate, & eius curatione.

Non idem periculi magnitudo affert, nisi imprudentia curantis agitatum est. Id vitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciē, nares, aures, labra, mammās fœminarū. Et in iecore autem, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur, isq; immobilis, inæqualis tumet, interdum etiam torpet. Circa eum inflata venæ quasi recurvantur, hæq; pallent, aut liuent, nonnunquā etiam in quibusdam delitescunt. Tactusq; is locus, alijs dolorē affert, in alijs eum non habet. Et nonnunquā siue ulcere durior aut mollior est, quā esse naturaliter debet, nonnunquam iisdem omnibus vlcus accedit. Interdumq; nullam habet proprietatē, interdum simile his est, quæ vocant Græci νοδωδωματα, aspredine quadam & magnitudine sua. Colorq;

Colorq; eius ruber est, aut lenticula similis, neq;
tuto fertur. Nam protinus aut resolutio nervorum,
aut distentio insequitur. Sape homo ictus obnu-
tescit, atq; eius anima deficit. Quibusdā etiam si
idipsum pressum est, quæ circa sunt, intēduntur
& intumescunt. Nanq; pessimū id genus est, fe-
req; primū id fit, quod *αανοῦδες* à Græcis nomi-
natur. Deinde ex eo id *ααγνῖωμα*, quod sine
ulcere est. Deinde *ulcus* ex eo thymiū. Tolle ni-
hil nisi *αανοῦδες* potest, reliqua curationibus ir-
ritantur. Et quo maior vis adhibita est, eo magis
quidā vsi sunt medicamētis adurentibus. Quidā
ferro adusserunt. Quidā scalpello exciderūt. Neq;
vlli vnquā medicina proficit. Sed adusta proti-
nus concitata sunt, & increuerunt, donec occide-
rent. Excisa etiā post inductam cicatricē, tamen
reuerterunt, & caussam mortis attulerunt. Cum
interim pleriq; nullā vim adhibendo, qua tollere
id malum tentent, sed imponendo tantum lenia
medicamēta, quæ quasi blandiantur, quo minus
ad ultimam senectutē perueniant, non prohiben-
tur. Discernere autem *cacoëthes*, quod curationē
recipit, à *carcinomate*, quod non recipit, nemo
scire potest, nisi tempore & experimento. Ergo
vbi primum id vitium notatum est, imponi de-
bent medicamēta adurentia. Si leuatur malum,
minuunturq; eius indicia, procedere curatio po-
test, & ad scalpellum, & ad vstionē. Si proti-
nus irritatum est, scire licet iam *carcinoma* esse,
remouēdaq; sunt omnia acria, omnia vehemen-
tia.

tia. Sed si sine ulcere is locus durus est, imponi ficum quam pinguis simam, aut rhympodes emplastrum satis est. Si vlcus aequale est, ceratum ex rosa iniiciendum est, adijciendusq; ei pulvis ex cōtrita testa, ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. Sed si id nimium supercreuit, tentanda squama eris est, quae lenissima ex adurentibus est, eatenus ne quid eminere patiatur, sed ita, si nihil exacerbauit. Si minus, eodem cerato contenti esse debebamus.

De Theriomate, & eius curatione.

Est etiā vlcus, quod ἔλγινμα Græci vocāt. Id & per se nascitur, et interdū vlceri ex alia causa facto superuenit. Color est vel liuidus, vel niger, odor fœdus, multus, & mucosus similis humor. Id ipsum vlcus neq; tactū, neq; medicamentū sentit, prurigine tantū mouetur. At circa dolor est, & inflammatio. Interdum etiam febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis erumpit. Ad id quoq; malum serpit. Quæ omnia sepe intenduntur. Fitq; ex his vlcus, quod ἔλγινμα ἐκδιόμειπον Græci vocant, quia celeriter serpendo, penetrandoq; vsq; ossa corpus vorat. Id vlcus inæquale est, cæno simile, inestq; multus humor glutinosus, odor intolerabilis, maiorq; quàm pro modo vlceris inflāmatio. Vtrūq; sicut omnis cācer, fit maxime in senibus, vel his, quorum corpora mali habitus sunt. Curatio vtriusq; eadem est, sed in maiore malo magis necessaria. Ac primum à vitio ratione ordinādus est, vt quiescat

quiescat in lectulo, ut primis diebus à cibo abstin-
 neat, aquam quàmplurimam assumat. Alius
 quoq; ei ducatur. Deinde post inflammationē ci-
 bum boni succi capiat, vitatis omnibus acribus,
 potionis quantum volet, sic, ut interdum quidem
 aqua contentus sit. In cœna etiā vini austeri ali-
 quid bibat. Non equè tamen fame in his quos
 herpes urget, atque in his qui therioma adhuc
 habebunt, utendū erit. Et victus quidē talis ne-
 cessarius est. Super vlcus verò inspergenda est
 arida aloë, cœnanthe, & si parū proficiet, chalcit-
 tis. Ac si quis nervus exesa carne natus est, con-
 tegendus antè linteolo est, ne sub eo medicamēto
 aduratur. Si validioribus etiam remedijs opus
 est, ad eas compositiones veniendū est, quæ ve-
 hementius adurant. Quicquid autem inspergi-
 tur, auerso specillo insundi debet. Superdanda
 cum melle sunt vel linamenta, vel olea folia ex
 vino decocta, vel marrubium, eaq; linteolo conte-
 genda in aqua frigida madefacto, deinde bene ex-
 presso. Circaq; quæ tumor ex inflammatione est,
 imponenda, quæ reprimant, cataplasmata. Si sub
 his nihil proficitur, ferro locus aduri debet, dili-
 genter nervus, si qui adparent, antè contectis.
 Adustum vel medicamentis, vel ferro corpus,
 primum purgandum, deinde implendum esse,
 adparare cuilibet ex prioribus potest.

De sacro igne, & eius curatione.

Sacer quoq; ignis, malis vlceribus annume-
 rari debet. Eius duæ species sunt: Alterna
 v 3 est

est subrubicundū, aut mistum rubore atq; pallore, exasperatumq; per pustulas continuas, quarum nulla altera maior est, sed plurimae perexiguae. In his semper ferè pus, & saepe rubor cum calore est, serpitq; id nonnunquam sanescente eo, quod primum vitiatum est, nonnunquam etiam exulcerato, ubi ruptis pustulis vlcus continuatur, humorq; exit, qui esse inter saniem, & pus videri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, praecipueq; in plantis. Alterū autem est in summæ cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, subliuidū, inæqualiter tamen, mediumq; sanescit, extremis procedentibus, ac saepe id, quod iam sanum videbitur, iterum exulceratur. At circa proxima cutis quæ vitium receptura est, tumidior & durior est, coloremq; habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque malo ferè corpora seniores tentantur, aut quæ mali habitus sunt, sed in cru-
ribus maxime. Omnis autem sacer ignis, ut minimum periculum habet ex his quæ serpunt, sic propè difficilimè tollitur. Medicamentum eius
* fortissi- * fortuitum est, vno die febris, quæ humorem no-
mum xium absumat. Cuius quo crassius & albidius est, eo periculi minus est. Prodest etiam infra os vlcerū ladi, quo plus puris exeat, & id quod ibi corruptum corpus est, extrahat: sed tamen si febricula accessit, abstinentia, lectulo, alui-
ductione opus est. In omni verò sacro igni neq; lenibus, & glutinosis cibis, neq; salsis & acri-
bus

bus utendum est, sed his quæ inter utrunq; sunt, qualis est panis sine fermento, piscis, hædus, aues, exceptoq; apro omnis ferè venatio. Si nõ est fabricula, & gestatio utilis est, & ambulatio, & vinum austerũ, & balneum. Atq; in hoc quoq; genere potio magis liberalis esse, quàm cibus debet. Ipsa autẽ vlcera si mediocriter serpunt, aqua calida: si vehementius, vino calido fouenda sunt. Deinde acu pusula quæcunq; sunt aperiendæ. Tum imponenda ea, quæ putrem carnẽ exedant. Vbi inflammatio sublata, vlcusq; purgatum est, imponi lene medicamentum debet. In altero autem genere possunt proficere mala cotonea in vino cocta, atq; contrita. Potesť emplastrum vel Hieræ, vel tetrapharmacũ, cui quinta pars thuris adiecta sit. Potesť nigra hedera ex vino austero cocta. Ac si celeriter malum serpit, non aliud magis proficit. Purgato vlcere, quod in summa cute esse proposui, satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficient.

De chironio vlcere, & eius curatione.

Chironium autem vlcus appellatur, quod & magnum est, & habet oras duras, callosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis. Odor malus neq; in vlcere, neq; in eius ^{*tu-} humore est. Nulla inflammatio, dolor modicus est, nihil serpit, ideoq; nullum periculum adfert, sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, vlcusq; renouatur. Fit maxime in pedibus & cruribus. Su-

per id

per id imponi debet, quod & lene aliquid, & rehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei causa fit ex his, Squamae aris, plumbi cloti combusti, singulorum P. IIII. ✱. cadmie, cerae, singulorum P. VIII. ✱. rosae quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

De ulceribus quæ ex frigore in pedibus, & manibus oriuntur, & eorum curationibus.

χιμετρον
hoc genus
ulceris di-
citur à Græ-
cis, à Lati-
nis Pernio.

Flunt etiam ex frigore hyberno ulcera, maxime in pueris, & præcipuè pedibus, digitisq; eorum, nonnunquam etià in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustulae oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus. Prurigo maior est, nonnunquam humor exit, sed non multus, qui referre vel pus, vel sanie videtur. In primis multa calida aqua fouendum est, in qua rapa decocta, aut si ea non sunt, aliqua verbenæ ex reprimetibus. Si nondum ad apertum ulcus, æs quam maxime calidum quis pati potest, admouendum est. Si iam exulceratio est, imponi debet alumen, æqua portione cum thure contritum, cum vino adiecto, aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est, hic quoq; melius lenia medicamenta proficiunt.

De struma, & eius curatione.

Struma quoq; est tumor, in quo subter concreta quedam ex pure & sanguine, quasi glandula oriuntur. Quæ vel præcipuè fatigare medicos solent, quoniam & febres mouent, nec unquam facile maturescunt, & siue ferro, siue medica

medicamentis curantur. Plerumq; iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoq; post medicamento est opus. Quibus id quoq; accedit, quod longo spatio detinent. Nascuntur maxime in ceruice, sed etiam in alis & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoq; fœminarum se reperisse, Chirurgicus Meles autor est. Propter hæc & album veratrum recte datur, atq; etiam sæpius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur, quæ humorem vel educant, vel dissipent, quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoq; quidam utuntur, quæ exedunt, crustaq; eum locum astringunt: tunc verò ut vlcus conterant. Quæcunq; autem ratio curandi est, corpus puro vlcere exercendum, atq; alendum est, donec ad cicatricem perueniat. Quæ cū medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum: quem struma male habet, eum, si anguem edit, liberari.

De Furunculo, & eius curatione.

Furunculus verò est tuberculū acutum cum inflammatione, & dolore, maximeq; ubi ^{*inflatio} iam in pus vertitur. Qui ubi ad apertus est, & exit, super adparet pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra, quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se, atq; erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quæ maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum
v s est.

est. Sed alia quoq; suprà comprehensa sunt. Si cætera desunt, imponi debet primum non pingue emplastrum, vt id reprimat: deinde si nõ repres- sit, quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidam est, vel resina, vel fermentum. Ex- presso pure, nulla vltrà curatio necessaria est.

De Phymate, & eius curatione.

Phyma verò nominatur tuberculum furun- culo simile, sed rotundius & planius, sepe etiam maius. Nam furunculus oui dimidi magnitudinem raro explet, nūquam excedit. Phyma etiam latius patere cōsuevit, sed inflamma- tio dolorq; sub eo minores sunt. Vbi euulsum est pus, eodem modo adparet ventriculus, quod in furunculo non inuenitur. Verū omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris & sæpius nascitur, & facilius tollitur: in iuuenibus rarius oritur, et difficiliter curatur. Vbi etas in- durauit, ne nascitur quidem. Quibus verò medi- camentis discuteretur, suprà propositum est.

De Phygethlo, & eius curatione.

Phygethlon autem est tumor, non altus, sed latus, in quo quiddā pustulæ simile est. Do- lor distentioq; vehemens est, & maior quàm pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricu- la, idq; tarde maturescit, neq; magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in vertice, aut in
 Panis. alis, aut in inguinibus. Panem, ad similitudinem figuræ, nostri vocant. Atq; idipsum quo medi- camento tolleretur, suprà demonstrauimus. Sed cum omnes

omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium ad suppurationem spectans. Idq; ferè fit aut post febres, aut post dolores partis alicuius, maximeq; eos, qui ventrem infestant. Sæpiusq; oculis expositum est, siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius, quod phyma vocari proposui, rubetq; cum calore, et paulò post etiam cum duritia, magisq; innocenter indolescit, & sitim vigiliamq; exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest, maximeq; ubi altius pus mouetur. Sed cū siti vigiliaq; sentiuntur intus aliquæ punctiones, & quod de subito durius non est, melius est: & quamuis non rubet, coloris tamen aliter mutatus est. Quæ signa iā pure oriente nascuntur. Tumor ruborq; multo antè incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus is materia additus est per cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & refrigerant, qualia & aliàs & paulò antè in Erysipelate proposui. Si iā durior est, ad ea veniendum est, quæ digerant, & resoluant: qualis est ficus arida, contusa: aut fex mista cum cerato: quod ex adipe suilla coactum sit, aut cucumeris radix, cui ex farina duæ partes adiectæ sint, antè ex mulso decoctæ. Licet etiam miscere aquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum, pondusq; adycere myrrhæ dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. Atq; emplastra quoq; & malagmata idem efficiunt, quæ supra explicui. Quod per hæc discussum

cussum non est, necesse est, maturescat. Idq; quo
celerius fiat, imponenda est farina ordeacea, ex
qua cocta recte miscetur. Eadem autem hæc in
minoribus quoq; abscessibus, quorum nomina
proprietasq; supra reddidi, recte fiunt. Eadēq;
omnium curatio, tantummodo distat. Crudum est
autem, in quo magis quasi venarum motus est,
& gravitas, & ardor, & distentio, & dolor,
& rubor, & durities. Et si maior abscessus est,
horror aut etiam febricula permanet, penitusq;
condita suppuratio. Si pro his quæ alibi cutis o-
stendit, punctiones sunt, ubi ista se remiserunt,
* iamq; is * iamq; cutis prurit, & aut sublividus, aut sub-
locus pru albidus est, matura suppuratio est, eaq; ubi vel
rit per ipsa medicamenta, vel etiam ferro aperta
est, pus debet emitti. Tum si qua in alis, vel in-
guinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In
ceteris quoq; partibus, si una plaga exigua est,
si mediocris suppuratio fuit, si non altè penetra-
vit, si febris non est, si valet corpus, æquè lina-
menta superuacua sunt. In reliquis, parce tamen,
nec nisi plaga est, imponi debent. Commodè ve-
rò vel super linamenta, vel sine his imponitur
lenticula ex melle, aut malicorium ex vino co-
ctum. Quæ & per se, & mista idonea sunt. Si
qua circa duriora sunt, ad ea molliēda, vel mal-
ua cōtrita, vel fœni graci, lini' ve semen ex pas-
so coctum superdādum est. Quicquid deinde im-
positum est, non astringi, sed modicè deligari
debet. Illo neminem decipi decet, ut in hoc gene-
re ce

re cerato vtatur. Cetera que pertinent ad purgandum vlcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, conueniuntq; in vulneribus, exposita sunt.

De Fistulis, & earum generibus, & curationibus.

Nonnumquam autē ex eiusmodi abscessibus, & ex alijs vlcerum generibus Fistule oriuntur. Id nomen est vlceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis, habetq; quedam in singulis locis propria. prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. Siquidem alie breues sunt, alie altius penetrant, alie recte intus feruntur, alie multoq; plures transuersae, alie simplices sunt, alie duplices, triplices' ve ab vno ore intus orsae, quae tres fiunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur, alie recte, alie flexae, et tortuosae sunt. Alie intra carnem desinunt. Alie ad ossa, aut cartilaginem penetrant, aut vbi neutrum horum subest, ad interiora perueniunt. Alie deinde facile, alie cum difficultate curantur. Atq; etiam quedam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplici recenti intra carnem, adiuuatq; ipsum corpus, si iuuenile, si firmum est. Inimica, contraria his sunt. Itemq; si fistula os, vel cartilaginem, vel neruum, vel musculos laesit, si articulum occupauit, si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vluam, vel ad grandes venas arterias' ve, vel ad inania, vt guttur, stomachum, thoracē penetravit. Ad intestina quoq;
ea ten

ea tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fistulam conuenit, ut quò tendat, & quàm alte perueniat, scire possimus. Simul etiam protinus humida, an siccior sit: quod extracto specillo patet. Si verò os in vicino est, id quod disci potest, si iam nec ne, eò fistula penetrauit, quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est. Si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si elabitur specillum, nondum caries est: si non labitur, sed æquali innititur, caries quidē, verum adhuc leuis est. Si inæquale quoq; & asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago ubi subhæsit, ipsa sedes docet, peruentūq; esse ad eam ex renixu potest. Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxæ. Simples verò hæ sint, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris, cuius si plus fertur, quàm quod simplici spatio conuenit, plures sinus esse manifestum est. Cumq; fere iuxta sint caro, & nervus, & aliqua nervosa, quales ferè tunicæ, membranæq; sunt. genus quoq; puris docebit, num plures sinus intus diuersa corporis genera perroserint. Siquidem ex carne pus leue, album copiosius fertur. At ex nervoso loco coloris quidem eiusdem, sed tenuius & minus. Ex nervo pingue, & oleo non dissimile. Deniq; etiam cor-
poris

poris inclinatio docet, num in plures partes fistula penetrarint, quia sepe cum quis aliter decubuit, aliterq; membrum collocavit, pus ferri, quod iam desierat, incipit, testaturq; non solum alium sinum esse ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere. Sed si & in carne, & recens, & simplex est, ac neq; rugosa, neq; caua sede, neq; in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore mouetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salem, vel alumen, vel squamam aeris, vel æruginem, ex metallicis aliquid. Ex q; eo collyriū fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. Idq; ea parte qua tenuius est, altera antecedente demitti oportet in fistulam, donec sanguis purus se ostendat. Quæ in omnibus fistularum collyrijs perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo supèr imponendum, supraq; injicienda spongia, in acetum antè demissa, solui quinto die satis est. Genusq; victus adhibendum est, quo carnem ali docui. Ac si longius à precordijs fistula est, ex intervallo ieiunium radículas edisse, deinde vomere, necessarium est. Vetusstate callosa fit fistula. Callus autem neminem fallit, quia durus est, & aut albus, aut pallidus. Sed tum validioribus medicamentis opus est. Quale est, quod habet papaveris lacrymæ p. i. *. gummi p. i i i. *. cadmiæ p. i i i i. *. atramenti sutorij p. v i i i. *. Ex quibus aqua coactus collyrium

Callus

* P. I. lyrium fit. Aut in quo sunt galle * P. * .eruginis, sandaracæ, aluminis Aegyptij, singulorum P. I. * .atramenti sutorij combusti P. I. I. * . Aut quod constat ex chalcitide, & saxo calcis, quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est, adijcitur, eaq; melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, eruginis rasæ P. I. I. * .conterere, deinde ammoniaci, thymiamatis P. I. I. * . aceto liquare, eoq; infuso ex erugine colligere. Idq; ex primis medicamentis est. Sed ut hæc maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est calum quibuslibet adurentibus medicamentis prodere, aut quibus hæc maxime in effectu sunt erodere. Satiusq; est vel papyrum intortum, vel aliquid ex penicillo in modum collyrij adstrictum eò illinere. Scilla quoq; cocta & mista cum calce, callum exest. Si quando verò longior & transversa fistula est, demisso specillo contra principium huius incidi, commodissimum est, & collyrium * utrinq; demitti. At si duplicem esse fistulam, aut multiplicem existimamus, sic tamen ut brevis, intraq; carnem sit, collyrio uti non debemus, quòd unam partem curet, reliquas omitat: sed eadem medicamenta arida in calamum scriptorium coniicienda sunt, isq; ori fistula aptandus, inspirandumq; ut ea medicamenta intus compellantur. Aut eadem ex vino liquanda. Vel si sordidior fistula est, ex mulso: si callosior, ex aceto sunt, atq; intus infundendum, quicquid

quid inditum est. Superponenda sunt quæ refri-
gerent & reprimant. Nam ferè quæ circa fistu-
lam sunt, habent aliquid inflammationis. Neque
alienum est ubi quis resolverit, antequàm rursus
alia medicamenta coniiciat, per oricularium cly-
sterem fistulam eluere. Si plus puris fertur, vi-
no: si callus durior est, aceto: si iam purgatur,
mulso, vel aqua, in qua eruum coctum sit, sic ut
huic quoque mellis paulum adijciatur. Fere verò fit,
ut ea tunica quæ inter* ferramentum et integram *foramen
carnem est, victa medicamentis tota exeat, in-
fraque; vlceris purum sit. Quod ubi contigit, impo-
nenda glutinantia sunt, præcipueque; spongia mel-
le cocto illita. Neque ignoro multis placuisse, li-
namentum in modum collyrii compositum, tin-
ctum melle demitti. Sed celerius id glutinatur,
quàm impletur. Neque verendum est, ne purum
corpus puro corpori iunctum, non coeat, adiectis
quoque medicamentis ad id efficacibus, cum sæ-
pe exulceratio digitorum, nisi magna cura pro-
speximus, sanescendo in unum eos iungat.

De Meliceria.

Est etiam vlceris genus, quod & à faui si-
militudine μελικερία à Græcis nomina-
tur, idque; duas species habet. Alterum subalbi-
dum furunculo simile, sed maius, & cum dolore
maiore. Quod ubi maturescit, habet foramina
per quæ fertur humor glutinosus, & purulentus,
nec tamen ad iustam maturitatem peruenit. Si
diuisum est, multo plus intus corrupti quàm in
furunc

furunculo apparet, altiusq; descendit. Rarò fit, nisi in scapulis. Alterum est minus super corpus eminens, durum, latum, subviride, subpallidum, magis exulceratum. Siquidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per quæ fertur humor glutinosus subpallidus, crassitudinem mellis, aut visci referens, interdum olei. Si inciditur, viridis intrà caro apparet. Dolor autem, & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoque febrem mouere consuerit. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est, rectè imponi-
 *quod in tur & ficus arida, & lini semen * in mulso co-
 vino co- Etum, & emplastra ac malagmata materiam
 Etum educentia, aut quæ propriè huc pertinentia, supra posui. Super alterum, & ea medicamenta, & farina ex mulso cocta, sic vt ei dimidium resina terebinthina miscèatur, & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & ruae taminie pars quarta fico adiecta. Quòd si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt, totum vlcus vsq; ad sanam carnem excidi oportet, & vlcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt, primum quæ pus citent, deinde quæ purgent, tum quæ impleant.

De Acrochordon, & Thymio, & Myrmecis,
 & Clauo, curationibusq; eorum.

Sunt quedam verò verrucis similia, quorum diuersa nomina, vt vitia sunt. Acrochordona Greci vocant, vbi sub cute coit aliquid durum
 rino

rius, & interdum paulo asperius, coloris eiusdem, infra tenue, ad cutem latius, idq; modicum est, quia raro fabæ magnitudinem excedit. Vix vnum tantum eodem tempore nascitur, sed ferè plura, maximeq; in pueris, eaq; nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. At Thymion nominatur, quod super corpus quasi verrucula eminet, ad cutem tenue, suprâ latius, subdurius, & in summo perasperum. Idq; summum colorem floris thymi representat, vnde ei nomen est, ibiq; facile finditur, & cruentatur, nonnunquam aliquantû sanguinis fundit, fereq; circa magnitudinem fabæ Aegyptiæ est, raro maius, interdum perexiguum, modò vnum, modò autem plura nascuntur, vel in talis, vel palmis, vel inferioribus pedum partibus. Pessima tamen in obscænis sunt, maximeq; ibi sanguinem fundunt. Myrmecia autem vocantur, humiliora thymio, durioraq; quæ radices altius exigunt, maioremq; dolorē mouent, infra lata, super autem tenuia, minus sanguinis mittunt, magnitudine vix vnquam lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoq; aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum. Clauus autem nonnunquam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, præcipuè tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, dolorēq; etiam, si non aliàs, tamē ingredienti mouet. Ex his Acrochordon, siue Thymium sepe

x 2 etiam

etiam per se finiuntur: & quo minora sunt, eo
 magis. Myrmecia & clavi sine curatione vix
 ἀκροχορ-
 δών. unquam desinunt. Acrochordon si excisa est,
 θυμίου. nullam radiculam relinquit, ideoq; ne renascitur
 quidem. Thymio clauoq; excisis subter rotunda
 radícula nascitur, quæ penitus descendit ad car-
 *exit nem, eaq; relicta idem rursus*exigit. Myrme-
 μυρμη-
 κία. cia latissimis radicibus inherens, ideoq; ne ex-
 cidi quidem sine exulceratione magna possunt.
 Clavum subinde deradere commodissimum est.
 Nam sine vlla vi sic emollescit, ac si sanguinis
 quoque aliquid emissum est, sæpe emoritur. Tol-
 litur etiam, si quis eum circumpurgat, deinde im-
 ponit resinam, cui miscuit pulveris paulum, quem
 ex lapide molari contrito fecit. Cetera vero ge-
 nera medicamentis adurenda sunt. Alijsq; id
 quod ex fece vini: myrmecijs id, quod ex alu-
 mine, & sandaraca fit, aptissimum. Sed ea, quæ
 circa sunt, folijs contegi debent, ne ipsa quoque
 exulcerentur. Deinde postea lenticula imponi
 solet. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

De pustularum generibus, & earum
 curationibus.

AT pustule maximè vernis temporibus o-
 riuntur. Earum plura genera sunt. nam
 modò circa totius corpus partem'ue aspreo quæ-
 dam fit, similis his pustulis, quæ ex urtica, vel
 ex sudore nascuntur, ἐξυθρίμια Græci vocant,
 æq; modò rubent, modò colorem cutis non exe-
 dunt.

diunt. Nonnunquam plures similes varis oriuntur, nonnunquam maiores pustulae lividae, aut pallidae, aut nigrae, aut aliter naturali colore mutato, subestque humor. Vbi haec ruptae sunt, infra quasi exulcerata caro adparet, * ἐλκῶδες Graece * φλυκῆς nominatur. Fiunt vel ex frigore, vel ex igni, vel vāe ex medicamentis. Psyracion autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta, ex qua ipsa quod exprimitur humidum est. Ex pustulis vero nonnunquam etiam vlcuscula sunt, aut aridiora, aut humidiora: & modo tantum cum prurigine, modo etiam cum inflammatione aut dolore. Exitque aut pus, aut sanies, aut utrumque. Maximeque id evenit in aetate puerili, raro in medio corpore, saepe in eminentibus partibus. Pessima pustula est, quae ἐπιπυρρῆς vocatur. Ea colore vel sublivida, vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem vehemens inflammatio est, & cum adaperata est, reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est, neque enim ea faba maior est. Atque haec quoque oritur in eminentibus partibus, & ferè noctu. Unde nomen quoque à Graecis ei Epinyctis impositum est. In omni vero pustularum curatione primum est, multum ambulare, atque exerceri. Si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuere, abstinere ab omnibus acerbis, & extenuantibus, eademque nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Præter hæc is qui

iam robustus est, si pustula minuta sunt, desudare in balneo debet, simulq; super eas nitrum inspergere, oleoq; vinum miscere, & sic ungi. Tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si maius pustularum genus occupavit, imponenda lenticula est, detractaq; summa pellicula ad medicamenta lenia transeundum. Epinyctis post lenticulam recte herba quoque sanguinalis, vel viridi coriandro curatur. Ulcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fœni græci mixta, sic, ut his inuicem rosa, atq; intubi succus adijciatur, donec mellis crassitudo fiat. Proprie ad eas pustulas, quæ infantes male habent, lapidis, quem pyriten uocant P. V I I I. ✱, cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adijciunturq; olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustula debent, tum hoc illini.

De Scabie, & eius curatione.

*aliàs, hu
mor cutis
rubicun-
dus

Scabies uerò est, *durior cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciore. Exit ex quibusdam sanies, fitq; ex his continuata exulceratio pruriens, serpitq; in quibusdam citò. Atque in alijs quidem ex toto desinit, in alijs uerò certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eò difficilius tollitur. Itaque eam, quæ talis est, ἀγρία (id est feram) Græci appellant. In hac quoque uictus ratio eadem quæ supra necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est, quod fit ex spodijs, croci, erugi-

nus, singulorū P. I. ✱. piperis albi, omphacū, singulorum P. I. ✱. cadmiæ P. V I I I. ✱. Aut ubi iam exulceratio est, id quod fit ex sulphuris P. I. ✱. cære P. I I I I. ✱. picis liquidæ hemina, olei sextarijs duobus. Quæ simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum autorem refertur. Habet hoc farina lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquidæ heminam, resinæ humidæ selibram, aceti cyathos tres. Crocum quoq; lycium, ærugo, myrrha, cinis, æquis portionibus rectè miscentur, & ex passō coquantur. Idq; omnem pituitam ubiq; sustinet. At si nihil aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, uel sulphur pice liquida mistum, sicut in pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulantur.

De Impetiginis speciebus, & curationibus.

Impetiginis uerò species sunt quatuor. Minimè mala est, quæ similitudine scabiem representat. Nam & rubet, & durior est, & exulcerata est, & roditur. Distat autem ea, quia magis exulcerata est, & uariis similes pustulas habet, uidenturq; esse in ea quasi bullulæ quædam, ex quibus interposito tempore squamulæ resoluntur, certioribusq; hoc temporibus reuertitur. Alterum genus peius est, simile papulæ ferè, sed asperius, rubicundiusq; figuræ uarias habens: squamulæ ex summa cute descendunt, rosio maior est, celerius & latius procedit, certioribusq;

✱ 4

etiam

*discedit

etiam nonnunquam prior temporibus & fit, & desinit, Rubrica cognominatur. Tertia etiamnum deterior est: nam & crassior est, & durior, & magis tumet, in summa cute finditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra procedit, & latè, & tardè eminus serpit. In temporibus aut oritur, aut desinit, neque ex toto tollitur, Nigra cognomen est. Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore: Nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile, squamulasq; habet pallidas, quasdam subalbas, quasdam lenticule similes, quibus demptis, nonnunquam profluit sanguis. Alioqui verò humor eius albidus est, cutis dura, atq; fissa est, proceditq; latius. Hæc verò omnia maxime genera oriuntur in pedibus, & manibus, atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quàm quod ad scabiem quoque pertinere sub autore Protarcho retuli. Serapion autem nitri P. I I. ✱. sulphuris P. I I I I. ✱. excipiebat resina copiosa, eoq; utebatur.

De Papulis, & eius curatione.

Papularum verò duo genera sunt. Altera est in qua per minimas pustulas cutis exasperatur, & rubet, leuiterq; roditur: medium habet pauxillo lenius, tarde serpit: idq; vitium maxime rotundum incipit, eademq; ratione in orbem procedit. Altera autem est, quam ἀγρία, id est, seram Græci appellant. In qua similiter quidem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturq;

turq; ac vehementius & roditur, & rubet, interdum etiam pilos remittit. Quae minus rotunda est, difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginem vertitur: sed levis papula, etiam si ieiuna salina quotidie defricatur, sanescit. Maior commodissimè murali herba tollitur, si sub ea detrita est. Vt verò ad composita medicamenta veniamus, idem illud Protarchi tanto valentius in his est, quanto minus in his vitij est: alterum ad idem Myronis, nitri rubri, thuris, singulorum P. I. *. cantharidum purgatarum P. I. I. *. sulphuris ignem non experti tantundem, resinae terebinthinae liquidæ P. X X. *. farine * lolij semis, gith cyathos tres, picis crudæ * vnum.

* lolij
sext.

De Vitiliginis speciebus, id est, de Alphi, & Melane, & Leuce, & earum curatione.

III.

* sext.

Vitiligo quoque, quamvis per se nullum periculum adfert, tamen fœda est, & ex malo corporis habitu fit. Eius tres species sunt. Ἀλφὸς vocatur, vbi color albus est, ferè subasper, & non continuus, vt quaedam quasi guttae dispersæ esse videantur. Interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. Μέλαις colore ab hoc differt, quia niger est, & umbræ similis. Cætera eadem sunt. Λευὴ habet quiddam simile alphi, sed magis albida est, altius descendit, in eaq; albi pili sunt, & lanugini similes. Omnia hæc serpunt, sed in alijs celerius, in alijs tardius. Alphos & Melas in quibusdam varijs temporibus & oriuntur, &

x 5 desin

desinunt. Leuce quem occupavit, non facile dimittit. Priora curationem non difficilimam recipiunt, ultimum vix unquam sanescit, ac si quid ei vitio demptum est, tamen non ex toto sanus color redditur. Utrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pun-
gi. Si sanguis exit, quod ferè sit in duobus prio-
ribus, remedio locus est: si humor albidus, sana-
ri non potest: itaque ab hoc quidem abstin-
endum est. Super id verò, quod curationem reci-
pit, imponenda lenticula mista cum sulphure &
thure, sic ut ea contrita ex acetos sit. Aliud ad
idem, quod ad Hirenaum autorem refertur, Al-
cyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida pari-
bus portionibus contunduntur, adiecto aceto. His
in sole vitiligo perungitur, deinde non ita multo
post, ne nimis erodatur, eluitur. Propriè quidem
Myrone autore eos, quos Alphos vocari dixi,

hoc medicamento perungunt, sulphuris
*P. 3. a- nitri P. I I I I. *. myrrhæ aridæ contritæ aceta-
luminis scif- bulum miscent, deinde in balneo super vitiligi-
filis P. *. nitri P. *. nem inspergunt farinam ex faba, tum hæc in-
I I I I myr- ducunt. Hi verò quos Melanas vocari dixi, cu-
ti radice co- rantur, cum simul contrita sunt alcyonium,
trita acc- thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo
tab. ante sudorem insperguntur,
tum genus id vitili-
ginis defrica-
tur.

LIB

LIBER VI.

De vitiis singularū corporis partium. CAP. I.
De capillis fluentibus.

DIXI de his vitijis, quæ per totum corpus orientia, medicamentorū auxilia desiderant. Nunc ad ea veniā, quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt, orsus à capite. In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem sæpe radendo succurritur. Adijcit enim vim quandam ad continendum, ladanum cum oleo mistum. Nunc de his capillis loquor, qui post morbum fere fluunt. Nam quo minus caput quibusdam etate nudetur, succurri nullo modo potest.

De Porrigine, & eius curatione. CAP. II.

Porrigo autem est, ubi inter pilos quedam quasi squamula surgunt, eæq; acute resolvuntur, et interdum madent, multo sæpius siccae sunt. Idq; evenit modò sine ulcere, modò exulcerato loco: huic quoq; modò malo odore, modò nullo accidente, fereq; id in capillo fit, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio. Ac neque sine aliquo corporis vitio nascitur, neq; ex toto inutile est. Nam bene integro capite, nō exit. Vbi ali- quod in eo vitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi, quàm id quod nocet, in aliam partem magis necessariam verti. Commodius est ergo subinde pectendo repurgare, quàm id ex toto prohibere. Si ta-

men

men ea res nimium offendit, quod humore sequente fieri potest, magisq; si id etiam mali odoris est, caput saepe radendum est, dein id super adiuuandum aliquibus ex leuiter reprimentibus, quale est nitrum cum aceto, vel ladanum cum myrteo vino, vel myrobalanum cum vino. Si parum per haec proficitur, vehementioribus uti licet, cum eo, ut sciamus, utique in recenti vitio id inutile esse.

De Sycofi, & eius curatione. CAP. III.

Est etiam vlcus, quod à fici similitudine uul-
uosis à Græcis nominatur. Caro excrescit,
& id quidem generale est. Sub eo verò duæ spe-
cies sunt. Alterum vlcus durum, & rotundum
est, alterum humidum, & inaequale. Ex duro exi-
guum quiddam, & glutinosum exit: ex humido
plus: & mali odoris. Fit verò utrumq; in his par-
tibus, quæ pilis conteguntur. Sed id quidem quod
callosum, & rotundum est, maxime in barba. Id
verò quod humidum, præcipue est in capillo. Su-
per utrumq; oportet imponere elaterium, aut li-
ni semen cōtritum, & aqua coactum, aut ficum
in aqua decoctam, aut emplastrum tetraphar-
macum ex aceto subactum, terra quoque ereτρια
ex aceto liquata rectè illinitur.

De Areis, & earum curationibus. CAP. IIII.

Arearum quoq; duo genera sunt. Commune
utriq; est, quod emortua summa pellicula
pili primum extenuantur, deinde excidunt: ac si
ictus is locus est, sanguis exit liquidus, & mali
odoris,

odoris, increfcitq; vtrunq; in alijs celeriter, in alijs tarde. Peius eſt, quod denſam cutem, & ſubpinguē, & ex toto glabram fecit: ſed ea quæ ἀλοπεξία nominatur, ſub qualibet figura dilatatur, fit et in capillo, & in barba. Id verò quod à ſerpentis ſimilitudine ὀφίασις adpellatur, incipit ab occipitio, duorum digitorum latitudinē non excedit, ad aures duobus capitibus ſerpit, quibusdam etiam ad frontem, donec ſe duo capita in priorem partem committant. Illud vitium in qualibet etate eſt, hoc fere infantibus. Illud vix vnquam ſine curatione, hoc per ſe ſæpe finitur. Quidam hæc genera arearū ſcalpello exaſperant. Quidam illinunt adurentia ex oleo, maximeq; chartam combuſtam. Quidam reſinā terebinthinam cum thapſia inducunt. Sed nihil melius eſt, quàm nouacula quotidie radere, quæ cum paulatim ſumma pellicula exciſa eſt, adaperiuntur pilorum radícula. Neq; antè oportet deſiſtere, quàm frequentem pilum naſci adparuerit. Id autem, quod ſubinde raditur, illini atramento ſcriptorio ſatis eſt.

De Varis, & Lenticulis, & Ephelide, & eorum curationibus.

C A P. V.

PEnè ineptia ſunt, curare Varos, & Lenticulas, & Ephelidas. Sed eripi tamē ſœminis cura cultus ſui non poteſt. Ex his autē quas ſuprà poſui, Vari, Lenticulaq; vulgo notæ ſunt, quamvis rarior ea ſpecies eſt, quàm ξέγιον Græci vocant, cū ſit ea Lenticula rubicundior, & inæqua

inequalior. Ephelis verò à plerisque ignoratur, quæ nihil est, nisi asperitas quædam, & durities mali coloris. Cætera non nisi in facie, Lenticula etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. De qua per se scribere alio loco, visum operæpretium non est. Sed Vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non minus quàm ipsa est, aluminis scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum pares portiones habent, contritaq; ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum, & interpositis pluribus horis mane eluendum est, oleoq; leuiter unguendum. Ephelidem tollit resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia verò ista, atque etiam ad colorandas cicatrices potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem autorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, *magmatis, cretæ cimolice subceruleæ, nucum amararum, farine hordei, atque erui, struthij albi, fertule campanæ seminis. Quæ omnia contrita, melle quàm amarissimo coquuntur, illitumq; à vespere usq; mane eluitur.

De oculorum morbis, curationibusque eorum,
& primo de his morbis, qui lenibus medicamentis curantur.

CAP. VI.

Sed hæc quidem mediocria sunt. Ingentibus verò, & varijs casibus oculi nostri patent. Qui cum magnam partem ad vitæ simul & usum,

usum, et dulcedinē conferant, summa cura tuendi sunt. Protinus autem orta lippitudine quædā notæ sunt, ex quibus quid euenturum sit, colligere possimus. Nam simul ac lacryma, & tumor, & crassa pituita cœperint, si ea pituita lacrymæ mixta est, & ea lacryma calida est, pituita verò alba, & mollis, tumor non durus, longæ valetudinis metus non est. At si lacryma multa, & calida, pituita paulum, tumor modicus, idq; in vno oculo est, longum id, sed sine periculo futurum est. Idq; lippitudinis genus minime cum dolore est, sed vix ante vigesimum diem tollitur, nonnunquā per duos menses durat, sed quandoq; finitur. Si pituita alba et mollis esse incipit, lacrymæq; miscentur, aut si simul hæc utrumque oculum inuaserunt, potest esse breuior, sed periculum vlcera est. Pituita autem sicca & arida dolorem quidem mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulcerauit. Tumor magnus si sine dolore est & siccus, sine vlllo periculo est. Si siccus quidem, sed cum dolore est, ferè exulcerat, & nonnunquam ex eo casu fit, vt palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris pupillis'ue est, vbi super magnum dolorem lacrymæ salsa, calidæq; eunt, aut etiam si tumore infinito diu lacryma cum pituita profuit. Peius etiamnum est, vbi pituita calida, aut linida est, lacryma calida aut multa profuit, caput calet, à temporibus ad oculos dolor peruenit, nocturna vigilia vrget. Siquidem sub
his

his oculus plerūq; rumpitur, votumq; est, vt tantum exulceretur. Intus ruptum oculum febricula inuat. Si foras iam ruptus procedit, sine auxilio est. Si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. At si asperum crassum est, etiam post curationem vestigium aliquod relinquit. Curari verò oculos sanguinis detractione, medicamēto, balneo, vino, vetustissimus autor Hippocrates memoriae prodidit. Sed eorum tempora, & causas parum explicuit, in quibus Medicinae summa est. Neque minus in abstinentia, & alui ductione saepe auxilij est. Hos igitur interdum inflammatio occupat, vbi cum tumore in his dolor est, sequiturq; pituitae cursus nonnunquam copiosior vel acrior, nonnunquam vtraq; parte moderatior. In eiusmodi casu prima omnium sunt, quies & abstinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet, sic vt à sermone quoque abstineat. Nullum cibum assumere, si fieri potest, ne aquam quidem: sin minus, certè quàm minimum eius. Quòd si graues dolores sunt, commodius secundo die, si tamen res vrget, etiam primo sanguis mittendus est, vtique si in fronte venae tument, si firmo corpori materia superest. Si verò minor impetus, minus acrem curationem requirit, aluum, sed non nisi secundo, tertio, ne die duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat. Satisq; est vti quiete, & abstinentia. Neque tamen in lippientibus longum ieiunium necessarium est, ne pituita

tenuior atque acrior fiat. Sed secundo die dari debet id, quod leuissimum videri potest ex his, quæ pituitam faciunt crassiorem, qualia sunt oua sorbilia. Si minor vis vrget, pulticula quoque, aut panis ex lacte. Insequentibus diebus, quantum inflammationi detrahetur, tantum adijci cibus poterit. Sed generis eiusdem, utique ut nihil salsum, nihil acre, nihil ex his, quæ extenuant, sumatur, nihil potui præter aquam. Et victus quidem rationalis maxime necessaria est. Protinus autem primo die croci P. I. ✱. & farinae candidæ quàm tenuissimæ P. II. ✱. excipere oportet oui albo, donec mellis crassitudinem habeat, idq; in linteolum illinere, & fronti agglutinare, ut compressis venis pituitæ impetum cohibeat. Si crocum non est, thus idem facit. Linteolo an lana excipiatur, nihil interest. Super inungi verò oculi debent, sic ut croci quantum tribus digitis comprehendere potest, sumatur: myrrhæ ad fabæ, papaueris lacrymæ ad lenticulæ magnitudinem, eaq; cum passo conterantur, & specillo super oculum inducantur. Aliud idem: Myrrhæ P. I. ✱. mandragoræ succi P. II. ✱. papaueris lacrymæ P. II. ✱. foliorum rosæ, cicutæ seminis, singulorum P. III. ✱. acaciæ P. III. ✱. gummi P. V. III. ✱. Et hæc quidē interdiu. Noctu verò, quò commodior quies veniat, non alienum est superimponere candidi panis interiorē partem ex vino subactam. Nam & pituitam reprimat,

y

& si

& si quid lacrymæ processit, absorbet, & oculum glutinari non patitur. Si graue id, & durum propter magnum oculorum dolorem videtur, oui & album, & vitellus in vas defundendum est, adiiciendumq; eo mulsi paulum, idq; digito permiscendum. Vbi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene carpta, quæ id excipiat, superq; oculos imponi. Ea res & leuis est, & refrigerando pituitam coërcet, & non exarescit, & glutinari oculum non patitur. Farina quoque ordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mixta, commodè imponitur. Neque ab ratione abhorret etiam penicillo potissimum vti expresso: si leuior impetus est, ex aqua: si maior, ex posca. Priora fasciæ deliganda sunt, ne per somnum cadant, & hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso commodè potest: & cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, vt somnum diu prohibeat, eorum aliquid dandum est, quæ ἀνωδιὰ Græci vocant. Satisq; est puero, quod erui, viro quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum verò oculum primo die, **modica si *immodica inflammatio est, nihil rectè conijcitur.* Sæpe enim potius concitatur eo pituita, quàm minuitur. A' secundo die graui quoque lippitudini per indita medicamenta rectè succurritur, vbi vel iam sanguis missus, vel alius ducta est, aut vbi neutrum necessarium esse, manifestum est.

De

De diuersis oculorum collyriis.

Multa autem malorumq; autorum collyria ad id apta sunt, nouisq; etiā nunc misturis temperari possunt, cum lenia medicamenta & modice reprimētia, facile & varie misceantur. Ergo nobilissima exequar.

Philonis collyrium.

Est igitur Philonis, quod habet cerussæ elotæ, spodij, gummi, singulorum P. I. ✱. papaueris lacrymæ combustæ P. I. ✱. Illud scire oportet, hic quoque omnia medicamenta, singula primum per se teri, deinde mista, iterū adiecta paulatim vel aqua vel alio humore: gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime præstare, ut ubi collyria facta inaruerunt, glutinata sint, neq; frientur.

Gummi.

Dionysii collyrium.

Dionysij verò collyrium est, papaueris lacrymæ combustæ, donec tenerescat, P. I. ✱. thuris combusti, gummi, singulorū P. I. I. ✱. spodij P. I. I. I. I. ✱.

Cleonis collyrium.

Cleonis nobile admodum, papaueris lacrymæ frictæ P. I. ✱. croci P. I. ✱. gummi P. I. ✱. quibus cum teruntur, adijcitur rosæ succus. Aliud eiusdē valentius: Squamæ æris quod Σόμωμα appellant, P. I. ✱. croci P. I. I. ✱. spodij P. I. I. I. I. ✱. plumbi & eloti, & combusti P. VI. ✱. gummi tantundem. Eius aliud quoque ad idem est, maxime ubi multa pituita profluit. Castorei P. ✱. 3. aloës P. L. ✱. croci ✱ P. L. ✱. ✱. P. X. I.

γ 2

myrr

myrrhæ p. i i. *. lycij p. i i i. *. cadmiæ cura-
 te p. v i i i. *. stibis tantundem, acaciæ succi
 p. x i i. *. quod cum gummi miscuit, liqui-
 dum in pixidicula seruatur. Theodotus verò
 huic cōpositioni adiecit papaueris lacrymæ com-
 *aliàs: nu bustæ p. *. eris combusti & eloti p. i i. *. *nu-
 cleos pal- cleorum palmarum combustorum p. x. *. gum-
 marū cō- mi p. x i i. *.

bustos nu Theodoti collyrium, Acharstom appellatum.
 mero x.

A T ipsius Theodoti, quod à quibusdā ἀχά-
 ριστον nominatur, eiusmodi est. Casto-
 *p. ii. rei, nardi indici, singulorum p. i. *. lycij * p. *.
 papaueris lacrymæ tantundem, myrrhæ p. i i. *.
 croci, cerussæ elotæ, aloës, singulorum p. i i i. *.
 cadmiæ botryodis elotæ, eris combusti, singulo-
 *p. xviii rum p. v i i i. *. gummi * p. v i i i. *. acaciæ suc-
 ci p. x x. *. stibis tantundem, quibus aqua plu-
 uialis adijcitur.

Cythion vel Tephron collyrium.

P Ræter hæc ex frequentissimis collyrijs est
 id, quod quidam Cythion, quidam à cine-
 reo colore Tephron appellant, amyli, tragacan-
 thæ, acaciæ succi, gummi, singulorum p. i. *. pa-
 *p. viii. paueris lacrymæ p. i i. *. cerussæ elotæ * p. i i i i.
 spumæ elo *. spumæ elotæ p. v i i i. Quæ aque ex aqua plu-
 tæ p. xiiii uiali conteruntur.

Euclidis collyrium, Trygodes nominatum.

E Velpides autem qui etate nostra maximus
 fuit ocularius medicus, utebatur eo, quod
 ipse cōposuerat, Trygodes nominabat: Castorei

p. i i.

P. I I . * . l y c i j , n a r d i , p a p a u e r i s l a c r y m a , s i n g u l o -
 r u m P . I . * . c r o c i , m y r r h a , a l o e s , s i n g u l o r u m P .
 I I I I . * . a r i s c o m b u s t i * P . V I I I . * . c a d m i a , & P . V I I I I
 s t i b i s , s i n g u l o r u m P . X I I . * . a c a c i a s u c c i P .
 X X V I . * . g u m m i t a n t u n d e . Q u o g r a u i o r v e r o
 q u a e q ; i n f l a m m a t i o e s t , e o m a g i s l e n i r i m e d i c a -
 m e n t u m d e b e t , a d i e c t o v e l a l b o o u i , v e l m u l i e b r i
 l a c t e . A t s i n e q u e m e d i c u s , n e q ; m e d i c a m e n t u m
 p r a e s t o e s t , s e p i u s v t r u m l i b e t h o r u m i n o c u l i s p e -
 n i c i l l o a d i p s u m f a c t o i n f u s u m , i d m a l u m l e n i t .
 V b i v e r o a l i q u i s r e l e u a t u s e s t , i a m q ; c u r s u s
 p i t u i t a c o n s t i t i t , r e l i q u i a s f o r t a s s e l e n i o r e s f u -
 t u r a s d i s c u t i u n t b a l n e u m & v i n u m . I g i t u r l a -
 u a r i d e b e t l e u i t e r , a n t e e x o l e o p e r f r i c a t u s , d i u -
 t i u s q ; i n c r u r i b u s & f e m i n i b u s , m u l t a q ; c a -
 l i d a a q u a f o u e r e o c u l o s , d e i n d e p e r c a p u t p r i u s
 c a l i d a , t u m e g e l i d a p e r f u n d i , a b a l n e o c a u e -
 r e , n e q u o f r i g o r e a f f l a t u ' u e l a d a t u r : p o s t h a c
 c i b o p a u l o p l e n i o r e , q u a m e x e o r u m d i e r u m
 c o n s u e t u d i n e , v t i : v i t a t i s t a m e n o m n i b u s p i -
 t u i t a m e x t e n u a n t i b u s . V i n u m b i b e r e l e n e , s u b -
 a u s t e r u m , m o d i c e v e t u s , n e q u e e f f u s e n e q u e
 t i m i d e , v t n e q u e c r u d i t a s e x e o , & t a m e n
 s o m n u s f i a t , l e n i a n t u r q ; i n t u s l a t e n t i a a c r i a .
 S e d s i q u i s i n b a l n e o s e n s i t m a i o r e m o c u l o r u m
 p e r t u r b a t i o n e m q u a m a t t u l e r a t , q u o d i n c i d e -
 r e h i s s o l e t , q u i m a n e n t e a d h u c p i t u i t a c u r s u
 f e s t i n a r u n t , q u a m p r i m u m d i s c e d e r e d e b e t , n i -
 h i l e o d i e v i n i a s s u m e r e , c i b i m i n u s e t i a m q u a m
 p r i d i e . D e i n d e c u m p r i m u s a t i s p i t u i t a s u b s t i t i t

iterum ad usum balnei redire. Solet tamen euenire nonnunquam siue tempestatum vitio, siue corporis, ut pluribus diebus neq; dolor, neq; inflammatio, & minimè pituitæ cursus finiatur. Quod ubi incidit, iamq; ipsa vetustate res matura est, ab his eisdem auxilium petendum est, id est balneo ac vino. Hæc enim ut in recentibus malis aliena sunt, quia concitare ea possunt, & accendere, sic in veteribus quæ nullis alijs auxilijs cesserunt, admodum efficacia esse consuerunt. Videlicet hic quoq; ut alibi, cum secunda vana fuerint, contrarijs adiuuantibus. Sed antè tonderi ad cutem conuenit. Deinde in balneo aqua calida quàm plurima caput atq; oculos fouere, tum utrunq; penicillo detergere, & ungere caput irino vnguento: continereq; in lectulo se, donec omnis calor qui conceptus est, finiatur, desinatq; sudor, qui necessario in capite collectus est. Tum ad idem cibi viniq; genus veniendum est sic, uti potiones meracæ sint, obtegendumq; caput, et quiescendum. Sæpe enim post hæc grauis somnus, sæpe sudor, sæpe alui deiectio pituitæ cursum finit. Si leuatum malum est, quod aliquanto sæpius fit, per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas restituatur. Si diebus eisdem alius nihil reddit, ducenda est, quo magis superiores partes leuentur. Nonnunquam autem ingens inflammatio tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat. $\pi\gamma\omicron\pi\omega\sigma\iota\pi$ id, quoniam oculi procidunt, Græci appellant. His utiq;

vtiq; si vires patinuntur, sanguinem mitti: si id fieri non potest, aluum duci, longioremq; in diem indici necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoq; Cleonis collyrio quidam quod ex duobus antè positum est, vtuntur. Sed optimum est Nilei. Neq; de vlllo magis inter omnes autores conuenit.

Nilei collyrium omnium optimum.

ID habet nardi Indici, papaueris lacryma, singulorum P. I. *. gummi P. I. *. croci P. II. *. foliorum rose recetium P. IIII. *. Quæ vel aqua pluuiatili, vel vino leni subaustero coguntur. Neq; alienum est malicorium, vel fertulam campanam ex vino coquere, deinde conterere, aut myrrham nigram cum rose folijs miscere, aut hyoscyami folia, cum oui cocti vitello, aut farinam cum acacie succo, vel passo, aut mulso. Quibus si folia quoq; papaueris adiunguntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo præparato, penicillo fovere oculos oportet, ex aqua calida expresso: in qua antè mel myrti vel rose folia decocta sint. Deinde ex illis aliquid imponi. Præter hæc ab occipitio incisa cute, cucurbitula admoenda est. Quod si per hæc restitutus oculus in sedem suam non est, eodemq; modo prolapsus permanet, scire oportet, lumen esse amissum. Deinde futurum, vt inarescat is, aut in pus vertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo qui propior tempore est, incidi oculus debet: vt effuso pure et inflammatio, ac dolor finiatur, & intus tunica res-

y 4 dant,

dant, quo minus fœda postea facies sit. Utendum deinde vel iisdem collyrijs est ex lacte, aut ouo, vel croco, cui album oui misceatur. Ac si induit & sic emortuus est, ne in pus verteretur, quatenus fœde prominebit, excidendum erit, sic ut hamo summa tunica apprehendatur: infra id deinde scalpellus incidat, tātundem medicamenta erunt coniicienda, donec omnis dolor finiatur. Iisdem medicamentis in eo quoq; oculo utendum est, qui primum procidit, deinde per plura loca fixus est.

De carbunculis oculorum, & eorum curatione.

Solent etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnunquam in ipsis oculis, nonnunquam in palpebris: & in his ipsis oculis modo ab interiore, modo ab exteriori. In hoc casu alius ducenda est, cibus minuendus, lac potui dandum, ut acria quæ læserunt, leniantur. Quod ad cataplasmata & medicamenta pertinet, his utendum, quæ aduersus inflammationes proposita sunt. Atq; hic quoq; Nilei collyrium optimum est: si tamen carbunculus in exteriori palpebræ parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini semen, ex mulso coctum: aut si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

De pustulis oculorum & curatione earum.

Pustulæ quoq; ex inflammationibus interdum oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit, magis etiam seruanda sunt, quæ de sanguine

sanguine, et quiete supra posui. Sin serius quam
ut sanguis mitti possit, alius tamē ducenda est.
Si id quoq; aliqua res inhibet, utiq; victus ratio
seruanda est. Medicamentis autem hic quoq; le-
nibus opus est, quale Nilei, quale Cleonis est.

*Philetis collyrium, ad pustulas oculorum.

*φιλαι-

ID quoq; quod *Philetis vocatur, huic aptum
est, Myrrhae, papaueris lacrymae, singulorum
P. I. *. plumbi eloti, terrae samiae, quae ἀσινγ vo-
catur, tragacanthae, singulorum P. IIII. *. sti-
bis cocti, amyli singulorum P. XVI. *. spodij elo-
ti, cerussae elotae, singulorum P. VIII. *. Quae a-
qua pluuiiali excipiuntur. Usus collyrij, vel ex
ouo, vel ex lacte est.

λκθς.

*Philale-

thos

De ulceribus oculorum, & eorum curatio-
ne, & de διαβαλαν collyrio.

EX pustulis vlcera interdum fiunt, eaq; re-
centia aque lenibus medicamentis nutrien-
da sunt, & iisdem fere quae supra in pustulis
posui. Fit quoq; proprie ad haec quod *diabalanu
vocatur. Habet aeris combusti & eloti papae-
ris lacrymae frictae, singulorum P. I. *. spodij elo-
ti, thuris, stibis combusti & eloti, myrrhae, gum-
mi, singulorum P. II. *.

*δια βα-

λανον

Curatio oculorum aliquo casu imminutorum.

Venit etiam, ut oculi vel ambo, vel singuli,
minores fiat, quam esse naturaliter debeant.
Idq; & acer pituitae cursus in lippitudine effi-
cit, & continuati fletus, & ictus parum bene
curati. In his quoq; iisdem lenibus medicamentis

ex muliebri lacte utendum est. Cibi verò his qui maxime corpus alere, & implere consue-
runt. Vitandaq; omni modo caussa, quæ lacry-
mas excitet, curaq; domesticorum, quorum etiam
si quid tale incidit, eius notitiæ subtrahendum:
atq; acria quoq; medicamenta, et acres cibi non
alio magis nomine his nocent, quàm quòd lacry-
mas mouent.

De pediculis palpebrarum.

Genus quoq; vitij est, qui inter pilos pal-
pebrarum pediculi nascuntur. Id $\phi\theta\epsilon\gamma\acute{\iota}\alpha\sigma\iota\upsilon$
Greci nominant. Quod cum ex malo corporis
habitu fiat, raro nò vltra procedit. Sed fere tem-
pore interposito, pituitæ cursus acerrimus sequi-
tur, exulceratisq; vehementer oculis, aciem quoq;
ipsam corrumpit. His aluus ducenda, caput ad
cutem tondendum, diuq; quotidie ieiunis perfri-
candum. His, ambulationibus, alijsq; exercita-
tionibus diligenter utendum, gargarizandumq;
ex mulso, in quo nepeta & pinguis ficus deco-
cta sit: sepe in balneo multa calida aqua fuen-
dum caput. Vitandi acres cibi, lacte vinoq; pin-
gui utendum, bibendumq; liberalius quàm eden-
dum est. Medicamenta verò intus quidem le-

* aliàs, nia danda sunt, *ne acriorem pituitam conci-
ne acio- tent. Super ipsos verò pediculos alia, quæ neca-
res pitui- re eos et prohibere ne similes nascantur, possint.
te conci- Ad idipsum spuma nitri P. I. *. sandaracæ P. I.
tentur. *. vna taminiæ P. *. I. simul teruntur, adijci-
turq; vetus oleum pari portione, atq; acetum, do-

nec

nec ei mellis crassitudo sit.

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & validioribus medicamentis curantur, & de Andreae collyrio, & de *diacerato.

HActenus oculorum morbi lenibus medicamentis *nutriuntur. Genera deinde alia ^{*dià né-} ^{gæ/θ.} ^{*curatur} sunt, quæ diuersam curationē desiderant, fereq; ex inflammationibus nata sunt, sed finitis quoq; his manentia. Atq; in primis in quibusdam perseuerat tenuis pituitæ cursus, quibus alius ab inferiore parte euocanda est, demendum aliquid ex cibo. Neq; alienum est illini frontem compositione Andreae. Quæ habet gummi P. I. *cerussæ, stibis, singulorum P. I I. *. spumæ argenti & coctæ, & elotæ P. I I I. *. Sed & ea spuma ex aqua pluuiali coquitur, & arida hæc medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita frōte, cataplasma quoq; supèr injiciendum ex farina, quæ frigida aqua coacta sit, cuiq; aut acaciæ succus, aut cupressus adiecta sit. Cucurbitula quoq; , inciso vertice, recte accommodatur, aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi verò eo debet quod habet squamæ aris, papaueris lacrymæ, singulorum P. *. ceruini cornu combusti & eloti, plumbi eloti, gummi, singulorum P. I I I I. *. thuris P. XII. *. Hoc collyrium quia cornum habet, ^{*dià né-} ^{gæ/θ.} ^{*curatur} nominatur. Quotiescunque non adiicio quod genus humoris adijciendum sit, aquam intelligi volo.

Memigmenon, Euclpidis collyrium.

Ad

AD idem Euelpidis, quod *μεμυμένον* nominabat. In eo papaveris lacryma, & albi piperis, singula vncia sunt, gummi libra, aris combusti P. I. *. Inter has autem curationes, post intermissionem aliquā profunt balneum & vinum. Cumq; omnibus lippientibus vitandi cibi sunt, qui extenuant, tum præcipue quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum, quæ pituitam crassiorem reddunt, sicut in hoc genere materiae maxime promptum est, confugiendum est ad ea, quæ quia ventrem, corpus quoq; astringunt.

De oculorum ulceribus supercrefcentibus, sordidis, canis, veteribus, & curationibus singulorum.

AT ulcera si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrefcentia, aut sordida, aut caua, aut certe vetera esse consuerunt. Ex his supercrefcentia collyrio, quod *Μεμίγμενον* vocatur, optime reprimuntur. Sordida purgantur & eodem, & eo quod *Smilion* nominatur.

Smilion collyrium.

Habet æruginis P. I I I. *. gummi tantundem, ammoniaci, minij sinopici, singulorū P. X V I. *. Quæ quidam ex aqua, quidam, quo vehementiora sint, ex aceto terunt.

Phynon collyrium Euelpidis.

* Aliàs, **I**D quoq; Euelpidis, quod * *Phynona* adpellabat, huic vtile est: Croci P. I. *. papaveris lacryma, gummi, singulorum P. I I. *. aris combusti et eloti, myrrhæ, singulorū P. I I I. *. piperis albi P. V I. *

P.VI.*. Sed ante linitum hoc rringendum est.

Sphæron collyrium Euelpidis.

ID quoq; eiusdem, quod Sphæron nominabat,
eodem valet. Lapidis hæmatitis eloti P. II.*.
piperis grana sex, cadmiæ elotæ, myrrhæ, papa-
ueris lacrymæ, singulorum P. III.*. croci P. IIII.
. gummi P. VII.. Quæ cum vino amineo
conteruntur.

Liquidum Euelpidis collyrium.

Liquidum quoque medicamentum ad idem
componebat, in quo erant hæc, æruginis P.
*. minij combusti, atramenti sutorij, cinamomi,
singulorum P. III.*. croci, nardi, papaueris la-
crymæ, singulorum P. I.*. myrrhæ P. II.*. aris
combusti P. III.*. cineris ex odoribus P. IIII.*.
piperis grana *xv. Hæc ex vino austero terun- *v.
tur: deinde cum passi tribus heminis decoquun-
tur, donec corpus vnum sit. Idq; medicamentum
vetustate efficacius fit.

De cauis oculorum vlceribus, & curationibus.

CAua verò vlcera commodissime implent
ex his quæ suprâ posita sunt, Sphæron, &
id quod *Philetis vocatur. Idem Sphæron ve- *aliàs,
tustis vlceribus, & vix ad cicatricem venien- Philale-
tibus optime succurrit. tis, φιλᾶ-
λῆς

Hermonis collyrium.

Est etiam collyrium quod cum ad plurava-
leat, plurimum tamen proficere in his vlce-
ribus videtur. Refertur ad Hermonem autorem,
habet piperis longi P. I.3.*. albi* P.*. cinnamo- *P. v.
mi, costi, singulorum P. I.*. atramenti sutorij,
nardi,

nardi, casie, castorei singulorum P. II. *. galle
P. V. *. myrrhæ, croci, thuris, lycij, cerussæ, singu-
lorum P. V. I. I. *. papaveris lacrymæ P. XII. *.
aloës, aris combusti, cadmiæ, singulorum P. XVI.
*. acaciæ, stibis, gummi, singulorum P. XXV. *.

De cicatricibus oculorum, quæ ex ulceribus fa-
ctæ sunt, & quomodo curari debeant,
& de Asclepia, & Canopite &

Pyxino, collyrijs.

Factæ verò ex ulceribus cicatrices, duo-
bus vitij periclitantur, ne aut caue, aut
crassæ sint. Si caue sunt, potest eas implere, id
quod sphaerion vocari dixi, vel id quod Ascle-
pias nominatur. Habet papaveris lacrymæ P. II.
*. sagapeni, opopanax, singulorum P. III. *. e-
ruginis P. I. I. I. *. cumini P. V. I. I. *. piperis
P. X. I. *. cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum P.
XV. I. *. At si crassæ cicatrices sunt, extenuat
vel Smilion, vel Canopitæ collyrium quod habet
cinamomi, acaciæ, singulorum P. I. *. cadmiæ e-
lotæ, croci, myrrhæ, papaveris lacrymæ, gummi,
singulorum P. I. I. *. piperis albi, thuris, singulo-
rum P. III. *. aris combusti P. I. X. *. cum aqua
pluviali. Vel Euelpidis Pyxinum, quod ex his
constat: Salis fossilis P. III. *. ammoniaci, thy-
miamatis P. VIII. *. papaveris lacrymæ P. XII.
* aliàs, *. cerussæ P. XV. *. piperis albi, croci siculi, * sin-
singulorum P. LII. *. gummi P. XIII. *. cadmiæ
XXXI. elotæ P. IX. *. Maxime tollere cicatricem vide-
tur, id quod habet gummi P. I. I. I. *. eruginis
P. I. *. crocomagmatis P. III. *.

De

De alio genere inflammationis oculorum.

Est etiam genus inflammationis, in qua si cui tument ac distenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte emitti necessarium, multaq; aqua calida caput atq; oculos fouere, gargarizari ex lenticula, vel ex fici cremore, inungi acribus medicamentis, quæ supra cōprehensa sunt, maximeq; eo quod Sphæron nominatur, quod lapidem hæmatiten habet. Atq; alia quoq; vtilia sunt, quæ ad extenuandā aspritudinem sunt, de qua protinus dicam. Hanc autem inflammatio oculorum fere sequitur, interdum maior, interdum leuior, nōnunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit, deinde aspritudinē ipsam auget, fitq; ea in alijs brevis, in alijs longa, & quæ vix vnquā finiat. In hoc genere valetudinis quidam crassas durasq; palpebras, & ficulneo folio & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt, versasq; quotidie medicamentis suffricant. Quæ neq; nisi in magna vetustaq; aspritudine, neq; sæpe faciēda sunt. Nam melius eōdem ratione victus & idoneis medicamentis peruenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore, multaq; oculorum palpebras aqua calida fovebimus. Cibos autem sumemus acres, & extenuantes.

Cæsarianum collyrium.

AT medicamentum id quod Cæsarianum vocatur, habet atramenti sutorij P. I. ✕. misyos

misfyoſ p. *. piperis albi p. v. *. papaueris lacry-
mæ, gummi, ſingulorum p. ii. *. cadmiæ lotæ p.
iii. *. ſtibis p. vi. *. Satisq; conſtat, hoc colly-
rium aduerſus omne genus oculorum valetudi-
* Aliàs, niſ idoneum eſſe, exceptis hiſ quæ lenibus * nu-
curantur triuntur.

Hieracis collyrium.

ID quoq; quod Hieracis nominatur, ad aſpri-
tudinem poteſt: Habet myrrhæ p. i. *. am-
moniaci, thymiamatis p. ii. *. æruginis ræſæ p.
iii. *. cum aqua pluuiatili. Ad idem idoneum
eſt etiam id quod Canopite eſt, & id quod Smi-
lion vocatur, & id quod pyxinum, & id quod
Sphærimon. Si compoſita medicamēta non adſunt,
felle caprino, vel quàm optimo melle ſatis com-
mode aſpritudo curatur.

De Xerophthalmia, genere aridæ lippitudinis.

Eſt etiam genus aridæ lippitudinis, ἕγγοφ-
δαλμία Græci appellant: neq; tument,
neq; fluunt oculi, ſed rubent tantum, & cū dolo-
re quodam graueſcunt, et noctu prægravi pitui-
* inhære- ta * maleſcunt: quantoq; minor generis huius im-
ſcunt petus, tanto ſiniſ minus expeditus eſt. In hoc
vitio multum ambulare, multum exerceri, lauari
ſæpe, ibiq; deſudare, multaq; frictione vti neceſ-
ſarium eſt. Cibi neq; qui implent, neq; nimium
acres apti ſunt, ſed inter hoſ medij. Mane vbi
concoxiſſe manifeſtum eſt, non alienum eſt ex
* Aliàs, ſinapi gargariſare, tum deinde caput atque os
deſfricare diutius * perfricare.

Rhinion

leuant & mel & vinum. Succurritq; & his,
& aridæ lippitudini, si quis panem ex uino sub-
actum super oculum imponit. Nam cum fere sit
humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo
angulos, aut palpebras exasperat, sic, & si quid
prodit humoris, extrahitur, & si quid iuxta
est, repellitur.

Ad Caligationem oculorum, quæ propter lippi-
tudinem oritur, remedia & collyria.

CAligare verò oculi nonnunquam ex lip-
pitudine, nonnunquam etiam sine hac pro-
pter senectutem, imbecillitatem'ue aliam consue-
runt. Si ex reliquijs lippitudinis id vitium est,
adiuuat collyrium, quod Asclepias nominatur.
Adiuuat id quod ex crocomagmate fit.

diæ xpo's collyrium.

Propriè etiam ad id componitur, quod diæ
xpo's vocant: habet piperis P. I. *. croci
cilicis, papaueris lacrymæ, cerussæ, singulorum P.
I I. *. psorici, gummi, singulorum P. I I I I. *.

Ad caligationem oculorum, quæ propter sene-
ctutem, aut aliam imbecillitatem fit.

AT si ex senectute, alia'ue imbecillitate id
est, recte iungi potest, & melle quàm
optimo, & cyprino, & oleo vetere. Commodis-
simum tamen est, balsami partem vnâ, & olei
veteris, aut cyprini partes duas, mellis quàm a-
cerrimi partes tres miscere. Vtilia quoque huic
medicamenta sunt, quæ ad caliginem proximè,
quæq; ad extenuandas cicatrices supra compre-
hensa sunt. Cuicunq; verò oculi caligabunt, huic
opus

opus erit multa ambulatione atque exercitatione, frequenti balneo, ubi totum quidem corpus perfricandum est, precipue tamē caput, & quidem irino, donec insudet, velandumq; postea, nec detegendum antequam sudor & calor domi conquierint. Tum cibus utendum acribus, & extenuantibus, interpositisq; aliquibus diebus, ex sinapi gargariandum.

De suffusione oculorum.

Suffusio quoque (quam Græci *ὑπόχυσιν* nominant) interdum oculi^{*} potentia, qua cer-^{*pituita} nit, se opponit. Quod si inueterauerit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam etiam certis observationibus discutitur. Sanguinē ex fronte vel naribus mittere, in tēporibus venas adurere, gargariando pituitam euocare, suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. Victus optimus est, qui pituitam extenuat.

De resolutione oculorum, quæ Paralysis dicitur.

Acne resolutio quidem oculorum, quam *παράλυσιν* Græci nominant, alio victus modo, vel alijs medicamentis curanda est. Exposuisse tantum genus vitij satis est. Igitur interdum euenit, modo in altero oculo, modo in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione neruorū, qua vehementer oculus ipse concussus est, ut his neque quam intendi possit, nec omnino consistat: sed huc illuc ne sine ratione moueatur, ideoq; ne conspectum quidem rerum præstet.

De Mydriasi oculorum.

Non multum ab hoc malo distat id, quod *μυδρίασις* Græci vocant. Pupilla effunditur & dilatatur, aciesq; eius hebescit: ac penè difficilime genus id imbecillitatis eliditur. In utraq; verò, id est, & paralyti & mydriasi, pugnandum est per eadem omnia, quæ in caligine oculorum præcepta sunt, paucis tantum mutatis: siquidem ad caput irino interdum acetum, interdum nitrum adiiciendum est, melle inungi satis est. Quidam in posteriore vitio calidis aquis vsi releuatiq;. Quidam sine vlla manifesta caussa subito obcecati sunt. Ex quibus nonnulli cum aliquandiu nihil vidissent, repentina profusione alui lumen receperunt. Quo minus alienum videtur, ex recenti re & interposito tempore medicamentis quoq; moliri deiectiones, quæ omnem noxiam materiam in inferiora depellant.

De imbecillitate oculorum.

Preter hæc imbecillitas oculorū est, ex qua quidem interdū satis, noctu nihil cernunt, quod in fæminam bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet *aliàs, hu tet * sanguine iocinoris, maxime hircini: si minore iocinoris, caprini: ubi id assum coquitur, excepto: cin. atq; edi quoque ipsum iecur debet. Licet tamen etiam iisdem medicamentis non inutiliter uti, quæ vel cicatrices, vel aspritudinem extenuant: quidam contritò semine portulacæ mel adiiciunt, eatenus ne id ex specillo distillet, eoq; inungunt.

Exerc

Exercitationibus, balneo, frictionibus, gargarizationibus iisdem, his quoq; vtendum est.

Ad oculos, qui extrinsecus offenduntur, cum sanguine suffusi sunt.

E*Thæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus verò interdum si ictus oculum ledit, vt sanguis in eo suffundatur, nihil commodius est, quam sanguine vel columbæ, vel palumbi, vel hirundinis inungere. Neque id sine causa fit, cum horum acies extrinsecus lesa interposito tempore in antiquum statum redeat, celeberrimeq; hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, aut per parentes, aut id herba chelidonia restitui, quod per se sanescit. Eorū ergo sanguis nostros quoq; oculos ab externo casu commodissime tuetur, hoc ordine, vt sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minime efficax columbæ & illi ipsi, & nobis. Supra percussum verò oculum ad inflammationem leniendam, non est alienum imponere etiam cataplasmata. Sed* **Armeniacus, vel quilibet alius quam optimus teri debet, sic vt ei paulatim oleum adijciatur, donec crassitudo strigmenti fiat. Id deinde miscendum est cum hordacea farina, quæ ex mulso decocta sit. Facile autem recognitis omnibus, quæ medici quoq; prodiderunt, apparere cuilibet potest, vix vllum ex his, quæ supra comprehensa sunt, oculi vitium esse, quod non simplicibus quoq; & promptis remedijs submoueri possit.*

**Armeniacus legendū, vt subaudiatur lapis.*

De aurium morbis, & curationibus. CA. VII.

℞ 3 Haet

H Aclenus in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamenta plurimū possint. Ideoq; ad aures transeundum est, quarum vsum proximum à luminibus natura nobis dedit. Sed in his aliquanto maius periculum est: nam vitia oculorum intra ipsos nocent. Aurium inflammationes doloresq; , interdum etiam ad dementiam mortemq; præcipitant. Quo magis inter initia protinus succurrendum est, ne maiori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis sensit, abstinere & continere se debet. Postero die, si vehementius malum est, caput tondere, idq; irino unguento calido perungere & operire. At magnus cum febre vigiliaq; dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. Si id aliqua caussa prohibent, aliud soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata proficiunt, siue fæni Græci, siue lini, siue alia farina ex mulso decocta est. Recte etiam subinde admouentur spongiæ, ex aqua calida expressæ. Tum lenato dolore, ceratum circumdari debet ex irino aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosa factum est, proficit. Si vehemens inflammatio somnū ex toto prohibet, adijci cataplasmata debent, papaveris, corticis fricti atque contriti, sicut ex his pars dimidia sit, eaq; tum simul ex passo misto decoquatur. In aurem verò infundere aliquod medicamentū oportet, quod semper antequam tepescere convenit, commodissimeq; per strigilem instillatur. Vbi auris repleta est, super lana molli

lis addenda est, quæ humorem intus contineat.
Et hæc quidem communia sunt. Medicamentum
verò est & rosæ, & radicum arundinum suc-
cus, & olerum in quo lumbrici cocti sunt, et hu-
mor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali
persici expressus. Composita verò ad inflamma-
tionem doloremq; leniendum hæc fere sunt: Ca-
storei, papaueris lacrymæ pares portiones conte-
runtur, deinde adiicitur huius passum. Vel papau-
eris lacrymæ, croci, myrrha par modus, sic teri-
tur, ut inuicem modo rosæ, modo passum instille-
tur. Vel id quod amarum in ægyptia faba est, con-
teritur, rosæ adiecta. Quibus myrrhæ quoq; pau-
lum à quibusdam miscetur, vel papaueris lacry-
mæ, aut thas cum muliebri lacte, vel amararum
nucum cum rosæ succo. Vel castorei, myrrhæ, pa-
paueris lacrymæ pares portiones cum passo. Vel
croci p. i. * myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum
p. * 3. quibus cum teruntur, paulatim miscentur
passi cyathi tres, mellis minus cyatho. Idq; ex
primis medicamentis est. Vel papaueris lacryma
ex aceto. Licet etiam compositione uti Them-
sonis, quæ habet castorei, opopanax, papaueris
lacrymæ ex aceto, singulorum p. i i. *. spumæ
lycij p. i i i i. *. Quæ contrita passo excipiun-
tur, donec cerati crassitudinem habeant, atq; ita
reponuntur. Vbi usus requiritur, rursus idem
medicamentum adiecto passo, specillo teritur.
Illud perpetuum est, quotiescumq; crassius medi-
camentum est, quàm ut in aurem instillari pos-

℞ 4 sit,

sit, adiiciendum eum esse humorem, ex quo id
 componi debet, donec satis liquidum sit. Si verò
 pus quoque aures habent, recte lycium per se in-
 funditur, aut irinum unguentum, aut porri suc-
 cus cum melle, aut centaurea succus cum passo,
 aut dulcis punici mali succus in ipsius cortice te-
 pe factus, adiecta myrrhae exigua parte. Recte
 etiam miscentur myrrhae (quam *σαντλιω* co-
 gnominat) p.i. x. croci tantundem, nuces ama-
 rae x v. mellis sesquicyathus. Quae contrita, cum
 utendum est, in cortice punici mali tepefiant. Ea
 quoque medicamenta quae oris exulcerati causa
 componuntur, aequae ulcera aurium sanant. Quae
 si vetustiora sunt, & multa sanies fluit, apta
 compositio est, quae ad autorem Erasistratum re-
 fertur, piperis p.i. x. croci p.i. 3. x. myrrhae, mi-
 syos cocti, singulorum p.i. i. x. aris combusti p.
 i. i. x. Haec ex vino teruntur. Deinde ubi in-
 aruerunt, adiiciuntur passi heminae tres, & si-
 mul coquuntur. Cum utendum est, adicitur his
 mel & vinum. Est etiam Ptolemæi chirurgi me-
 dicamentum, quod habet lentisci p.i. x. gallae p.
 i. x. omphacis p.i. x. succum punici mali. Est
 Menophili validum admodum, quod ex his con-
 stat, piperis longi p.i. x. castorei p.i. i. x. myr-
 rhæ, croci, papaveris lacrymæ, nardi syriaci, thu-
 ris, malicorij, ex Aegyptia faba partis interio-
 ris, nucum amararum, mellis quam optimi, sin-
 gulorum p.i. i. i. i. x. Quibus, cum teruntur, ad-
 dicitur acetum quam acerrimum, donec crassitu-
 do

do in his passi fiat. Est Cratonis, cinamomi, casiae, singulorum $\text{P. I. } \times$. lycij, nardi, myrrhae, singulorum $\text{P. I. } \times$. aloës $\text{P. I. I. } \times$. mellis cyathi tres, vini sextarius. Ex quibus vinum cum lycio decoquitur, deinde his alia miscentur. At si multum puris, malusq; odor est, eruginis rase, thuris, singulorum $\text{P. I. I. } \times$. mellis cyathi duo, aceti quatuor simul incoquuntur. Vbi vtendum est, dulce vinum miscetur. Aut aluminis scissilis, papaveris lacryme, acaciae succi par pondus miscetur, hisq; adijcitur hyoscyami succi dimidio minor quam unius ex superioribus portio, eaq; trita, ex vino diluuntur. Per se quoq; hyoscyami succus satis proficit. Commune verò auxilium aduersus omnes aurium casus, iamq; vsu comprobatū Asclepiades composuit. In eo sunt cinamomi, casiae, singulorum $\text{P. I. } \times$. flores iunci rotundi, castorei albi, piperis longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thuris masculi, nardi syriaci, myrrhae pinguis, croci, spumae nitri, singulorum $\text{P. I. I. } \times$. Quae separatim contrita, rursus mista ex aceto conteruntur, atq; ita condita, ubi vtendum est, aceto diluuntur. Eodem modo commune auxilium auribus laborantibus est, Polybij sphragis ex dulci vino liquata. Quae compositio priore libello continetur. Quod si & sanies profluit, & tumor est, non alienum est, misto vino per oricularium clysterem eluere, & tum infundere vinum austereum cum rosa mistum, cui spodij paulum sit adiectum, aut lycium cum lacte, aut her-

be sanguinalis succum cum rosa, aut mali punici succum cum exigua parte myrrhæ. Si sordida quoque vlcera sunt, melius mulso eluuntur, & tum aliquod ex his, quæ supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur. Si magis pus profluit, & caput utiq; tondendum est, & multa calida aqua perfundendum, & gargariandum, & vsq; ad lassitudinẽ ambulandum, & cibo modico vtendum est. Si cruor quoq; ex vlceribus apparuit, lycium cum lacte debet infundi, uel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbæ sanguinalis, aut acaciæ adiecto. Quod si super vlcera caro increuit, eaq; mali odoris sanguinẽ fundit, aqua tepida elui debet: tamẽ infundi id, quod ex thure & ærugine, & aceto, & melle fit, aut mel cum ærugine incoctum. Squama quoq; aris cum sandaraca contrita per fistulam recte instillatur.

Aduersus aurium vermes.

Vbi verò vermes orti sunt, si iuxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt. Si longius, medicamentis enecandi, cauendumq; ne postea nascentur. Ad vtrunq; proficit album veratrum cum aceto contritum. Elui quoque aurem oportet vino, in quo marrubium decoctum sit. Sic emortui vermes in primam auris partem prouocabuntur, vnde facillime educi possunt.

Ad compressa aurium foramina.

In foramen auris compressum est, & intus scrassa sanies subest, mel quàm optimum addendum est. Si id parum proficit, mellis cyatho

Et dimidio, æruginis rasæ p. i i. x. adiiciendum est, incoquendumq; , et eo utendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item mellis et rosæ scrupuli duo. Item galbani p. i i. x. myrrhæ cum melle, et fellis taurini, singulorum p. i i. x. vini quantum satis est ad myrrham diluendam.

Ad grauem auditum.

Vbi uero grauius aliquis audire cæpit, quod maxime post longos capitis dolores euenire consuevit. In primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta, qualis super vlcera innascitur, aut sordium coitus. Si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle ærugo, vel porri succus, aut cum mulso nitri paulum. Atq; ubi crusta à corpore iam recedit, eluenda auris aqua tepida est, quo facilius ea per se diducta, oriculario specillo protrahatur. Si sordes aque molles sunt, eodem specillo eximendæ sunt. At si duræ sunt, acetum et cum eo nitri paululum coniiciendum est. Cumq; emollitæ sunt, eodem modo elui aurem purgariq; oportet. Quod si capitis grauitas manet, attondendum idem, et leniter, sed diu perfricandum est: adiecto vel irino vel laureo oleo, sic ut utrilibet paulum acetum miscatur: tum diu ambulandum, leniterq; post vnctionem aqua calida caput fouendum. Cibisq; utendum ex imbecillissima, et media materia, magisq; assumenda dilutæ potiones, nonnunquam gargariandum est. Infundendum autem in aurem castoreum cum aceto, et laureo oleo, et succo radis

radiculæ corticis. Aut cucumeris agrestis succus,
 adiectis contritis rosæ folijs. Immaturæ quoque
 * sordidi- vna succus cum rosâ instillatus, aduersus * sur-
 tatem ditatem satis proficit.

Ad sonitum aurium intra seipsas.

Aliud vitij genus est, vbi aures intra se-
 ipsas sonant. Atq; hoc quoq; fit, ne exter-
 num sonum accipiant. Lemissimum est, vbi id ex
 grauedine est. Peius, vbi ex morbis, capitis'ue
 longis doloribus incidit. Pessimum, vbi magnis
 morbis venientibus, maximeq; comitali, proue-
 nit. Si ex grauedine est, purgare aurē oportet, &
 spiritū continere, donec inde humor aliquis ex-
 pumet. Si ex morbo vel capitis dolore, quod ad
 exercitationē, frictiōem, perfusiōem, gargariza-
 tiōemq; pertinet, eadem faciēda sunt. Cibis non
 vtendum nisi extenuantibus. In aurem dandus
 radiculæ succus cum rosâ, vel cum succo radicis
 ex cucumere agresti, vel castoreum ex aceto,
 & laureo oleo. Veratrum quoq; cum aceto conte-
 ritur, deinde melle cocto excipitur, & inde col-
 lyrium factum in aurem demittitur. Si sine his
 cæpit, ideoq; nouo metu terret, in aurem dari de-
 bet castoreum cum aceto, vel irino, vel laureo
 oleo, aut huic mistum castoreum cum succo nu-
 cum amararum, aut myrrha et nitrum cum ro-
 sâ & aceto. Plus tamē in hoc quoq; proficit vi-
 ctus ratio. Eademq; faciēda sunt, quæ suprâ
 comprehendi, cum maiore quoq; diligentia: &
 præterea donec his sonus finiatur, à vino absti-
 nendum.

nendum. Quòd si simul & sonus & inflammatio est, laureum oleū coniecisse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus exprimitur, quibus quidam vel castoreum, vel myrrham miscent.

Ad ea quæ in aurem inciderunt extrahenda.

Solet etiā interdum in aurem aliquid incidere, vt calculus, aliquod'ue animal. Si pulex intus est, compellendū eo lanæ paulū est, quò ipse is subit, & simul extrahitur. Si non est secutus, aliud'ue animal est, specillū lana inuolutū in resina quam glutinosissimā, maximeq; terebinthinā demittendū, idq; in aurem injiciendū, ibiq; vertendum est. Vtiq; enim cōprehendet & eximet. Sin aliquid ex anime est, specillo oriculario protrahendū est, aut hamulo retuso paulū recurvato. Si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoq; admota id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoq; collocatur media inherens capitibus vtrinq; pendens, superq; eam homo deligatur in id latus versus, cuius auris eo modo laborat, sic vt extra tabulā emineat. Tum malleo caput tabulæ, quod à pedibus est, feritur: atque ita concussa aure, id quod inest, excidit.

De Nariū morbis, & curationibus. CAP. VIII.

NAres verò exulceratas fouere oportet vapore aquæ calidæ, id est spongia expressa atq; admota. Fit & subiecto vase oris angustī, calida aqua repleto. Post id fomentum illinenda
vlcera

ulcera sunt, aut plumbi recremento, aut cerussa.
Aut argenti spumã cum quolibet horum aliquis
conterit, eiq; dum teritur, inuicem vinum &
oleum myrteum adijcit, donec mellis crassitudi-
nem fecerit. Sin autẽ ea ulcera circa nares sunt,
pluresq; crustas & odorem fœdum habet, quod
genus Græci δὲ αἰνᾶν appellant, sciri quidẽ de-
bet, vix ei malo posse succurri. Nihilominus ta-
men hæc tentari possunt, vt caput ad cutem ton-
deatur, assidueq; vehementer perfricetur, multa
calida aqua perfundatur, multa ei deambulatio
sit, cibis modicus, neq; acer, neq; valentissimus.
Tum in nares ipsam mel cum exiguo modo resi-
ne terebinthinae coniiciatur, quod specillo quoq;
inuoluto lana fit, attrahaturq; spiritu is succus,
donec in ore gustus eius sentiat. Sub his enim
crustæ resoluuntur, quæ tum per sternutamenta eli-
di debent. Puris ulceribus vapor aquæ calidæ
subijciendus est. Deinde adhibendũ aut lycium
ex vino dilutum, aut amurca, aut omphaciũ, aut
menta, aut marrubij succus, aut atramentum su-
torium, quod candens factum, deinde contritum
sit: aut interior scillæ pars contrita, sic vt horum
cuiuslibet mel adijciatur. Cuius in cæteris admo-
dum exigua pars esse debet: in atramento suto-
rio tanta, vt ea mixtura liquida fiat, cum scilla
vtique pars maior, inuoluendumq; lana specil-
lum est, & in eo medicamento intingendum,
eoq; ulcera implenda sunt. Rursusq; linamẽtum
inuolutum & oblongum eodem medicamento
illinen

illinendum, dimittendumq; in narem est, & ab inferiore parte leniter deligandum. Idq; per hyemem, & ver, bis die: per æstatem, & autumnum, ter die fieri debet. Interdum verò etiam in naribus caruncula quedam, similes muliebribus mammis nascuntur, hæq; in his partibus, quæ carnosissimæ sunt, inhaerent. Has curare oportet medicamentis adurentibus sub quibus ex toto consumuntur. Polypus verò est caruncula, modò πολυψος^{es} alba, modò subrubra, quæ narium ossi inhaeret, & modò ad labra pēdens, narem implet, modò retro per id foramen, quò spiritus à naribus ad fauces descendit, adeo increscit, uti post ruam conspici possit, strangulatq; hominem maxime, austro aut euro flante, fereq; mollis est, raro dura: eaq; magis spiritum impedit, & nares dilatat, quæ fere νᾱγνυῶδες est, itaque attingi non debet. Illud aliud genus fere quidem ferro curatur, interdum tamen inarescit, si addita in narem per linamentum aut penicillum ea compositio est, quæ habet minij sinopici, chalcitidis, calcis, sandaracæ, singulorum P. I. ✕. atramenti sutorij P. II. ✕.

De Dentiū dolore, & curationibus. CAP. IX.

IN Dentium autem dolore, qui ipse quoq; maximis tormētis annumerari potest, vinum ex toto circuncidendum est. Cibo quoq; primo abstinendum, deinde eo modico molliq; utendum, ne mandentis dentes irritet, tum extrinsecus admo-
uendus per spongiam vapor aque calide, impo-
nend

nendumq; ceratum ex cyprino aut irino factum,
lanaq; id comprehendendum, caputq; velan-
dum est. Quod si grauior is dolor est, vtiliter &
alius ducitur, & calida cataplasmata super ma-
xillas inijciuntur, & ore humor calidus cum
medicamentis aliquibus continetur, sepiusq; mu-
tatur. Cuius rei causa & quinquefolij radix, in
vino misto coquitur, & hyoscyami radix, vel
in posca, vel in vino misto coquitur, sic vt paulu-
his salis adijciatur, & papaueris non nimium: ari-
di cortices, et maderagore radix, eodem modo. Sed
in his tribus utiq; vitandū est, ne quod haustum
erit deuoretur. Ex populo quoq; alba, cortex ra-
dicis in hunc usum in vino misto recte coquitur,
& in aceto cornu ceruinum rasum, & nepeta
cum teda pingui: ac ficus itē pinguis vel in mul-
so, vel in aceto & melle, ex quibus cum ficus de-
cocta est, is humor percolatur. Specillū quoq; la-
na inuolutum in calidum oleum demittitur, eoq;
ipso dens fouetur. Quinetiam quedam quasi ca-
taplasmata in dentem ipsum illinuntur. in quem
usum ex malo punico acido atq; arido, malicorij
pars interior cum pari portione, & galle, & pi-
nei corticis conteritur, misceturq; his minui: eaq;
contrita aqua pluuiatili coquuntur. Aut panacis,
papaueris lacrymæ, peucedani, vne taminia si-
ne seminibus, pares portiones conteruntur. Aut
galbani partes tres, papaueris lacrymæ pars
quarta. Quicquid dentibus admotū est, nihilomi-
nus supra maxillā, ceratum, quale supra posui,
esse

esse debet lana obiectū. Quidam etiam myrrhae,
 cardamomi, singulorum P. I. *. croci, pyrethri,
 *ficorum partes, singulorum P. I I I I. *. sinapis * ficorum
 P. V I I I. *. contrita linteolo illinunt, imponūtq; pinguium,
 in humero partis eius qua dens dolet. Si is supe- fortasse le-
 rior est, à scapulis: si inferior, à pectore. Idq; do- gendū, aut
 lorem leuat: & cum leauit, protinus submouen- paruarū,
 dum est. Si verò exesus est dens, festinare ad
 eximendum eum, nisi res coëgit, non est necesse.
 Sed cum omnibus fomētis, quæ suprà posita sunt,
 adiiciendæ quædā valentiores cōpositiones sunt,
 quæ dolorem leuant, quales hæ sunt. Habet au-
 tem papaueris lacrymæ P. I. *. piperis P. I I. *.
 psoreos P. X. *. quæ contrita galbano excipiun-
 tur: idq; circundatur. Aut Menemachi maxi-
 me ad maxillares dentes, in qua sunt croci P.
 I. *. cardamomi, thuris fuliginis, ficorum* partes, * parua-
 pyrethri, singulorum P. I I I I. *. sinapi P. V I I I. rum, vel
 *. Quidam autem immiscent pyrethri, piperis, pinguiū:
 elaterij, singulorum P. I. *. aluminis scissilis, pa- vt suprà.
 paueris lacrymæ, vnae taminie, sulphuris ignem
 non experti, bituminis, lauri baccarum, sinapis,
 singulorum P. I I. *. Quod si dolor eximi eum
 cogit, & piperis semen cortice liberatum, & eo-
 dem modo bacca hederæ coniecta in id foramē,
 dentem findit, isq; forte stans excidet. Et plani
 piscis, quam pastinacam nostri, τρυγών Græci Pastinaca.
 vocant, aculeus torretur, deinde conteritur, resi-
 naq; excipitur, quæ denti circundata hunc sol-
 uit. Et alumen scissile in id foramen contectum
 demittit

demitti commodius est, quia sic dente seruato, dolorem leuat. Hæc à Medicis accepta sunt. Sed agrestium experimento cognitum, cum dens dolet, herbam mentastrum cum suis radicibus velli debere, & in peluem coniici, supraq; aqua infundi, collocariq; iuxta sedentem hominem vndique veste contactum, tum in peluem candentes filices demitti, sic vt aqua tegantur, hominemq; eum hiantem ore vaporem excipere, vt supra dictum est, vndique inclusum. Nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit, idq; sæpe longiorem, sæpe annuam valetudinem bonam præstat.

De Tonsillis, & eorum cura. C A P. X.

Radix dul-
cis.

SI vero tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, caput velandum est extrinsecus, is locus vapore calido fouendus, multa ambulatione vtendum, caput in lecto sublime habendum, gargari &andumq; est ex reprimentibus. Radix quoq; ea, quam dulcem appellant, contusa & in passo, mulso'ue decocta idem præstat. Leniterq; quibusdā medicamentis eas illini non alienum est, quæ hoc modo fiunt: Ex malo punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit, tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum p. i. l. x. per se conteruntur, paulatimq; his adiunguntur vini lenis cyathi duo, mellis vnus, deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur. At eiusdem succi sextarius eodema

eodem modo coquitur, atq; eadem ratione trita
 ei adiiciuntur hæc: Nardi $\text{P. I. } \times$. omphacij $\text{P. I. } \times$. * P. V.
 cinamomi, myrrhæ, casia, singulorum $\text{P. I. } \times$. Ea-
 dem autem hæc et auribus, & naribus purulen-
 tis accommodata sunt. Cibus quoq; in hac vale-
 tudine lenis esse debet, ne exasperet. Quod si tan-
 ta inflammatio est ut spiritus impediatur, in lecto
 conquiescendum, à cibo abstinendum, neq; adsumen-
 dum quicquid præter aquam calidam est. Aluus
 quoq; ducenda est. Gargariandum ex fico &
 mulso. Illinendum mel, cum omphacio. Intrinsicus
 admouendus, sed aliquanto diutius, vapor aque
 calidæ, donec ea suppurent, & per se aperiatur.
 Si pure substance non rumpuntur, hi tumores,
 incidendi sunt, deinde ex mulso calido gargari-
 andum ex fico. At si modicus quidam tumor &
 exulceratio est, furfurum cremore ad gargari-
 andum paulum mellis adiiciendum est, illinendaq; vlce-
 ra hoc medicamento. Passi quamdulcissimi tres
 hemine ad unam coquuntur, tum adijcitur thu-
 ris $\text{P. I. } \times$. croci, myrrhæ, singulorum $\text{P. I. } \times$. leni-
 terq; omnia rursus feruescunt. Vbi plurima vlce-
 ra sunt, eodem furfurum cremore, vel lacte gar-
 gariandum est. Atque hic quoque cibus lenibus
 opus est, quibus adijci dulce vinum potest.

De Oris vlcibus, & curationibus, & quæ An-
 theræ sunt.

C A P. XI.

VLcera autem oris, si cum inflammatione
 sunt, & parum pura ac rubicunda sunt,
 optime his medicamentis curantur, quæ supra po-

A 2

sita

sita ex malis punicis fiunt. Continendusq; saepe
 ore reprimens cremor cui paulum mellis sit adie-
 ctum. Utendū ambulationibus, & non acri cibo.
 Simulatq; verò pura vlcera esse cœperunt, lenis
 humor, interdum etiam quàm optima aqua ore
 continenda est. Prodestq; assumptum purum vi-
 num, pleniorq; cibus, dum acribus vacet. In sper-
 giq; vlcera debent alumine scissili, cui dimidio
 plus gallæ immaturæ sit adiectū. Si iam crustas
 habent, quales in adustis esse consuerunt, adhi-
 benda sunt hæ compositiones quas Græci ἀνθρα-
 γὰς nominant. Iunci quadrati, myrrha, sandara-
 cæ, singulorū p. i i i i. *. aluminis pares portio-
 nes. Aut croci, myrrha, singulorum p. i i. *. iri-
 dis, aluminis scissilis, sandaracæ, singulorum p.
 i i i i. *. iunci quadrati p. v i i i. *. Aut gallæ,
 myrrha, singulorum p. i i. *. aluminis scissilis p.
 i i. *. rosæ foliorū p. i i i i. *. Quidā autem cro-
 ci p. *. aluminis scissilis, myrrha, singulorum p.
 i. *. sandaracæ p. i i. *. iunci quadrati p. i i i i.
 *. miscent. Priora arida insperguntur. Hoc cum
 melle illinitur, neq; vlceribus tantum, sed etiam
 tonsillis. Verum ea longe periculosissima vlcera
 sunt, quas ἀφθὰς Græci appellant, sed in pueris:
 hos enim saepe consumunt, in viris & mulieri-
 bus idem periculum non est. Hæc vlcera à gin-
 giuis incipiunt, deinde palatum totumq; os oc-
 cupant: tum ad riuam faucesq; descendunt. Qui-
 bus obsessis, non facile fit, vt puer conualeseat.
 Ac miserius etiam est, si lactens adhuc infans
 est,

est, quominus imperari remedium aliquod potest. Sed in primis matrix cogenda est exerceri ambulationibus, hisq; operibus, quæ superiores partes mouent. Mittenda in balneum, iubendaq; ibi calida aqua mammis perfundere, tum alenda cibus lenibus, & his qui facile non corrumpuntur. Potiones, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est, vini diluti. Ac si alius nutrici substituit, ducenda est. Si pituita eius in os coit vomere debet. Tum ipsa vlcera perungenda sunt melle, cui *rhus quem syriacum vocat, aut amara n- *ros ces adiectæ sunt. Vel mistis inter se rosæ folijs aridis, pineis nucleis, mentæ coliculo, melle. Vel eo medicamento, quod ex moris fit, quorum succus eodem modo quo punici mali ad mellis crassitudinē coquitur, eademq; ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, mel, miscetur. Neq; quicquā dandum, ad quod humor euocari possit. Si verò iam firmior puer est, gargari debet his fere, quæ supra comprehensa sunt. At si lenia medicamenta in eo parum proficiunt, adhibenda ea, quæ adurendo crustis vlceribus inducant. Quale est scissile alumen, vel chalcitis, vel atramentum sutorium. Prodest etiam fames, & abstinentia quanta maxime imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen vlcera interdum caseus ex melle recte datur.

De *linguæ vlceribus.

CAP. XII. *lingua-

L*Inguæ quoq; vlcera non alijs medicamentum
tis egent, quàm quæ prima parte superioris *Gingivæ

A 3

capitis

capitis exposita sunt. Sed quæ in latere eius nascuntur, diutissimè durant. Videndumq; est, num contrà dens aliquis acutior sit, qui sanescere sepe vlcus eo loco non finit, ideoq; limandus est.

De parodontidibus gingivarū tuberculis, deq; alijs vlceribus gingivarum. CAP. XIII.

Aldus coniungit hoc caput cum præcedente, neque titulu addit.

Solent etiam interdum iuxta dentes in gingivis tubercula quædam oriri dolentia, πæγοδοντῖδες Græci appellant. Hæc initio leniter sale contrito perfricare oportet, aut inter se mistis sale fossili, combusto cypresso, nepeta, deinde eluere os cremore lenticule, & inter hæc hiare, donec pituitæ satis profluat. In maiore verò inflammatione iisdem medicamentis vtendum est, quæ ad vlcera oris supraposita sunt: et mollis linamenti paulum inuoluendum aliqua compositione ex his, quas antheras vocari dixi, demittendumq; id inter dentem & gingiuam: quod si durior erit, & id prohibebit, extrinsecus admo- uendus erit spongiæ vapor calidus, imponendumq; ceratum. Si suppuratio se ostendet, diutius eo vapore vtendum erit, & continendū ore calidum mulsū, in quo ficus decocta sit. Itemq; subcrudum incidendū, ne si diutius ibi pus permanserit, os ledat. Quod si maior is tumor est, cōmodius totus exciditur, sic vt ex vtraq; parte dens liberetur. Pure exempto, si levis plaga est, satis est ore calidam aquā continere, & extrinsecus fouere eodē vapore. Si maior est, lenticule cremore: vti iisdem medicamentis, quibus cætera vlcera

ulcera oris curantur. Alia quoq; ulcera in gingivis plerūq; oriuntur, quibus eadem quæ in reliquo ore succurrunt. Maxime tamen mandere ligustrum oportet, succumq; eū ore continere. Fit etiam interdum, ut ex gingivæ ulcere, siue *pa- *παγοδόν-
 rodontides sint, siue nō sint, diutius pus feratur. tis fuit,
 Quod aut dente corrupto, aut fracto, vel aliter siue non
 vitiato osse, maximeq; id per fistulam venire fuit
 cōsuevit, ubi incidit, locus aperiendus, dens exi-
 mendus: testa ossis, si qua excessit, recidenda est:
 si quid vitiosū est, radendum. Post quæ, quid fie-
 ri debeat, suprà in aliorum ulcerum curatione
 comprehensum est. Si verò à dentibus gingivæ
 recedunt, eadem antheræ succurrunt. Utile est e-
 tiam pyra, aut mala non permatura mandere, et
 ore eum humorem continere. Idemq; præstare
 non acre acetum in ore retentum potest.

De Vuæ morbo, & curatione. CAP. XIII.

Vuæ vehemens inflammatio terrere quoq;
 debet. Itaq; in hac abstinentia necessaria
 est, & sanguis recte mittitur: & si id aliqua res
 prohibet, alius utiliter ducitur, caputq; super
 hæc relandum, & sublimius habendum est: tum
 aqua gargarizandum, in qua simul rubus &
 lenticula decocta sit. Illinenda autem ipsa vuæ
 vel omphacio, vel galla, vel alumine scissili, sic
 ut cuilibet eorum mel adijciatur. Est etiam me-
 dicamentum huic aptū, quod Andronium appel-
 latur. Cōstat ex his, alumine scissili, squama aris
 rubri, atramento sutorio, galla, myrrha, misy.

Androniū.

Que per se contrita mistaq; rursus paulatim adiecto vino austero teruntur, donec his mellis crassitudo sit: ubi horum aliquo illita vna est, chelidonia quoq; succo per cochlear illita vna maxime prodest. Fere multa pituita decurrit, cumq; ea quieuit, ex vino calido gargari et audiri. Quod si minor in ea inflammatio, laser terere, eiq; adijcere frigidam aquam satis est, eamq; aquam cochleario exceptam ipsi vna subijcere: Ac mediocriter eam tumentem aqua quoq; frigida, eodem modo subiecta, reprimat. Ex eadem autem aqua gargari et audiri quoq; est, vel cum lasere, vel sine eo hac curatione vna subiecta est.

De Cancro oris.

CAP. XV.

SI quando autem vlcera oris cancer inuasit, primo considerandum est, num malus corporis habitus sit, eiq; occurrendum, deinde ipsa vlcera curanda. Quod si in summa parte id vitium est, satis proficit anthera humido vlceri arida inspersa: sicciori cum exigua parte mellis illita. Si paulo altius, chartae combustae partes duae, auripigmenti pars vna. Si penitus malum descendit, chartae combustae partes tres, auripigmenti pars quarta. Aut pares portiones salis fricti, et iridis fricti. Aut item pares portiones chalcitidis, calcis, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in rosa tingere, et super aduentia medicamenta imponere, ne vicinum, et sanum locum ledant. Quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem coniungunt, donec tabescere

scere desinat : deinde id acetum coquunt , donec
 exiccetur , eumq; salem contritum inspergunt.
 Quoties autem medicamentū inijcitur , & antè
 & post os diluendum est , vel cremore lenticulae ,
 vel aqua in qua aut eruum , aut olea , aut ver-
 benae decoctae sint , sic vt cuilibet eorum paulum
 mellis misceatur. Acetum quoq; ex scilla reten-
 tum ore , satis aduersus haec vlcera proficit. Ex
 aceto cocto sali , sicut supra demonstratum est ,
 rursus mistum acetum . Sed & diu continere
 rtrumlibet , et id bis aut ter die facere , prout ve-
 hemens malum est , necessarium est . Quod si puer
 est , cui id incidit , specillum lana inuolutū in me-
 dicamentum demittendum est , & super vlcus
 tenendum , ne per imprudentiam adurentia de-
 uoret . Et si dolor in gingiuis est , mouenturq; ali-
 qui dentes , refici eos oportet : nam curationes ve-
 hementer impediunt . Si nihil medicamenta pro-
 ficient , vlcera erunt adurenda . Quod tamen in
 labris ideo non est necessarium , quoniam excide-
 re commodius est . Et id quidem aequè adustum
 atq; excisum , sine ea curatione , quae corpori ma-
 nu adhibetur , impleri non potest . Gingiuarum
 verò ossa , quae hebetia sunt , in perpetuum vstio-
 ne nudantur . Neq; enim postea caro increscit .
 Imponenda tamen adustis lenticula est , donec
 sanitatem , qualis esse potest , recipiant .

De Parotidibus , quae sub auribus oriuntur .

C A P. XVI.

Haec in capite fere medicamentis egent.

A 5 Sub

Sub ipsis verò auribus oriri πᾶσι τῖδες solēt, modo in secunda valetudine ibi inflāmatōne orta, modo post longas febres, illuc impetu morbi conuerso. Id abscessus genus est. Itaq; nullam nouam curationem desiderat. Animaduersionem tantummodo hanc habet necessariam, quia si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experimentum est. Si ex aduersa valetudine, illud inimicum est, maturariq; & quā primum aperiri commodius est.

De Umbilici prominentis curatione.

C A P. XVII.

AD Umbilicos verò prominentes, ne manu ferroq; vtendum sit, antè tentandum est, vt abstineāt, alius his ducatur, imponatur super umbilicum id, quod ex his constat: Cicutæ & fuliginis, singulorum P. I. * cerussæ elotæ P. IIII. * plumbi eloti P. VIII. * ouis duobus, quibus etiam solani succus adijcitur. Hoc dilutius positum esse oportet, & interim conuiescere hominem, cibo modico vti, sic vt vitentur omnia inflantia.

De obscœnarum partium vitijs, & curationibus.

C A P. XVIII.

Proxima sunt ea, quæ ad partes obscœnas pertinent, quarum apud Græcos vocabula & tolerabilius se habent, & accepta iam vsu sunt, cum omni ferè medicorum volumine atq; sermone iactentur: apud nos fœdiora verba, ne
 accommodata consuetudine quidem aliqua verecundius loquentium commēdata sunt: vt difficilis hæc explanatio

planatio sit, simul & pudorem, et artis præcepta
seruantibus. Neq; tamen ea res à scribendo de-
terrere me debuit. Primum, vt omnia quæ salu-
taria accepi, comprehenderem, dein quia in vul-
gus eorum curatio etiam præcipue cognoscenda
est, quæ inuitissimus quisq; alteri ostendit.

De Colis morbis, & curationibus.

Igitur si ex inflammatione Coles intumuit,
reduciq; summa cutis, aut rursus induci non
potest, multa calida aqua fouendus locus est.
Vbi verò glans contacta est, oriculario quoque
clystere inter eam, cutemq; aqua calida inse-
renda est. Si mollita sic & extenuata cutis, du-
centi paruit, expeditior reliqua curatio est. Si
tumor vicit, imponenda est vel lenticula, vel
marrubium, vel oleæ folia ex vino cocta, sic vt
cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum adij-
ciatur. Sursumq; coles ad ventrem deligandus
est. Quod in omni curatione eius necessarium est.
Isq; homo continere se debet, & abstinere à ci-
bo, & potione aquæ tantum à siti vindicari.
Postero die rursus adhibendum iisdem rationi-
bus aquæ fomentum est, & cum vi quoq; ex-
periundum, an cutis sequatur. Eaq; si non pare-
bit, leuiter summo scalpello cōcidenda erit. Nam
cum sanies profluxerit, extenuabitur is locus, et
facilius cutis ducetur. Siue autem hoc modo vi-
cta erit, siue nunquam repugnauerit, vlcera vel
in cutis vltiore parte, vel in glande vltra're
eam in cole reperientur: quæ necesse est, aut pu-
ra sicca

ra sicca' ve sint, aut humida, & purulenta. Si
 sicca sunt, primum aqua calida fouenda sunt: de-
 inde imponendum lycium ex vino est, aut amur-
 ca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum. Si le-
 uis ijs humor inest, vino eluenda sunt, tum buty-
 ri, & rosa mollis paulum, & resina terebinthi-
 ne pars quarta adijcienda est, eoq; vtendum.
 Aut si pus ex his profluit, ante omnia elui mul-
 so calido debet. Tum imponi piperis P. I. *. myr-
 rhæ P. II. *. croci, misyos cocti, singulorum P. II.
 *. Quæ ex vino austero coquuntur, donec mellis
 crassitudinem habeant. Eadem autem compo-
 sitio tonsillis, vna madentiori, nariumq; vlceribus
 accommodata est. Aliud ad eam piperis P. I. *.
 myrrhæ P. I. *. croci P. II. *. misyos cocti P. I. *.
 eris combusti P. II. *. primum ex vino austero
 conteruntur, deinde vbi inaruerunt, iterum te-
 runtur ex passi tribus cyathis, & incoquuntur,
 donec visci crassitudinem habeant. Aerugo quoq;
 cum cocto melle, & ea quæ ad oris vlcera supra
 comprehensa sunt, curant. Aut Erasistrati com-
 positio, aut Cratonis recte super purulenta natu-
 ralia imponitur. Folia quoq; oleæ ex noue cya-
 this vini coquuntur. His adijcitur aluminis scis-
 silis P. IIII. *. lycij P. VII. *. mellis sesquicya-
 thus. Ac si plus puris est, id medicamentum ex
 melle: si minus, ex vino diluitur. Illud perpetuum
 est, post curationem dum inflammatio manet,
 quale suprapositum est, cataplasma supra dare,
 & quotidie vlcera eadem ratione curare. Quod
 si pus

si pus & multum, & cū malo odore cæpit profluere, elui cremore lenticulæ debet, sic, vt ei mellis paulum adijciatur: aut oleæ, aut lentisci folia, vel marrubium decoquendum est, eoq; humore eodem modo cum melle vtendum, imponendaq; eadem, aut etiam omphacium cum melle, aut id quod ex ærugine & melle ad aures fit, aut compositio Andronis, aut anthera, sic, vt ei paulum mellis adijciatur. Quidam vlcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex vino curant. Si verò vlcus latius atq; altius serpit, eodem modo elui debet. Imponi verò, aut ærugo, aut omphacium cum melle, aut Andronis compositio, aut marrubij, myrrhæ, aut croci, aluminis scissilis cocti, rose foliorum aridorum, gallæ, singulorum p. i. * minij sinopici p. ii. *. Que per se singula primum teruntur, deinde iuncta iterū mello adiecto, donec liquidi cerati crassitudinē habeant: tum in æneo vase leniter coquuntur, ne superfluant. Cum iam guttæ indurescunt, vas ab igne remouetur, idq; medicamentū, prout opus est, aut ex melle aut ex vino liquatur. Idem autem per se etiam ad fistulas vtile est. Solet etiam interdum ad nervos vlcus descendere, profluitq; pituita multa, sanies tenuis maliq; odoris, non coacta, aut aquæ similis, in qua caro recens lota est. Doloresq; in locus & punctiones habet. Id genus quamuis inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis curandum est, quale est emplastrum ῥιζοῦ καὶ ῥοσῶν ex rosa liquatum, sicut thuris

ibonb

quoq; paulum ei misceatur. Aut id quod ex butyro, rosa, resina, melle fit, supra verò à me positum est. Precipueq; id vlcus multa calida aqua fouendum est, velandumq;, neq; frigori committendum. Interdum autē per ipsa vlcera, coles sub cute exesus, sic vt glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circumcidenda est. Perpetuūq; est, quoties glans, aut ex cole aliquid vel excidit, vel abscinditur, hanc non esse seruandā, ne confidat, vlceriq; agglutinetur, ac neq; reduci possit postea, & fortasse fistulā quoq; vrinae includat. Tubercula etiam, quæ φύμαλα Græci vocant, circa glandē oriuntur, quæ vel medicamentis vel ferro aduruntur: & cū crustæ exciderunt, squama aris inspergitur, ne quid ibi rursus incre scat.

De Cancro, qui in cole nascitur, curatione.

Hæc citra cancrum sunt, qui cum in reliquis partibus, tum in his quoq; vel precipue vlcera infestat. Incipit à nigritie, quæ si cutem occupauit, protinus specillum subiiciendum, eaq; incidenda est, deinde ora vulsellaprehendende: tum quicquid corruptū est, excidendum, sic vt ex integro quoq; paulum demat, idq; adurendum. Quoties quid vstum est, id quoq; sequitur, vt imponenda lenticula sit, deinde vbi crustæ exciderunt, vlcera sic, vt alia, curentur. At si cancer ipsum colem occupauit, inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeq; id quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. Si medicamēta vincuntur, hîc quoq; scalpello quicquid

quid corruptum est, sic ut aliquid etiam integri trahat, præcidi debet. Illud quoque æque perpetuum est, exciso cancro vulnus esse adurendum. Sed siue ex medicamentis, siue ex ferro crustæ occalluerunt, magnum periculum est, ne his decidentibus ex cole profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete & immobili penè corpore opus est, donec ex ipso crustæ puræ leniter resoluantur. At si vel volens aliquis, vel imprudens, dum ingreditur, immature crustas diduxit, et fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est. Si hæc parum valet, decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt. Si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter et timide debet, neque vlllo postea motu dandus eidem periculo locus est.

De Phagedænæ in cole nascentis curatione.

Nonnumquam etiam id genus ibi cancri, quod φρυδάνα à Græcis nominatur, oriri solet, in quo minime differendum, sed protinus iisdem medicamentis occurrendum est, & si parum valent, ferro adurendum. Quædam etiam nigrities est, quæ non sentitur, & serpit, ac si sustinuiamus, usque ad vesicam tedit, neque succurri postea potest. Si id in summa glande circa fistulam urinae est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde ferro adurendum. Si verò alte penetravit, quicquid occupatum est præcidendum est. Cæterum eadem, quæ in alijs canceris, facienda sunt.

De Carbunculo, qui in cole nascitur.

Occalle

Occallescit etiam in cole interdum aliquid, idq; omni penè sensu caret, quod ipsum quoq; excidi debet. Carbunculus autē ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est. Deinde ipse quoq; medicamentis vrendus, maximeq; chalcitide cū melle, aut ærugine cum cocto melle. Vbi is excidit, liquidis medicamētis vrendum est, quæ ad ora vlcera componuntur.

De Testiculorum morbis, & eorum curatione.

IN testiculis verò, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex talo mittendus est, à cibo abstinendum, imponendum ex faba farina ex mulso cocta, cū cumino contrito ex melle cocto. Aut contritum cuminum cū cerato ex rosa facto. Aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum, aut tritici farina ex mulso cocta cum cupresso, aut lilij radix contrita. Aut si ydē induruerunt, imponi debet lini vel fœnigræci semen ex mulso coctū, aut ex cyprino ceratum: aut similia ex vino contrita, cui paulum croci sit adiectum. Si vetustior iam durities est, maxime proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita. Si ex ictu tument, sanguinē mitti necessarium est, magisq; si etiam luent. Imponendum verò vtrumlibet ex his, quæ cum cumino cōponuntur, supraq; proposita sunt. Aut ea compositio quæ habet nitri cocti p.i. *. resinæ pineæ, gummi, singulorum p.ii. *. r. uæ taminie sine seminibus p.iiii. *. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex ictu testiculis aliquid desit,

desit, fere quoque increfcit, neque aliter succurri potest, quam si inciso scroto, & pus emissum, & ipse testiculus excisus est.

De Rhagadijs, & Condylomate, & Hæmorrhoidibus, alijsq; ani morbis, & curationibus eorum: & primo de Rhagadijs.

ANus quoque multa tædyq; plena mala recipit, nec in se multum abhorrentes curationes habet. At primum in eo sepe, & quidem pluribus locis, cutis exciditur, Πάγὰδιαι Græci vocant. Id si recens est quiescere homo debet, & in aqua calida desiderare. Columbina quoque ova coquenda sunt, & ubi induruerunt purganda: deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foueri locus, sic ut inuicem utroq; aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, aut rhyodes rosa diluendum est, aut hyssopum recens miscendum cum cerato liquido ex rosa facto. Aut eidem cerato liquido plumbum elotum adijciendum. Aut resinæ terebinthinæ myrrha, aut spumæ argenti vetus oleum. Et quolibet ex his id perungendum. Si quicquid lesum est, extra est, neq; intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum superdandum est, & quicquid antè adhibuimus cerato contegendum. In hoc autem casu neq; acris cibis utendum, neq; asperis, nec aluum comprimentibus: ne aridum quidem quicquam satis utile est, nisi admodum paulum. Liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt. Vino leni uti nihil prohibet.

B

De

De Condylomate.

Condyloma autem est tuberculum, quod ex quadam inflammatione nasci solet. Id ubi ortum est, quod ad quietē, cibos, potionesq; pertinet, eadem seruari debent, quae proxime scripta sunt. Iisdem etiam ovis recte tuberculum id fouetur. Sed desidere antē homo in aqua debet, in qua verbenae decocta sunt ex reprimementibus. Tum recte imponitur & lenticula cum exigua mellis parte, & sertula campana ex uino cocta, & rubi folia contrita cum cerato ex rosa facto, & cum eodem cerato contritū uel cotoneum malum, uel malicorij ex uino cocti pars interior, & chalcitis cocta atque contrita, deinde hyssopo ac rosa excepta. Et ex ea compositione, quae habet thuris p. i. * aluminis scissilis p. i i. * cerussae p. i i i. * spumae argenti p. v. *. Quibus dum teruntur, inuicē rosa & vinum instillatur. Vinculum autē ei loco linteolum, aut panniculus quadratus est, qui ad duo capita duas ansas, ab altera verò parte totidem fascias habet: cumq; subiectus est, ansis ad ventrē datis à posteriore parte in eas adductae fasciae coniunguntur, atq; ubi artatae sunt, dexteriori sinistra, sinisteriori dextra procedit, circumdataeq; circa alium inter se nouissime nodo deligantur. Sed si vetus condyloma iam induruit, neq; sub his curationibus desidit, aduri medicamento potest, quod ex his constat, eruginis p. i i. * myrrhae p. i i i i. * gūmi p. v i i i. * thuris p. x i i. * stibis, papaueris lacryma, acacia,

cia, singul. p. xvi. ✱. quo medicamento quidam etiam vlcera, de quibus proxime dixi, renouant. Si hoc parū in cōdylomate proficit, adhiberi possunt etiam vehemētius adurētia. Vbi cōsumptus est tumor, ad medicamēta lenia transeundum est.

De Hæmorrhoidibus.

Tertium autem uitium est, ora uenarū tanquam ex capitulis quibusdam surgentia, quæ sæpe sanguinē fundunt, αἱμορροΐδες Græci vocant. Idq; etiam in ore vuluæ foeminarum incidere consuevit. Atq; in quibusdam parum tutò supprimitur, qui sanguinis profluuiū imbecilliores non fiunt. Habent enim purgationē hanc, non morbum. Ideoq; curati quidam cum sanguinis exitum non haberent, inclinata in præcordia ac viscera materia, subitis & grauissimis morbis correpti sunt. Si cui. verò id nocet, is desiderare in aqua ex uerbenis debet: imponere maxime malicorium cum aridis rosæ folijs contritum, aut ex his aliqua quæ sanguinem supprimunt. Solet autem oriri inflammatio, maxime vbi dura aluus eum locum læsit. Tum in aqua dulci desidendum est, & id fouendum ouis, imponendi vitelli cum rosæ folijs ex passo* subactis: idq; si intus est, digito illinendum: si extrā, super illitum panniculum imponendum est. Ea quoq; medicamēta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt. Cibis verò in hoc casu ijsdem, quibus in prioribus, vtendum est. Si ista parū iuuant, solent imposita medicamenta adurentia, ea capitula absu-

* subactis

mere. Ac si iam uetustiora sunt, sub autore Dionysio inspergenda sandaraca est, deinde imponendum, quod ex his constat: Squamæ æris, auripigmenti, sing. P. V. * saxi calcis P. VIII. *. postero die acu compungendum. Aduſtis capitulis fit cicatrix, quæ sanguinē fundi prohibet. Sed quoties is suppressus est, ne quid periculi afferat multa exercitatio digerēda materia est. Prætereāq; & viris et fœminis, quibus mēstrua non proueniunt, interdū ex brachio sanguis mittendus est.

Si apus vel os vuluæ procidit, qua curatione utendum sit.

AT si anus ipse, vel os vuluæ procidit (nam id quoq; interdū fit) considerari debet purum ne id sit, quod prouolutū est, an humore mucoso circumdatū. Si purū est, in aqua desidere homo debet, aut salsa, aut cum verbenis, vel malicorio incocta. Si humidū, vino austerio subluendum est, illinendumq; fece vini combusta. Vbi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est, imponendaq; plantago contrita, vel folia salicis in aceto cocta, tum linteolum, & sup̄ lanaeque deliganda, cruribus inter se deuinctis.

De vlcere fungo simili in ano.

FVngo quoq; simile vlcus in eadē sede nasci solet. Id si hyems est, egelida: si aliud tem-
 *squama pus, frigida aqua fouendum est: deinde * spuma æris inspergenda, supraq; ceratum ex myrteo factum, cui paulum squamæ fuliginis, calcis sit adiectū. Si id hac ratione non tollitur, vel medicamentis.

mentis uehemētioribus, vel ferro adurendum est.

De digitorum vlceribus. CAP. XIX.

Digitorum autem uetera vlcera commodissime curantur, aut lycio, aut myrrha cocta, cum vtrilibet vini adiectum est. In iisdem recedere ab ungue caruncula cum magno dolore consuevit, πύριον Græci appellant. Oportet alumen melini rotundū in aqua liquare, donec mellis crassitudinem habeat: tum quantū eius aridi fuit, tantundem mellis infundere & radiculam miscere, donec similis croco colore fiat, eoq; illinere. Quidam ad eundē usum decoquere simul maluam solent: cum paria pōdera aluminis aridi & mellis miscuerint. Si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt: deinde digiti fouēdi aqua ex verbenis, imponendumq; super medicamentū ita factū: Chalcitis, malicoriū, squama eris excipiuntur fico pingui leniter cocto ex melle. Aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris ignem non experti par modus cerato miscetur ex myrteo factō. Aut eruginis rasæ P. I. ✱. squamæ P. II. ✱. mellis cyatho coguntur, aut pares portiones miscentur, saxi calcis, chalcitidis, auripigmenti. Quicquid horū impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est, tertio die digitus resoluendus est. Si quid aridi est, iterum excidendum, similisq; adhibenda curatio est. Si non vincitur, purgandus scalpello, tenuibusq; ferramētis adurendus est, & sicut reliqua vsta curandus est. At vbi scabri ungues sunt, circumaperiri debēt,

B 3 quā

quà corpus contingunt, tunc super eos ex hac
compositione aque imponi sandaracæ, sulphuris,
singulorum P. I I. ✱. nitri, auripigmenti, singu-
* aliàs, lorum ✱ P. I I. ✱. resinæ liquidæ P. V I I I. ✱. Ter-
P. I I I I. tioq; id die resoluendum est. Sub quo medicamen-
to vitiosi vngues cadunt, & in eorum locum
meliores renascuntur.

LIBER VII.

De Chirurgica, & qui in ea claruerint, & qualis
esse Chirurgus debeat, & quid in hoc
libro describatur.



ERTIAM esse medicinæ partem,
quæ manu curet, & vulgo notum,
& à me propositum est. Ea non qui-
dem medicamenta atq; victus ra-
tionem omittit, sed manus tamen plurimum præ-
stat, estq; eius effectus inter omnes medicinæ
partes evidentissimus. Siquidem in morbis cum
multum fortuna conferat, eademq; sæpe saluta-
ria, sæpe vana sint, potest dubitari secunda va-
letudo medicinæ, an corporis beneficio contigerit.
In his quoque, in quibus medicamentis maxi-
me nitimur, quamvis profectus evidentior est,
tamen sanitatem & per hæc frustra quæri, &
sine his reddi sæpe manifestum est. Sicut in ocu-
lis quoque deprehendi potest, qui à medicis diu
vexati, sine his interdum sanescunt. At in ea par-
te, quæ manu curat, evidens est, omnem profectum,
ut aliquid ab alijs adiuvetur, hinc tamen pluri-
mum

num trahere. Hæc autem pars cum sit vetustissima, magis tamen ab illo parente omnis medicine Hippocrate, quam à prioribus exculta est. Deinde posteaquàm diducta ab alijs habere professores suos cœpit, in Aegypto quoq; increvit, Philoxeno maxime autore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque & Sostratus, & Hieron, & Apollonij duo, & Ammonius Alexandrinus, multiq; alij celebres viri, singuli quedam repperunt. Ac Romæ quoq; non mediocres professores, maximeq; nuper Tryphon pater, & Euelpistus, & ut ex scriptis eius intelligi potest, horum eruditissimus Meles, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei discipline adiecerunt. Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certè adolescentiæ propior, manu strenua, stabili, nec unquam intremescente, eaq; non minus sinistra, quam dextra promptus, acie oculorum acri, claraq; animo intrepidus, immisericors, sic ut sanari velit eum, quem accipit, non ut clamore eius motus, vel magis quam res desiderat, properet, uel minus quam necesse est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex uagitibus alterius affectus oriat. Potest autem requiri, quid huic parti proprie vendicandum sit, quia vulnorum quoq; ulcerumq; multorum curationes, quas alibi executus sum, chirurgi sibi vendicant. Ego eundem quidem hominem posse omnia ista præstare concipio. Atq; ubi se diuiserunt, eum laudo, qui

B 4 quàmpl

quàmplurimum percipit. Ipse autem huic parti ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus, non accipit, & in quibus vulneribus vlceribus'ue plus perfici manu, quàm medicamento credo: tum quicquid ad ossa pertinet, quæ deinceps exequi adgrediar, dilatisq; in aliud volumen ossibus, in hoc cætera explicabo: præpositisq; his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent, transibo.

De Luxatis.

CAP. I.

Luxata igitur, in quacunq; parte corporis sunt, quamprimū sic curari debent, ut quā dolor est, eā scalpello cutis crebro incidatur, detergaturq; eodem aduerso profluens sanguis. Quod si paulò tardius subuenitur, iamq; etiam rubor est, quæ rubet corpus, si tumor quoq; accessit, quacunq; is est, id optimū auxilium est. Tum superdanda reprimētia sunt: maximeq; lana succida ex aceto & oleo. Quod si leuior is casus est, possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est, cinis quoque maxime ex sarmentis. Si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

De his quæ per se intumescunt, quomodo excidenda, & curanda sint.

CAP. II.

Verum hoc quidem promptū est. In his autem negotium maius est, quæ per se vitio intus orto intumescunt, & ad suppurationē spectant. Ea omnia genera abscessū esse aliàs proposui, medicamentaq; eis idonea executus sum.

Nunc

Nunc superest, ut dicam in iisdem quæ manu fieri debeant. Ergo priusquam indurescant, cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet, quæ quicquid illuc malæ corruptæq; materiæ coit, extrahat, idq; iterum tertioq; recte fit, donec omne indicium inflammationis excidat. Neq; tamen fas non est, nihil cucurbitula agere. Interdum enim, sed raro quicquid abscedit, velamento suo includitur, id antiqui tunicam nominabāt. Tunica.

Meges, quia tunica omnis nervosa est, dicit non nasci sub eo vitio nervum, quo caro consumeretur, sed subiecto iam vetustiore pure callum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo loco pertinet, quia quicquid dixi, si tunica est, idem si callus est, fieri debet. Neque vlla res prohibet, etiam si callus est, tamen quia cingit, tunicam nominari. Tum pure quoq; maturiore hæc interdum esse consuevit. Ideoq; quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. Sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo siue id incidit, siue iam durties est, in hac auxilij nihil est. Et ut alias scripsi, vel auertenda concurrens eò materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda est. Si priora contigerunt, nihil præter ea necessarium est. Si pus maturuit in alis quidem & in inguinibus, raro secandum est. Item ubicunque mediocris abscessus est. Item quoties in summa cute, vel etiam carne vitium est, nisi festinare curantis imbecillitas cogit. Satisq; est cataplasmata efficere,

B S ut

ut per se pus aperiatur. Nam fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. Si autē altius malum est, considerari debet, nervosus ne is locus sit, an non sit. Nam si sine nervis est, candenti ferramento aperiri debet. Cuius hæc gratia est, quòd exigua plaga diutius ad pus euocandum patet, paruaq; postea cicatrix fit.

* ignis a- At si nervi iuxta sunt, * in his periculum est, ne
 * lienis est vel distendantur hi, vel membrum debilitent. Neccessaria verò opera scalpelli est. Sed cetera etiam subcruda aperiri possunt. Inter nervos verò vltima expectanda maturitas est, quæ cutem extenuet, eiq; pus iungat, quòd propius reperia-

* alia tur. Itemq; * aliam rectam plagam desiderant in carne, quia fere vehementer cutem extenuat, tota ea super pus excidenda est. Semper autem ubi scalpellus admouetur, id agendum est, ut & quamminime, & quamparcissime plagæ sint: cum eo tamen ut necessitati succurramus & in modo & in numero. Nam maiores sinus, latius interdum etiam duabus aut pluribus lineis incidendi sunt. Dandaq; opera, ut imus sinus exitum habeat, nequis humor intus subsidat, qui proxima et adhuc sana rodendo sinuet. Est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit. Nam ubi post longos morbos totus corporis habitus vitiatus est, lateq; se sinus diffundit, & in eo pars cutis pallet, scire licet eam iam emortuam esse, & inutilem futuram. Ideoq; excidere commodius est, maxime si circa articulos maiores

id

id euenit, cubantemq; egrū fluens alius ⁊ exera *exhauri-
cuit, neq; per alimenta quicquam corpori acce-
dit. Sed excidi ita debet, vt plaga ad similitudi-
nem myrtei folij fiat, quo facilius sanescat. Idq;
perpetuum est. Vbiq; medicus ex quacunque
caussa cutem excidit, pure effuso in alis vel in-
guinibus, linamento opus non est. Spongia ex ui-
no imponenda est. In ceteris partibus, si æquè ea
linamenta supernacua sunt, purgationis caussa
paulum mellis infundendum, dein glutinanti a su-
pèr danda. Si illa necessaria sunt, super ea quoq;
similiter dari spongia eodem modo ex vino ex-
pressa debet. Quando autem linamentis opus sit,
quando non sit, aliàs dictum est. Cetera eadem,
incisa suppuratione, facienda sunt, quæ vbi per
medicamenta rupta est, facienda esse proposui.

De bonis malisue signis exulceratorum.

C A P. III.

PRotinus autem quantum curatio efficiat,
quantumq; aut sperari aut timeri debeat,
ex quibusdam signis intelligi potest, fereq; ijs-
dem quæ in vulneribus exposita sunt. Nam bo-
na signa sunt, somnum capere, facile spirare, siti
non confici, cibum non fastidire, si febricula fuit,
ea vacare. Itemq; habere pus album, leue, non
fædi odoris. Mala sunt, vigilia, spiritus graui-
tas, sitis, cibi fastidium, febris, pus nigrum, aut
feculentum, ⁊ fædi odoris. Item procedente cu-
ratione eruptio sanguinis: aut si antequàm sinus
carne impleatur, oræ carnosæ fiunt. Illa quoque
ipsa

ipsa carne hebetē nec firma, deficere tamen animam, vel ipsa curatione vel postea, pessimum omnium est. Quinetiā morbus ipse siue subito solutus est, dein suppuratio exorta est, siue effuso pure permanet, non iniuste terret. Estq; inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium non est. Sed ut hæc ipsa fortuna huc illuc ue discernit, sic medici partitū est, eniti ad reperiendā sanitatē. Ergo quoties vlcus resiliuerit, eluere id: si reprimendus humor videbitur, vino ex aqua pluuiatili misto, vel aqua in qua lenticula cocta sit, debebit. Si purgandū erit, mulso: rursusq; imponere eadē. Vbi iam repressus videbitur humor, vlcusq; purum erit, produci carnem conueniet, & foueri vulnus pari portione vini ac mellis, superq; imponi spongia ex vino & rosa tincta. Per quæ cum caro producat, plus tamen (ut aliās quoq; dixi) victus ratio eo confert, id est solutis iam febribus & cibi cupiditate reddita, balneum rarum, quotidiana, sed lenis gestatio, cibi potionesq; corpori reficiendo. Apteq; omnia quæ per medicamenta suppuratione quoq; rupta sequuntur, sed quia magno malo vix sine ferro mederi licet, in hunc locum reseruata sunt.

De Fistulis.

CAP. IIII.

ADuersus Fistulas quoq; si altius penetrāt, ut ad vltimas demitti collyrium non possit, si tortuose sunt, si multiplices, maius in manu quàm in medicamentis præsidium est, minusq; operæ est, si sub cute transuersæ feruntur, quàm si recte

recte intus tendunt. Igitur si sub cute transuersa fistula est, demitti specillum debet, supraq; id ea incidi: si flexus reperiuntur, hi quoq; simul specillo & ferro persequendi sunt. Idemq; faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fistulae ventum est, excidendus ex toto callus est, superq; fibulae dandae, & medicamentum quo glutinetur. At si recta subter tedit, ubi, quò maxime ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet, dein fibula oris cutis iniicienda est, & aequae glutinantia medicamenta superdanda sunt. Aut si corruptius vlcus, quod interdum offe-
rtiatio fit, ubi id quoq; curatum est, pus mouentia. Solent autem inter costas fistulae subter exire, quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte decidenda & eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur: solent ubi costas transierunt, septum id, quod transuersum à superioribus visceribus intestina discernit, violare. Quod intelligi & ex loco, & ex magnitudine doloris potest, & quia nonnunquam spiritus eo, cum humore quasi bullate prorumpit, maximeq; si hunc ore ille continuit. In eo medicamini locus nullus est. In ceteris verò quae circa costas sanabilia sunt, pingua medicamenta inimica sunt, ceteris quae ad vulnera accommodantur, uti licet. Optime tamen sicca linamenta, vel si purgandum aliquid videtur, in melle tincta imponuntur. Ventrì nullum os subest, sed ibi perniciose admodum fistulae fiunt, adeo ut Sostratus insanabiles esse credider

diderit. Id non ex toto ita se habere vsus ostēdit. Et quidē (quod maxime mirum videri potest) tutior fistula est contra iecur, & lienem, & ventriculū, quā cōtra intestina: non quo perniciosior res ibi sit, sed quo alteri periculo locū faciat. Cuius experimento moti quidam autores parum modum rei cognouerūt. Nam venter saepe etiam telo perforatur, prolapsaq; intestina conduntur, & oras vulneris suturae comprehendunt, quod quemadmodū fiat mox indicabo. Itaq; etiam vbi tenuis fistula abdomen perrumpit, excidere eam licet, suturaq; oras coniungere. Si verò ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi magna vi utiq; ab interiore parte sui non potest, qua quasi membrana quaedam finit abdomen, quam *πεγίτωναίου* Graci vocant. Ergo vbi aliquis ingredi ac moueri cœpit, rumpitur illa sutura, atque intestina soluuntur. Quo fit, vt pereundum homini sit. Sed non omni modo res ea desperationem habet. Ideoq; tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

De ani fistulis.

Propriā etiamnum animaduersionē desiderāt ea, quæ in ano sunt. In hac demisso specillo, ad vltimum eius caput incidi cutis debet, dein nouo foramine specillū educi lino sequente, quod in aliam eius partem ob idipsum perforatū coniectum sit. Ibi linum prehendendum, vinciendumq; cum altero capite est, vt laxè cutem, quæ super fistulā est, teneat. Idq; linum esse debet crudum,

dum, & duplex triplex'ue, sic tortum vt vnitas
facta sit. Interim autem licet negotia agere, am-
bulare, lauare, cibū capere perinde atq; sanissi-
mo. Tantummodo id linum bis die saluo nodo du-
cenāū est, sic vt subeat fistulā pars quæ superior
fuerit. Neq; committendū est, vt id linum putre-
scat. Sed tertio quoq; die nodus resoluendus est,
& ad caput alterum recens linum alligandum,
eductoq; vetere, id in fistula cum simili nodo re-
linquendū. Sic enim id paulatim cutem, quæ su-
pra fistulam est incidit, simulq; & id sanescit,
quod à lino relictum est, & id quod ab eo mor-
detur, inciditur. Hæc ratio curationis longa, sed
sine dolore est. Qui festinat, astringere cutem li-
no debet, quo celerius secet, noctuq; penicillo te-
nuia quedam intus demittere, vt cutis hoc ipso
extenuetur, quo extenditur. Sed hæc dolorem mo-
uent. Adijcitur celeritati* sic, vt tormento quoq; *sicuā
si & linum & id quod ex penicillo est, aliqua
medicamēto illinitur, ex his quibus callum exe-
di posui. Poterit tamen fieri vt ad scalpelli cura-
tionem etiam illò loci veniendum sit, si intus fi-
stula fert, si multiplex est. Igitur in hæc genera
demisso specillo duabus lineis incidenda cutis est,
vt mediæ inter eas habenula tenuis admodum
eijciatur, ne protinus ora coeant, sitq; locus ali-
quis linamentis, quæ quàm paucissima super-
inijcienda sunt, omniaq; eodem modo facienda,
qui in abcessibus positus est. Si vero ab vna
ore plures sinus erunt, recte fistula scalpello erit
incid

incidenda, ab eo ceteræ quæ iam patebunt *line* excipiendæ: si intus aliqua procedet, quò ferrum tuto peruenire non poterit, collyrium demittendum erit. Cibus autem in omnibus eiusmodi casibus, siue manusiue medicamenti agetur, dari debet humidus, potio liberalis, diuq; aqua: ubi iam caro increscit, tum demum & balneis raris utendum erit, & cibus corpus implentibus.

De Telis è corpore extrahendis.

Tela quoque quæ illata corporibus intus hæserunt, magno negotio sæpe eijciuntur. Suntq; quædã difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus, in quas illa penetrarunt. Omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte qua venit, aut ab ea in quam tetendit. Illic viam qua redeat, ipsum sibi fecit. Hic à scalpello accipit. Nam contra mucronem caro inciditur. Sed si non alte telum insedit, & in summa est, aut certe magnas venas et loca nervosa non transfuit, nihil melius est, quàm quàm venit, id euellere. Si vero plus est per quod telo reuertendum, quàm quod perrumpendum est: iamq; venas nervosq; id transit, commodius est aperire quod superest, * itaq; extrahere. Nam & propius petitur & tutius euellitur, & in maiore membro si medium mucro transfuit, facilius sanescit quod peruium est, quia vtrinq; medicamento fouetur. Sed si retro telum recipiendum est, amplianda scalpello plaga est, quo facilius id sequatur, quoq; minor oriatur inflammatio: quæ maior fit, si ab illo ipso telo dum redit,

dit, corpus laniatur. Itē si ex alia parte vulnus
aperitur, laxius esse debet, quā ut telo postea
transiente amplietur. Summa autem utraque
parte ita habenda cura est, ne nervus, ne vena
maior, ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid
detectum est, excipiendum hamo retuso est, ab-
ducendumq; scalpello. Vbi autem satis incisum
est, telum eximendū est, tum quoq; eodem modo
et eadē cura habita, ne sub eo quod eximetur,
aliquid eorum ledatur, quæ tuenda esse propo-
sui. Hæc communia sunt. Propria quædā in singu-
lis telorum generibus subiicienda sunt, quæ proti-
nus subiiciam. Nihil tam facile in corpore quā
sagitta conditur, eademq; altissime insidit. Hæc
autem eveniunt, et quia magna vi fertur illa,
et quia ipsa in angusto est. Sæpius itaq; ab al-
tera parte, quā ex qua venit recipienda est,
precipueq; quia fere spiculis cingitur, quæ ma-
gis laniant, si retro, quā si contrā trahuntur.
Sed inde aperta via, caro diduci debet ferramen-
to ad similitudinem facto Græcæ literæ ϕ. Dein-
de ubi apparuit, si mucro, si arundo inheret, pro-
pellenda est, donec ab altera parte adprehendi
et extrahi possit. Si iam illa decidit, solumq;
intus ferrum est, mucro vel digitis adprehendi,
vel forfice, atque ita educi debet. Neque alia ra-
tio extrahendi est, ubi ab ea parte qua venit,
euelli magis placuit. Nam ampliato vulnere, aut
arundo, si inest, euellenda est: aut si ea non est,
ferrum ipsum. Quod si spicula apparuerunt, eaq;
c brenia

breuia & tenuia sunt, forfice ibi communi debent, vacuumq; ab his telum educi: si ea maiora valentioraq; sunt, fissis scriptorijs calamis contigenda, ac ne quid lacerent, sic euellenda sunt. Et in sagittis quidem hæc observatio est. Latum vero telum si conditum est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere ipsi quoque ingens vulnus adijciamus. Euellendum est ergo genere quodam ferramenti, quod Diocleus Græci graphiscum vocant, quoniam autorem Dioclem habet, quem inter priscos maximosq; medicos fuisse iam posui. Lamina vel ferrea vel ænea etiam ab altero capite duos utrinq; deorsum conuersos uncas habet, ab altero duplicata lateribus leuiterq; extrema in eam partem inclinata, quæ sinuata est, insuper ibi etiam parte inclinata, quæ perforata est. Hæc iuxta telum transversa demittitur. Deinde ubi ad imum mucronem ventum est, paulum torquetur, ut telum foramine suo excipiat. Cum in cauo mucro est, ilico duo digiti subiecti partis alterius uncis, simul & ferramentum id extrahunt & telum. Tertium genus telorum est, quod interdum euelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute, integrum intus insedit. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idq; quod inest, eà quâ venit, forfice extrahendum est. Accedit verò aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum vel ossi inhaesit, vel in articulo se inter duo ossa demersit, in osse usq; eo mouendum

mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit, & tum vel manu vel forfice telum extrahendum est, quæ ratio in dentibus quoq; eijciendis est. Et vix unquã ita telum non sequitur. Sed si morabitur, excuti quoq; ictum aliquo ferramẽto poterit. Vltimum est, vbi non euellitur, terebra iuxtã forare, ab eo quoq; foramine ad speciem literæ ¶ contra telũ os excidere, sic vt lineæ quæ deducũtur ad telum spectent, eo facto id necesse est labet, et facile auferatur. Inter duo verò ossa si per ipsum articulum perruperit, circa vulnus duo membra fascijs habenis'ue deligãda, & per has in diuersas partes diducenda sunt, vt nervos distendat. Quibus extẽtis laxius inter ossa spatium est, vt sine difficultate telũ recipiatur. Illud videndum est, sicut in alijs locis posui, ne quis neruus, aut vena, aut arteria à telo ledatur, dum id extrahitur, eadem scilicet ratione quæ supra posita est. At si venenato quoq; telo quis ictus est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis adiicienda curatio est, quæ vel epoto veneno, vel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autẽ ipsius extracto telo medicina nõ alia est, quàm quæ esset, si corpore icto nihil inhaesisset. De qua satis alio loco dictum est.

De Gangliis, & Meliceride, & Atheromate, & Steatomate capitis tuberculis. C A P. VI.

HAec venire in qualibet parte corporis possunt. Reliqua certas fedes habent, de quibus dicam, orsus à capite. In hoc multa va-

C 2 riaq;

riaq; tubercula oriuntur, γάρρλια, μελινγκίδας,
 & ἀθερώματα nominant, alijs q; etiamnum vo-
 cabulis quædam alijs discernunt, quibus ego τει-
 τώματα quoque adijciam. Quæ quamuis & in
 ceruice et in alis & in lateribus oriri solent, per
 se tamē non posui, cum omnia ista mediocres dif-
 ferentias habeant, ac neq; periculo terreant, neq;
 diuerso genere curentur. Omnia autem ista &
 ex paruulo incipiunt, & diu paulatimq; incre-
 scunt, & tunica sua includuntur. Quædā ex his
 dura ac renitentia, quædam mollia cedentiaq;
 sunt: quædam spatio nudantur, quædam tecta ca-
 pillis suo permanent, fereq; sine dolore sunt. Quid
 intus habeant, vt coniectura præfagiri potest, sic
 ex toto cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest.
 Maxime tamen in his quæ renituntur, aut lapil-
 lis quædam similia, aut cōcreti conferti q; pili re-
 periuntur. In his verò quæ cedunt, aut melli si-
 mile aliquid, aut tenui pulticula, aut quasi rase
 cartilagini, aut carni hebeti, & cruenta, qui-
 bus aliqui colores esse consuerunt, fereq; gan-
 glia renituntur. Atheromati subest, quasi tenuis
 pulticula. Meliceridi liquidior humor, ideoq;
 pressum circumfluit. Steatomati pingue quid-
 dam, idq; latissime patere consuevit, resoluitq;
 totam cutem superpositam, sic, vt ea labet, cum
 in cæteris sit astrictior. Omnia derafa ante, si ca-
 pillis conteguntur, per medium oportet incidere:
 sed steatomatis tunica quoq; secāda est, vt effun-
 datur quicquid intus coit: quia nō facile à cute,
 subiecta

subiecta carne, ea separetur, in ceteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autem alba & intenta se ostendit. Tum scalpelli manubriolo diducenda à cute & à carne est, eijciendaq; cum eo quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte tunica musculus inhaesit, ne is le- datur, superior pars illius decidenda, alia ibi- dem relinquenda est. Vbi tota exempta est, com- mittendæ oræ, fibulaq; his injcienda, & super medicamentum glutinans dandum est. Vbi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est, pus mouentia adhibenda sunt.

De oculorum vitiis quæ scalpello & manu
curantur.

C A P. VII.

Sed ut hæc neq; genere vitij neq; ratione cu- rationis inter se multum distat, sic in oculis, quæ manum postulant, & ipsa diuersa sunt, & aliter aliterq; curantur. Igitur in superioribus palpebris vesicæ nasci solent pingues grauesq;, quæ vix attollere oculos sinunt, leuesq; pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouent. Fere verò in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atq; ita cute inteta, scapello trans- uersam linea incidere, suspensa leuiter manu, ne vesica ipsa vulneretur, & ut locus ei patefa- ctus est, ipsa prorumpat, tum digitis eam appre- hendere oportet, & euellere. Facile autem sequi- tur. Dein superungi collyrio debet ex his ali- quo, quo lippientes oculi superimunguntur, pau- cissimisq; diebus cicatricula inducitur. Mole-

C 3

stius

stius est, ubi incisa vesica est. Effundit enim humorem, neq; postea, quia tenuis admodum est, potest colligi. Si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendo sunt.

De Crite tuberculo palpebrarum.

IN eadem palpebra super pilorum locum, tuberculum paruulum nascitur, quod à similitudine ordeï, à Græcis *κρίθῃ* nominatur. Tunica quiddam quod difficulter maturescit, comprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde calefacta foueri oportet, sic ne nimius is calor sit, sed facile ea parte sustineatur. Hac enim ratione sæpe discutitur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello diuidi debet, & quicquid intus humoris est exprimi. Eodem deinde vapore postea quoq; foueri, & superinungi, donec ad sanitatem perueniat.

De Chalazio palpebrarum.

ALia quoq; quedam in palpebris huic non dissimilia nascuntur, sed neq; utiq; figure eiusdem, & mobilia simul atque digito huc vel illuc impelluntur. Ideoq; ea *χαλᾶζία* vocant. Hec incidi debent, si sub cute sunt, ab exteriori parte: si sub cartilagine, ab interiori. Dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt. Ac si intus plaga est, inungendum primo lenibus, deinde acrioribus. Si extrâ, superdandum emplastrum, quo id glutinetur.

De vngue oculorum, quod *πτερυγιον*
Græcis vocatur.

Vnguis

Vnguīs verò, quod pterygion Græci vocant, est membranula nervosa oriens ab angulo, quæ nonnunquā ad pupillam quoq; pervenit, eiq; officit. Sæpius à nariū, interdū etiam à temporum parte nascitur. Hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur. Si inueteravit, iāq; ei crassitudo quoq; accessit, excidi debet. Post abstinentiam verò unius diei, vel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est, vel sic auersus, ut in gremium eius caput resupinus effundat. Quidam si in sinistro oculo vitium est, aduersum: si in dextro resupinum collocari volunt. Alteram autem palpebram à sinistro diduci oportet, alteram à medico. Sed ab hoc, si ille aduersus est, inferiorem: si supinus, superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum paulum mucrone intus recuruato subijcere extremo vngui debet, eumq; infigere, atq; eā quoq; palpebrā tradere alteri, ipse hamulo apprehenso leuare vnguē, eūq; acu traicere linum trahente. Deinde acum ponere, lini duo capita apprehendere, & per ea erecto vngue, si qua parte oculo inhaeret, manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum veniat. Deinde, inuicem modo remittere, modo attrahere, ut sic & initium eius, & finis anguli reperiatur. Duplex enim periculum est, ne vel ex vngue aliquid relinquatur, quod exulceratum vix vllam recipiat curationem, vel ex angulo quoq; caruncula abscindatur,

tur, quæ si vehementius unguis ducitur, sequitur.
 Ideoq; decipit: ac si abscissa est, patescit foramen,
 * *ῥυπαῖδα* per quod postea semper humor descēdit, * *ῥυαῖδα*
 Græci vocant. Verus ergo anguli finis utiq; no-
 scendus est, qui ubi satis constitit, non nimis ad-
 ducto ungue scalpellus adhibendus est, deinde
 excidenda ea membranula, ne quid ex angulo
 lædatur. Eo deinde ex melle linamentum super-
 dandum est, supraq; linteolum & aut spongia,
 aut lana succida, proximisq; diebus diducendus
 quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpe-
 bræ glutinentur. Siquidem id quoq; tertium pe-
 riculum accedit, eodemq; modo linamētum im-
 ponendum, ac nouissime inungendum collyrio,
 quo ulcera ad cicatricem perducuntur. Sed ea cu-
 ratio * *verna* ratio * vere esse debet, aut certe ante hyemem.
 De qua re ad plura loca pertinente semel dixis-
 se satis erit. Nam duo genera curationum sunt.
 Alia in quibus eligere tēpus non licet, sed uten-
 dum est eo, quod incidit, sicut in vulneribus, &
 in fistulis. Alia in quibus nullus dies vrget, &
 expectare tutissimū & facile est, sicut euenit in
 ijs, quæ & tarde increscunt, & dolore non cru-
 ciant, in his ver expectādū est. Aut si quid ma-
 gis pressit, melior tamē autūnus vel æstas, quā
 hyems est. Atq; is ipse medius, iā fractis æstati-
 bus, nōdū ortis frigoribus. Quo magis aut neces-
 saria pars erit, quæ tractabitur, hoc quoq; ma-
 iori periculo subiecta est, et sæpe quo maior pla-
 ga faciēda, eo magis hæc tēporis ratio seruabit.

De

De Encanthide, tuberculo.

EX curatione verò vnguis, vt dixi, vitia nascuntur, quæ ipsa alijs quoq; de causis oriri solent. Interdum enim fit in angulo, parum vngue exciso, vel aliter tuberculū, quod palpebras parum diduci patitur, ἐγκανθὶς Græce nominatur. Excidi hamulo & circuncidi debet, hinc quoq; diligenter temperata manus, ne quid ex ipso absindat. Tum exiguum linamentum respergendum est, vel cadmia, vel atramento sutorio, inq; eum angulum diductis palpebris inserendum, supraq; eodē modo deligandum, proximisq; diebus similiter nutriendum, tantum vt primus aqua egelida, vel etiam frigida foueatur.

De Ancyloblepharo oculorum vitio.

Interdum inter se palpebræ coalescunt, apeririq; non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere, vt palpebræ cum albo oculi coherescant: scilicet cum in utroq; fuit vlcus negliger curatum. Sanescendo enim quod diduci potuit & debuit, glutinabit, ἀγκυλοβλέφαρον sub utroq; vitio Græci vocant. Palpebræ tātum inter se coherentes, non difficulter diducuntur, sed interdum frustra, nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet, quia bene res sæpius cedit. Igitur aduersum specillum inferendum, diducendaq; eo palpebræ sunt, deinde exigua penicilla interponēda, donec exulceratio eius loci finitur. Aut vbi albo ipsius oculi palpebra inhæsit, Heraclides Tarentinus autor est, aduerso scal-

C S pello

pello subsecare magna cum moderatione, ut neq;
ex oculo, neq; ex palpebra quicquā abscindatur:
ac si necesse est, ex palpebra potius. Post hæc in-
ungatur oculus medicamentis, quibus aspritudo
curatur, quotidieq; palpebra vertatur, non solū
ut ulceri medicamentū inducatur, sed etiam ne
rursus inhaereat, ipsiq; etiam præcipiatur, ut sæ-
pe eam duobus digitis attollat. Ego sic restitutum
esse neminē memini. Meges se quoq; multa ten-
tasse, neq; vnquam profuisse, quia semper iterum
oculo palpebra inhaerit, memoriæ prodit.

De Aegilopa, fistula oculorum.

Etiamnum in angulo, qui naribus propior
est, ex aliquo vitio quasi parua fistula a-
peritur, per quam pituita assidue distillat, αἰγί-
λοπα Græci vocāt, idq; assidue male habet ocu-
lum, nōnunquam etiam exeso osse vsq; ad nares
penetrat, idq; interdum naturam carcinomatis
habet. Vbi intētæ venæ & recuruatæ sunt, color
pallet, cutis dura est, & leui tactu irritatur, in-
flammationēq; in eas partes, quæ cōiunctæ sunt,
euocat. Ex his eos qui quasi carcinoma habent,
curare periculosum est. Nā mortem quoq; ea res
maturat. Ea verò quibus ad nares tendit, super-
uacūū: neq; enim sanescunt. At quibus id in an-
*eo, ne gulo est, potest adhiberi curatio, cum*eam non
ignotum sit esse difficilem, quantoq; angulo pro-
pius id foramen est, tātō difficilior est, quoniam
perangustum est in quo versari manus possit.
Recenti tamē re mederi facilius est. Sed hamulo
summ

summum eius foraminis excipiendum, deinde totum id cauum, sicut in fistulis dixi, usque ad os excidendum, oculoque et cæteris iunctis partibus bene obteclis, os ferramento adurendum est vehementius. Quod si iam carie vexatum est, quo crassior his squama accedat, quidam adurentia imponunt, ut atramentum sutorium, vel chalcitidem, vel æruginem rasam. Quod et tardius et non idem facit. Osse adusto curatio sequitur eadem, que in cæteris vstis.

De Pilis palpebrarum oculum irritantibus.

Pili verò qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consueverunt. Nam modo palpebræ superioris summa cutis relaxatur, et procidit: quo fit, ut eius pili ad ipsum oculum conuertantur, quia non simul cartilago quoque se remisit. Modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrescit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes verò hæc sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tenuis acus ferrea ad similitudinem hastæ lata, in igne coniicienda est. Deinde candens sublata palpebra sic, ut eius perniciosi pili in conspectu curantis veniant, sub ipsis pilorum radicibus ab angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ transuat. Deinde iterum tertioque usque ad alterum angulum. Quo fit, ut omnes pilorum radices adustæ emoriantur. Tum superimponendum medicamentum est, quod inflammationem prohibeat, atque ubi crustæ exciderunt, ad cicatricem perducendum. Facilime
antem

autem id genus sanescit: quidā aiunt acu transui
iuxta pilos in exteriorē partem palpebræ opor-
tere, eāq; transmitti duplicē capillū muliebrem
ducentem: atq; vbi acus transyt, in ipsius capilli
sinum, quā duplicatur, pilū esse inijciendum, &
per eum in superiorē palpebræ partem attrahen-
dum, ibiq; corpori adglutinandū & imponendū
medicamētum, quo foramen quoq; glutinetur: sic
enim fore, vt is pilus in exteriorē partem postea
spectet. Id primū fieri non potest, nisi in pilo lon-
giore, cum fere breues eo loco nascantur. Deinde
si plures pili sunt, necesse est longū tormentum,
cum toties acus transuet, magnam inflammatio-
nem moueat. Nouissime cum humor aliquis ibi
subsit, oculo & antè per pilos, & tum per pal-
pebræ foramina affecto, vix fieri potest, vt glu-
ten, quo vinctus est pilus, non resoluatur. Eoq;
fit, vt is eò vnde vi abductus est, redeat. Ea verò
curatio, quæ palpebræ laxioris ab omnibus fre-
quentatur, nihil habet dubij. Siquidem oportet
contecto oculo mediā palpebræ cutem, siue ea su-
perior, siue inferior est, apprehendere digitis, ac
leuare, tum considerare quantulo detracto futu-
rum sit, vt naturaliter se habeat. Siquidem hic
quoq; duo pericula circūstant: si nimium fuerit
excisum, ne contegi oculus non possit: si parum,
ne nihil actum sit, & frustra sectus aliquis sit.
Quā deinde incidendum videbitur per duas li-
neas atramento notandū est, sic vt de interiore
quæ pilos continet, & propiore ei linea aliquid
relinq

reliquatur, quod apprehendere acus postea possit. His constitutis scalpellus adhibendus est, & si superior palpebra est, antè: si inferior, postea propius ipsis pilis incidendum, initiumq; faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo qui temporis: in dextro, ab eo qui naribus propior est, idq; quod inter duas lineas est, excidendum. Deinde ora vulneris inter se simplici sutura committendæ, operiendusq; oculus est: & si parum palpebra descendet, laxanda utiq;: si nimium, aut astringenda, aut etiam rursus tenuis habenula ab ulteriore ora excidenda. Vbi secta est, alia suturæ adijciendæ, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent. Idq; si levis inclinatio est, etiam solum satis tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, spōgia ex aqua frigida expressa super deliganda est. Postero die glutinans emplastrum inijciendum. Quarto sutura tollenda est, & collyrio quod inflammationes reprimat, superinungendum.

De Lagophthalmo oculorum.

Nonnunquam autē nimium sub hac curatione excisa cute euenit, ut oculus non contegatur. Idq; interdum etiā alia de causa fit, *λαγώφθαλμος* Græci appellant. In quo si nimium palpebræ decest, nulla id restituere curatio potest. Si exiguum, mederi licet, paulum infra supercilium cutis incidenda est lunata figura, cornibus

nibus eius deorsum spectantibus. Altitudo esse plagæ usq; ad cartilaginē debet, ipsa illa nihil læsa. Nam si ea incisa est, palpebra cōcidit, neq; attolli postea potest. Cute igitur tantum diducta sit, ut paulum in ima oculi ora descendat, hiantē scilicet sup̄er plagā, in quā linamentū cōiūciendum est, quod & cōiungi diductam cutē prohibeat, et in medio carunculam citet: quæ ubi eum locum impleuit, postea rectē oculus operitur.

De Ectropio.

VT superioris autem palpebræ vitium est, quod parum descendit, ideoq; oculum non contegit, sic inferioris, quod parū sursum attollitur, sed pendet & hiat, neq; potest cum superiore committi. Atq; id quoq; evenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute, ἐκτροπίου Graci vocant. Si ex mala curatione est, eadem ratio medicinae est, quæ supra posita est, plagæ tantum cornua ad maxillas, non ad oculum conuertenda sunt. Si ex senectute est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est, deinde melle inungendum, & quarto die vapore aquæ calidæ fouēdum inungendumq; medicamentis ad cicatricem perducentibus.

De Staphylomate oculi.

Hæc fere circa oculum in angulis palpebrisq; incidere cōsueverunt. In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, & similis figura acino fit. Vnde id σταφύλωμα Graci

Græci vocāt. Curatio duplex est. Altera ad ipsas radices per medium transuere acu duo lina ducente. Deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex interiore astringere inter se, quæ paulatim secando id excidunt. Altera in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem excidere, deinde spodium aut cadmiam infricare. Vtrobilibet autem facto, album oui lanæ excipiendum & imponendum, posteaq; vapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis vngendus est.

De Clauis oculorum.

Clavi autem vocantur callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figura similitudine est. Hos ad imam radicem perforare acu commodissimum est, infraq; eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

De natura oculorum, & eorum suffusione.

Suffusionis iam aliàs feci mentionē, quia cum recēs incidit, medicamentis quoq; sæpe discutitur. Sed vbi vetustior facta est, manus curationem desiderat, quæ inter subtilissimas haberi potest. De qua antequā dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. Cuius cognitio, cū ad plura loca pertineat, tum vel præcipuè ad hunc pertinet. Is igitur summas habet duas tunicas, ex quibus superior à Græcis νεφροειδής vocatur. Ea qua parte alba est, satis crassa, pupillæ loco extenuatur. Huic inferior adiuncta est media parte, qua pupilla est, modico foramine concava, circa

circa tenuis, vltioribus partibus ipsa quoque
 *χοροειδής plenior, quæ *παρχοειδής à Græcis nominatur. Hæ
 duæ tunice cum interiora oculi cingant, rursus
 sub his coeunt, extenuatæq; in vnum coactæ,
 per foramen, quod inter ossa est, ad membranam
 cerebri perueniunt, eiq; inhaerescunt. Sub his au-
 tem qua parte pupilla est, locus vacuus est. De-
 inde infra rursus tenuissima tunica quæ Hero-
 philus παρχοειδής nominauit. Ea media subsi-
 dit, eoq; cauo cōtinet quiddā, quod à vitri simi-
 litudine ὑαλοειδής Græci vocant. Id neq; liqui-
 dum, neq; aridū est, sed quasi cōcretus humor, ex
 cuius colore pupillæ color vel niger est, vel cæ-
 sius, cū summa tunica tota alba sit. Id aut super-
 ueniens ab interiore parte mēbranula includit,
 sub his gutta humoris est, oui albo similis, à qua
 videndi facultas proficiscitur, χευσαλοειδής à
 Græcis nominatur. Igitur vel ex morbo vel ex
 iclu cōcreuit humor sub duabus tunicis, quā lo-
 cum vacuum esse proposui: isq; paulatim indu-
 rescens interiori potētiae se opponit. Vitijq; eius
 plures species sunt, quædam sanabiles, quædam
 quæ curationem non admittunt. Nam si exigua
 suffusio est, si immobilis, colorē verò habet ma-
 rinae aquæ, vel ferri nitentis, & à latere sensum
 aliquem fulgoris relinquit, spes superest. Si ma-
 gna est, si nigra pars oculi amissa naturali figu-
 ra in aliā vertit, si suffusioni color ceruleus est,
 aut auro similis, si labat, & hac atq; illac mo-
 uetur, vix vnquam succurritur. Fere verò peior
 est,

est, quo ex grauiore morbo, maioribus'ue capitis doloribus, vel ictu vehementiore orta est. Neq; idonea curatio, si senilis ætas est, quæ sine nouo vitio tamen aciem hebetem habet. At ne puerilis quidem, sed inter hæc media ætas. Oculus quoque curationi neq; exiguus, neque concauus satis opportunus est, atq; ipsius suffusionis quædam maturitas est. Expectandum igitur est donec iam non fluere, sed durities quædam concreuisse videatur. Ante curationem autem modico cibo vti, bibere aquam triduo debet, pridie ab omnibus abstinere. Post hæc in aduerso sedili collocandus est loco lucido, lumine aduerso, sic vt contra medicus paulo altius sedeat. A posteriore autem parte caput eius, qui curabitur, minister contineat, & immobile id præstet. Nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. Quin etiam ipse oculus qui curabitur, immobilior faciendus est, super alterũ lana imposita & deligata. Curari verò sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. Tum acus admouenda est, aut acuta, aut forte non nimium tenuis, eaq; demittenda. Sed recta est per summas duas tunicas medio loco inter nigrũ oculi et angulum temporis propiorẽ è regione mediæ suffusionis, sic ne quæ vena ledatur. Neq; tamen timide demittenda est, quia inani loco excipitur. Ad quem cum ventũ est, ne mediocriter quidẽ peritus falli potest, quia prementi nihil renititur. Vbi eo ventum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionẽ est. Leuiterq;

D ibi

ibi uerti & paulatim eam deducere infra regionem pupillæ debet: ubi deinde eam transit, vehementius imprimi ut inferiori parti insadat. Si hæsit, curatio expleta est. Si subinde redit, eadē acus magis cōcidēda, et in plures partes dissipāda est, quæ singulæ & facilius cōduntur, et minus late efficiunt. Post hæc educēda acus recta est, imponendumq; est lana molli exceptū oui album, & supra, quod inflammationē coërceat, atq; ita deuinciendū. Post hæc opus est quiete, abstinentia, lenium medicamentorū inunctionibus, cibo, qui postero die satis mature datur, primū liquido ne maxillæ laborent, deinde inflammatione finita, tali, qualis in vulneribus propositus est. Quibus ut aqua quoq; diutius bibatur, necessario accedit.

De Pituita oculorum.

DE pituita quoque tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus medicamētis agendum est, iam explicui. Nunc ad ea veniam, quæ curationem ex manu postulant. Animaduertimus autē quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore tenui madere, quæ res aspritudinem continuat, ex leuibus momentis inflammationes & lippitudines excitat, totam deniq; vitam hominis infestat. Idq; in quibusdam nulla ope adiuuari potest, in quibusdam sanabile est. Quod primum discrimen est, nosse oportet, ut alteri succurratur, alteri manus non iniiciatur. Ac primum superuacua curatio est in his qui ab infantibus id vitium habent, quia necessario mansurum

surum est usq; mortis diem. Deinde non necessario etiam in his, quibus non multa, sed acris pituita est. Si quidē manu nihil adiuuantur, medicamentis, & victus ratione, quæ crassiorē pituitam reddit, ad sanitatē perueniunt. Lata etiam capita vix medicinæ patent. Tum interest venæ pituitam emittant, quæ inter caluariam & cutē sunt, an quæ inter membranā cerebri, & caluariam. Superiores ferè per tēpora oculos rigant, inferiores per eas membranas, quæ ab oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem adhiberi remedium his, quæ supra os fluunt, non potest his, quæ sub osse. Ac ne his quidem succurritur, quibus pituita vtrinq; descendit, quia leuata altera parte, nihilominus altera infestat. Quid sit autem, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspenditur, à supercilijs usq; ad verticem illini debent. Si sicci oculi esse cœperunt, apparet per eas venas, quæ sub cute sunt, irrigari. Si nihilominus madent, manifestum est sub osse descendere. Si est humor, sed leuior, duplex vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores venæ exerceant, ideoq; pluribus etiam opitulari licet. Idq; non in Græcia tantummodo, sed in alijs quoque gentibus celebre est, adeo ut nulla medicinæ pars magis per nationes quoque exposita sit. Reperti in Græcia sunt, qui nouem lineis cutem capitis inciderent, duabus in occipitio rectis, vna super eas transversa, dein duabus

D 2 bus

bus super aures, una inter eas item transversa, tribus inter verticem & frontem rectis. Reperti sunt, qui à capite recte eas lineas ad tempora diduceret, cognitisq; ex motu maxillarum musculorum initijs, leuiter super eos cutem inciderent, inductisq; per retusos hamos oris infererent linamenta, ut neq; inter se cutis antiqui fines committerentur, & in medio caro incresceret, quæ venas ex quibus humor ad oculos transfret, astringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt à media aure ad mediam alteram aurem, deinde à naribus ad verticem. Tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt, & post sanguine fuso, os ibidem adusserunt. Nihilominus autem & in temporibus, & inter frontem atq; caluariam eminentibus venis idem candens ferrum admovent. Frequens curatio est, venas in temporibus adurere, quæ fere quidem in eiusmodi malo tument, sed tamen ut inflentur magisq; se ostendant, ceruix antè modice deliganda est: tenuibusq; ferramentis, & retusis uenæ adurendæ, donec in oculis pituita cursus conquiescat. Id enim signum est quasi excacatorum itinerum, per quæ humor ferebatur. Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditæq; venæ, ideoq; legi non possunt. Eodem modo ceruice deligata, retentoq; ab ipso spiritu, quo magis venæ prodeant, atramento notare eas contra tempora & inter ceruicem, ac frontem, deinde ceruice resoluta, quæ notæ sunt, venas incidere, & sanguinem mittere.

Vbi

Vbi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. Contra tempora quidem, timide, ne subiecti musculi, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem verò & verticem, vehementer, vt sic squama ab osse recedat. Efficacior tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem vsque ad os adurūt, sic vt squamam remittat. Sed nihil melius est, quàm quod in Gallia quoq; Comata fit, vbi venas in temporibus & in superiore capitis parte legunt. Aduſta quomodo curanda sint, iam explicui. Nunc illud adiſcio, neq; vt crūſtæ decidant, neq; vt vlcus impleatur aduſtis venis eſſe properandum, ne uel ſanguis erumpat, uel cito pus ſupprimatur, cum per hoc ſicceſcere eas partes opus ſit, per illud exhauriri opus non ſit. Si quando tamē ſanguis eruperit, inſtricanda medicamenta eſſe, quæ ſic ſanguinem ſupprimant, ne adurant. Quemadmodum autem venæ deligendæ ſint, quidq; lectis his faciendum ſit, cum venero ad crurum varices, dicam.

De aurium morbis, qui manu & ſcalpello curantur.

CAP. VIII.

V*Erum vt oculi multiplicē curationē, etiam manus exigunt: ſic in auribus admodum pauca ſunt, quæ in hac medicinae parte tractentur. Solet tamen euenire vel à prima natali die protinus, vel poſtea facta exulceratione per cicatricem aure repleta, vt foramen in ea nullum ſit, ideoq; audiendi uſu careat. Quod vbi incidit, ſpecillo tentandum eſt, alte'ne id repletum,*

D 3 an

an in summo tantum glutinatum sit. Nam si altè est, prementi non cedit: si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe distentio oriatur nervorum, & ex ea mortis periculum sit. Hoc facile curatur. Nam quàm cauum esse debet, vel medicamentum aliquod imponendum est ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumq; id patefactum, & iam vlcus purum est, injicienda eò pinna est, illita medicamento cicatricè inducente: circaq; idem medicamentum dandum, vt cutis circa pinnam sanescat: quo fit vt ea remota, postea facultas audiendi sit. At vbi aures, in viro puta, perforatæ sunt, & offendunt, traicere id cauum celeriter candente acu satis, vt leniter eius ora exulcerentur, aut etiam adurente medicamento idem exulcerare, postea deinde imponere id quod purget, tum quod eum locum repleat, & sic cicatricem inducat. Quòd si magnum id foramen est (sicut solet esse in his, qui maiora pondera auribus gesserunt) incidere quod superest ad extremum oportet: suprà deinde oras scalpello exulcerare, & postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire: quæ res cum in labris quoq; & naribus fieri possit, eandem etiam rationem habeat, simul explicanda est.

Curta in auribus, labrisq; ac naribus, quomodo
sarciri, & curari possint.

C A P. IX.

Curta

Curta igitur in his tribus, ac si qua parua
 paria sunt, curari possunt. Si qua maiora
 sunt, aut non recipiunt curationem, aut ita per hanc
 ipsam deformantur, ut minus indecora antè fue-
 rint. Atque in aure quidem & naribus deformi-
 tas sola timeri potest. In labris verò si nimium
 contracta sunt, usus quoque necessarij iactura fit,
 quia minus facile & cibus assumitur, & sermo
 explicatur. Neque enim creatur ibi corpus, sed ex
 vicino adducitur: quod in leui mutatione, &
 nihil eripere, & fallere oculum potest: in magna
 non potest. Neque senile autem corpus, neque quod
 mali habitus est, neque in quo difficulter vlcera
 sanescunt, huic medicinæ idoneum est, quia nus-
 quam celerius cancer occupat, aut difficilior tol-
 litur. Ratio curationis eiusmodi est. Id quod cu-
 ratum est, in quadratum redigere, ab interioribus
 eius angulis lineas transversas incidere, quæ ci-
 teriorem partem ab ulteriore ex toto diducant:
 deinde ea quæ sic*reposuimus, in unum adducere. *resolui-
 Si non satis iunguntur, ultra lineas, quas antè mus
 fecimus alias duas lunatas, & ad plagam con-
 uersas immittere, quibus summa tantum cutis di-
 ducatur. Sic enim fit, ut facilius quod adducitur,
 sequi possit: quod non vi cogendum est, sed ita
 adducendum, ut ex facili subsequatur, & *di- *demiſſum
 missum non multum recedat. Interdum autem ab
 altera parte cutis haud omnino adducta, defor-
 mem quem reliquit locum, reddit. Huiusmodi lo-
 ci altera pars incidenda, altera intacta habenda
 D 4 est.

est. Ergo neque ex imis auribus, neque ex medio naso imis venarum partibus, neque ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. Vtrinque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut medijs naribus, aut medijs labris deerit. Quæ tamen interdum etiam duobus locis curata esse consuerunt. Sed eadem ratio curandi est, si cartilago in eo quod incisum est eminet, exciderda est. Neque enim aut glutinatur, aut acu tuto traicitur. Neque longe tamen excidi debet, ne inter duas oras libera cutis, utrinque coitus puris fieri possit. Tum iunctæ oræ inter se suendæ sunt, utrinque cute apprehensa, & quæ priores lineæ sunt, eâ quoque suturæ injiciendæ sunt. Siccis locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. In vltiores vero lunatasq; plagas linamentum dandum est, ut caro increscens vulnus impleat, summaq; cura quod ita sutum est, tuendum esse, apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. Ergo etiam tertio quoque die fouendum erit uapore aquæ calidæ, rursusq; idem medicamentum injiciendum, fereq; septimo die glutinatum est. Tum suturæ eximi, & vlcus ad sanitatem perducere debent.

De Polypi curatione per ferrum. CAP. X.

Polypum uero, qui in naribus nascitur, præcipue ferro curari iam aliàs posui. Ergo etiam hunc ferramento acuto in modum spathe facto resolvere ab osse oportet: adhibita diligentia

tia, ne infrà cartilago ledatur, in qua difficilis curatio est. Vbi abscissus est, vnco ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentum, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimitur, eoq; nares leniter implenda. Sanguine suppresso, linamento vulnus purgandum est. Vbi purum est, eò pinna eodem modo, quo in aure suprà positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

De Ozæna.

CAP. XI.

ID autem vitium, quod ὀζαίνα à Grecis vocatur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos Chirurgos non reperi. Credo, quia res raro ad sanitatem sat̃ proficit, cum aliquod in ipsa curatione tormentū habeat. Apud quosdam tamen positū est vel sutilem fistulam, vel enodem scriptorium calami in narem esse coniiciendum, donec sursum ad os perueniat: tum per id tenue ferramentū candens dandum esse ad ipsum os, deinde adustum locū purgandum esse æruginē & melle. Vbi purus est, lycio ad sanitatē perducendū. Vel narem incidendam esse ab ima parte ad os, vt & conspici locus possit, & facilius candens ferramentū admoueri. Tum sui narem debere, & adustum quidē ulcus eadē ratione curari. Suturam verò illini uel spuma argēti, vel alio glutinante.

De oris vitijs, quæ manu & ferro curantur.

CAP. XII.

D 5

De

IN ore quoq; quædam manu curantur. Vbi in primis dentes nonnunquam mouentur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter gingivarum arefcentium uitium. Oportet in utrolibet candens ferramentum gingiuis admouere, ut leuiter attingat, non ut incidat. Adustæ gingivæ melle illinendæ, & mulso eluendæ sunt. Ut pura vlcera esse cœperunt, arida medicamenta infricanda sunt ex his quæ reprimunt. Si verò dens dolores mouet, eximiq; eum, quia medicamenta nihil adiuuant, placuit, circumradi debet, ut gingiua ab eo resoluitur. Tum is concutiendus est. Eaq; faciendæ, donec bene moveatur. Nam dens hæres cum summo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla loco mouetur. Idq; etiam maiore periculo in superioribus dentibus fit, quia potest tempora oculos uel concutere. Tum si fieri potest manu, si minus, forfice, dens excipiendus est. Ac si exesus est, antè id foramen vel linamento, vel bene accommodato plumbo replendum est, ne sub forfice confringatur. Recta verò forfex ducenda est, ne inflexis radicibus os earum, cui dens inheret, parte aliqua frangatur. Neq; ideo nullum eius rei periculum est, utique in dentibus breuibus, qui ferè longiores radices habent. Sæpe enim forfex cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingivæ prehēdit & frangit. Propterea autem ubi plus sanguinis profluit, scire licet,

licet, aliquid ex osse fractum esse. Ergo specillo
conquirenda est testa, quæ recessit, & volsella
protrahenda est. Si non sequitur, incidi gingiva
debet, donec labans ossis testa recipiatur. Quod si
fractum statim non est, indurescit extrinsecus
maxilla, ut is hiare non possit. Sed imponendum
calidum ex farina & fico cataplasma est, donec
ibi pus moveatur. Tum incidi gingiva debet.
Pus quoque multum profluens, ossis fracti nota est.
Itaque etiam tum id extrahi convenit. Nonnun-
quam etiam eo læso, fistula fit, quæ eradi debet.
Dens autem scaber, qua parte niger est, raden-
dus est, illinendusque rosæ flore contrito, cui gal-
læ quarta pars, & altera myrrhæ sit adiecta.
Continendumque ore crebro vinum meracius. Atque
in eo casu velandum caput, ambulatione multa,
frictione capitis, cibo non acri utendum est. At
si ex ictu vel alio casu aliqui labant dentes, au-
ro cum his qui beneherent vincendi sunt. Con-
tinendaque ore reprimentia, ut vinum in quo ma-
licorium decoctum, aut in quo galla candens con-
iecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens
nascitur quam prior excidat, is qui cadere de-
buit, circum purgandus & euellendus est, is qui
natus est in locum prioris quotidie digito adur-
gendus, donec ad iustam magnitudinem perue-
niat. Quotiescunque dente exempto radix relicta
est, protinus ea quoque ad id facta forfice, quam rhi-
Zan Græci vocant, eximenda est. Tonsillas autem,
quæ post inflammationes induruerunt, àvτiὰδες
autem

autem à Græcis appellantur, cum sub leui tunica sint, oportet digito circūradere & euellere: si ne sic quidem resolvuntur, hamulo excipere, & scalpello excidere, tum vlcus aceto eluere, et illinere vulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

De Vua.

Vasi cum inflāmatione descendit, doloriq; est & subrubicundi coloris, præcidi sine periculo non potest. Solet enim multum sanguinē effundere. Itaq; melius est his vti, quæ aliās proposita sunt. Si verò inflammatio quidē nulla est, nihilominus autem ea vltra iustum modū à pituita deducta est, & est tenuis, acuta, alba, præcidi debet. Itemq; si ima, liuida, & crassa, summa, tenuis est. Neq; quicquā cōmodius est, quā volsella prehendere, sub eaq; quod volumus excidere. Neq; enim vllum periculum est, ne plus minus'ue præcidatur, cum liceat tantum infra volsellam relinquere, quantum inutile esse manifestum est, idq; præcidere quo longior vua est, quā esse naturaliter debet. Post curationē eadē facienda sunt, quæ in tonsillis proxime posui.

De Lingua.

Lingua verò quibusdā cum subiecta parte à primo natali die iuncta est, qui ob id ne loqui quidē possunt. Horum extrema lingua volsella prehendenda est, sub eaq; mēbrana incidenda, magna cura habita, ne venæ quæ iuxtā sunt, violentur, & profusione sanguinis noceāt. Reliqua curatio vulneris, in prioribus posita est. Et pleriq;

pleriq; quidem ubi consanuerunt, loquuntur. Ego autem cognoui, qui succisa lingua cum abunde super dentes eam premeret, non tamen loquendi facultatem consecutus est. Adeo in medicina etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est, id quod sequi conuenit.

De Abscessu sub lingua.

Sub lingua quoq; interdum aliquid abscedit, quod ferè consistit in tunica, doloresq; magnos mouet: quod si exiguum est, incidi semel satis est: si maius, summa cutis usque ad tunicam excidenda est, deinde utrinque oræ hamulis excipiendæ, & tunica undique circumdata liberanda est: magna diligentia per omnem curationem habita, ne qua maior vena incidatur.

De Labris.

Labra autem sæpe finduntur, eaq; res habet cum dolore etiam hanc molestiã, quod sermo prohibetur, qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat. Sed has, si in summo sunt, medicamentis curare commodius est, quæ ad vlcera oris fiunt. Si verò altius descenderunt, necessarium est tenui ferramento adurere, quod spathe simile quasi transcurrere, non imprimi debet. Postea faciendæ eadem sunt, quæ in auribus adustis exposita sunt.

De Crucis vitis, & curatione. CAP. XIII.

Atin ceruice inter cutem et asperam arteriam tumor increscit, βγογχονκλήν Græci vocant, qua modo caro hebes, modo humor aliquis

quis melli aquæ'ue similis includitur, interdum etiam minutis ossibus pili immisti. Ex quibus quicquid est, quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari, quibus summa cutis cum superiecta tunica *exeritur. Quo facto, siue humor est, profluit: siue quid densius, digitis educitur, tum vlcus sub linamentis sanescit. Sed scalpelli curatio breuior est. Medio tumore vna linea inciditur vsq; ad tunicā. Deinde vitiosus sinus ab integro corpore digito separatur, totusq; cum velamento suo eximitur. Tum aceto cui vel salē vel nitrū aliquis adiecit, eluitur, oræq; vna futura iunguntur, ceteraq; eadē quæ in alijs futuris superiniiciuntur. Leniter deinde, ne fauces vrgeat, deligatur: si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurētia, linamentisq; id curandū est, ceteris prout mouentibus.

De Umbilici vitis.

CAP. XIII.

Sunt etiā circa Umbilicū plura vitia, de quibus propter raritatē inter autores parū constat. Verisimile est autem id à quoq; prætermisum, quod ipse non cognouerat, à nullo id quod non viderat, fictū. Cōmune omnibus est, umbilicum indecore prominere. Causæ requiruntur. Mæges tres has posuit. Modo intestinum eo irrumperet, modo omentum, modo humorem. Sōstratus nihil de omento dixit. Duobus iisdem adiecit, carnem ibi interdum increescere, eamq; modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoq; omenti mentionem omisit. Sed eadem tria

tria causatus, spiritum quoque interdum eò dixit
 irrumpere. Hieron omnibus his quatuor positis,
 & omenti mentionem habuit, & eius quod si-
 mul & omentum & intestinum habuerit. Quid
 autem horum sit, his indicij cognoscitur. Vbi in-
 testinum prolapsum est, tumor neque durus, neque
 mollis est, omni frigore comminuitur: non solum
 sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit.
 Sonat interdum, atque ubi resupinatus est aliquis
 delapso intestino ipse desidit. Vbi verò omentum
 est, cetera similia sunt, tumor mollior ab ^{* una} ima
 parte, latus extenuatum in ventrem est, si quis
 apprehendit, elabatur. Vbi utrunque est, indicia
 quoque mista sunt, & inter utrunque mollities. At
 caro durior est, semperque etiam resupinato corpo-
 re tumet, prementique non cedit, prioribus facile
 cedentibus. Si vitiosa est, easdem notas habet,
 quas in carcinomate exposui. Humor autem se
 premitur, circumfluit. At spiritus pressus cedit,
 sed protinus redit, resupinato quoque corpore tu-
 morem in eadem figura tenet. Ex his id quod ex
 spiritu vitium est, medicinam non admittit. Ca-
 ro quoque carcinomati similis cum periculo tra-
 ctatur. Itaque omittenda est. Sana excidi debet,
 idque vulnus linamenti curari. Humorem quidam
 vel inciso summo tumore effundunt, & vulnus
 eiusdem linamenti curant. In reliquis varia sen-
 tentiae sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse
 res ipsa testatur, ut in uterum siue intestinum,
 siue omentum est, delabatur. Sinus verò umbi-
 licis

lici tum vacuus à quibusdā duabus regulis exce-
 ptus est, vehementerq; earum capitibus deliga-
 id vitiū tis, ibi emoritur. A quibusdam ad imum acu
 traiectatur, duo lina ducente, deinde vtriusq; li-
 ni duobus capitibus diuersa partes astringuntur.
 Quod in vna quoq; oculi fit. Nam sic id quod su-
 pra vinculum est, moritur. Adiecerunt quidā,
 vt antequam vincirent, summum vna linea in-
 cideret, exciderentq; quo facilius digito, demis-
 so, quod illuc irrupisset, depellerent, tum deinde
 uinxerunt. Sed abunde est, iubere spiritū cōtine-
 re, vt tumor quātus maximus esse potest, se osten-
 dat, tum imam basim eius atramento notare, re-
 supinatoq; homine digitis tumorem eum preme-
 re, vt si quid delapsum non est, manu cogatur.
 Posthac vmbilicū attrahere, & quā nota atra-
 menti est, lino vehementer astringere. Deinde
 partem superiorem aut medicamentis, aut ferro
 adurere donec emoriatur, atque vt cetera vsta
 vlcus nutrire. Idq; non solum vbi intestinū vel
 omentū uel vtrūq; est, sed etiam vbi humor est,
 optime proficit. Sed antè quaedam visenda sunt,
 ne quod ex vinculo periculum sit. Nam curatio-
 ni neq; infans, neq; aut robustus annis, aut senex
 aptus est, sed à septimo ferè anno ad quartum-
 decimum. Deinde ei corpus idoneū est id, quod
 integrum est. At quod mali habitus est, quodq;
 papulas, impetigines, similiaq; habet, idoneum
 non est. Lenibus quoq; tumoribus facile subue-
 nitur. At in eorum, qui nimis magni sunt, cura-
 tione

tione periculum est. Tempus autem anni & autumnale, et hybernum vitandum est. Ver idoneum maxime est. Ac prima æstas non aliena est. Præter hæc abstinere pridie debet. neq; id satis est. Sed alius quoq; ei ducenda est, quo facilius omnia quæ excesserunt, intra aluum considant.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.

CAP. XV.

Aquam his qui hydropici sunt emitti oportere aliàs dixi. Nunc quemadmodum id fiat, dicendum. Quidam autem sub umbilico fere quatuor interpositis digitis à sinistra parte. Quidam ipso umbilico perforato, facere consuerunt. Quidam cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso, quia quod per ignem diuisum est, minus celeriter coit. Ferramentum autem demittitur, magna cura habita, ne qua vena incidatur. Id tale esse debet, ut ferè tertiâ digiti partem latitudo mucronis impleat. Demittendumq; ita est, ut membranâ quoq; transeat, qua caro ab interiore parte finitur, eò tum plumbea aut ænea fistula injicienda est, vel recuruatis in exteriorē partem labri, vel in media circum surgente* quodam nodo, ne tota intus delabi possit, huius ea mora pars quæ intrâ, paulò longior esse debet, quàm quæ extrâ, ut ultra vltiorem membranâ procedat. Per hanc effundendus humor est. Atque ubi maior pars eius euocata est, cludenda demisso linteolo fistula est, & in rubere, si id uestiō non est, relinquenda. Deinde per insequētes dies

E circa

circa singulas heminas emittendū, donec nullum aque vestigiū appareat. Quidā tamen etiā non vsta cute protinus fistulā recipiūt, & super vulnus spongiā expressā deligāt. Deinde, postero die rursus fistulā demittunt, quod recens vulnus paulū diductū patitur, vt si quid humoris superest, emittatur. Idq; bis ita fecisse contenti sunt.

De intestinorum vulneratorum curationibus.

CAP. XVI.

Nonnunquā autem venter ictu aliquo perforatur, sequiturq; vt intestina euoluantur. Quod vbi incidit, protinus considerandū est, an integra ea sint, deinde an his color suus maneat. Si tenuius intestinum perforatū est, nihil profici posse iam retuli. Latius intestinū sui potest, non quod certa fiducia sit, sed quod dubia spes certa desperatione sit potior. Interdū enim glutinatur. Tum si vtrūlibet intestinum liuidum, aut pallidum, aut nigrum est, quibus illud quoq; necessario accedit, vt sensu careat, medicina omnis inanis est. Si verò adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est. Momento enim alienatur externo & insueto spiritu circumdata. Resupinandus autem homo est coxis erectioribus. Et si angustius vulnus est, quā vt intestina commode refundantur, incidendum est donec satis pateat. Ac si iam sicciora intestina sunt, perluenda aqua sunt, cui paulum admodum olei sit adiectum. Tum minister oras vulneris leuiter diducere manibus suis, vel etiam duobus hamis

hamis membranæ interiori iniectis debet, medicus priora semper intestina quæ posteriora prolapsa sunt, condere, sic ut orbium singulorum locum seruet. Repositis omnibus, leniter homo concutiendus est. Quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes diducantur, & inibi concidant. His conditis omentum quoque considerandum est, ex quo si quid iam nigri & emortui est, forfice excidi debet. Si quid integrum est, leniter super intestina diduci: sutura autem neque summæ cutis, neque interioris membranæ per se satis proficit, sed utriusque. Et quidem duobus lineis vincienda est spissior, quam alibi: quia rumpi & facilius motu ventris potest, & non æquæ magnis inflammationibus pars ea exposita est. Igitur in duabus acubus fila traiecienda, eaque duabus manibus tenenda, et prius interiori membranæ sutura iniicienda est, sic ut sinistra manus in dexteriori ora, dextra in sinisteriore à principio vulneris orsa, ab interiori parte in exteriorem acum immittat. Quo fit, ut ab intestinis ea pars semper acum longè sit, quæ retusa est. Semel utraque parte traiecta permutandæ acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quæ fuit in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dextra continuit. Iterumque eodem modo per oras immittendæ sunt. Atque ita tertio & quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus includenda plaga. Posthac eadem fila, eademque acus ad cutem transferendæ. Similique ratione ei quoque parti utraque sutura

inijcienda, semper ab interiore parte acubus venientibus, semper inter manus traiectis. Dein glutinātia inijcienda. Quibus aut spongiam, aut succidā lanam ex aceto impressam accedere debere manifestius est, quā ut semper dicendū sit. Impositis his leuiter deligari venter debet.

De Interiore parte abdominis rupta, & qua ratione curanda sit. C A P. XVII.

Interdum tamen vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub graui fasce interior abdominis membrana superiore cute integra, rumpitur. Quod scēminis quoque ex vtero saepe euenire consuevit, sitq; præcipue circa ilia, sequitur autem cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisq; intenta cutis indecorè intumescat. Atq; id quoq; aliter ab alijs curatur. Quidam enim per acum duobus linis ad imam basim immisissis, sic vtrunque deuinciunt, quemadmodum & in vmbilico, & in vna positum est, ut quicquid super vinculum est, emoriatur: quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folij, quod semper eodem modo seruandū esse iam posui, & tum oras sutura iungunt. Commodissimum est autem resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est ea parte rupta membrana sit, quāq; integra est, ea magis obnitatur, tum qua rupta videbitur, immittendæ
 duæ li- scalpello duæ tunice sunt, ut exciso medio interior membrana vtrunque recentem plagam habeat,

beat, quia quod vetus est, sutura non coit, loco patefacto. Si qua parte membrana non nouam plagam, sed veterem habet, tenuis excidenda habena est, quæ tantum ora eius exulceret. Cetera, quæ ad suturæ reliquam curationem pertinent, supra comprehensa sunt.

De Varicibus ventris.

PRæter hæc euenit, vt in quorundā ventribus varices sint, quarū quia nulla alia curatio est, quàm quæ in cruribus esse cōsuevit, tum eam partē explanaturus, hanc quoq; eò differo.

De Testiculorum natura, & morbis eorum.

C A P. XVIII.

Venio autē ad ea, quæ in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent, quæ quo facilius explicē, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. Igitur testiculi simile quiddam medullis habent. Nam sanguinē non emittūt, & omni sensu carent. Dolēt autē in ictibus & inflammationibus tunicæ, quibus hi continentur. Depēdēt verò ab inguinib. per singulos nervos, quos *νεμματα* Græci nomināt, cum quorum utroq; bina descendūt & venæ & arteriæ. Hæ autem tunica conteguntur tenui, nervosa, sine sanguine, alba, quæ* *ἐγυτγοειδής* à Græcis nominatur: super eam valentior tunica est, quæ interiori vehementer ima parte inheret, Darton Græci vocāt. Multæ deinde membranulæ venas & arterias, eosq; nervos comprehendunt. Atq; inter duas quoque tunicas superioribus parti-

E 3 bus

bus leues, paruulaq; sunt. Haecenus propria v-
 triq; testiculo & velamenta & auxilia sunt.
 Communis deinde vtriq; , omnibusq; interioribus
 finis est, qui iam cōspicitur à nobis, δοχεῖον Græ-
 ci, scrotum nostri vocant, isq; ab ima parte me-
 dijs tunicis leuiter innexus est, à superiore tan-
 tum circumdatus est. Sub hoc igitur plura vitia
 esse consuerunt. Quæ modo ruptis tunicis, quæ ab
 inguinibus incipere proposui, modò his integris
 fiunt. Siquidem interdum vel ex morbo primum
 inflammatur, deinde postea pondere abrumpi-
 tur, vel ex ictu aliquo protinus rumpitur tuni-
 ca, quæ diducere ab inferioribus partibus inte-
 stina debuit, tū pondere eò deuoluitur, aut omen-
 tum, aut etiam intestinum. Atq; ibi reperta via,
 paulatim ab inguinibus in inferiores quoq; par-
 tes* demissum, subinde nervosas tunicas, & ob
 id eius rei patientes diducit, ἐντ' ὀμφαλῶν &
 ἐπιπλοκῶν Græci vocant, apud nos indecorū,
 Hernia. sed commune his Herniæ nomen est. Deinde, si
 descendit omentum, nunquam in scroto tumor
 tollitur, siue in media fuit, siue corpus huc illuc ve
 conuersum, aut aliquo modo collocatum. Itemq;
 si retentus est spiritus, nō magnopere increscit,
 tactu verò inæqualis est, & mollis, & lubricus.
 *tumor At si intestinum quoq; descendit, tumor is sine
 his inflammatione modò minuitur, modò increscit.
 Estq; ferè sine dolore, & cum conquiescit ali-
 quis, aut iacet, interdū ex toto desidit, interdum
 sic diuiditur, vt in scroto exiguae reliquiae ma-
 neant.

neant. At si clamore & satietate, & si sub aliquo pondere is homo nixus est, crescit, frigore omni contrahitur, calore diffunditur. Estq; tum scrotum & rotundum, & tactu leue, idq; quod subest, lubricum est: si pressum est, ad inguen reuertitur, dimissumq; iterum cum quodam quasi murmure deuoluitur. Et id quidem in leuioribus malis euenit. Nonnunquam autem stercore accepto vastius tumet, retroq; compelli non potest: adfert tum dolorem & scroto, & inguinibus, et abdomini: nonnunquam stomachus quoq; affectus, primum ruffam bilem per os reddit, deinde viridem, quibusdam etiam nigram. Integris verò membranis interdum eam partem humor distringit. Atq; eius quoq; species duæ sunt. Nam vel inter tunicas is increscit, vel in membranis, quæ ibi circa venas et arterias sunt, ubi hæ grauatae occaluerunt. Ac ne ei quidem humori, qui inter tunicas est, vna sedes est. Nā modo inter summam & mediam, modo inter mediam & imam consistit. Græci communi nomine quicquid est, ὀδονκίλην appellant: nostri ut scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hoc quoq; sub eodem nomine, quo priora habent. Signa autem quedam communia sunt, quedā propria. Communia, quibus humor deprehenditur. Propria, quibus locis humorem subesse dicimus: si tumor est, nunquam ex toto se remittens, sed interdum leuior, aut propter fæmen, aut propter febriculam, maximeq; in pueris, isq; moris est, si

non nimius humor subest. At si is vehementer increuit, renititur sic, ut vter repletus, & arte astrictus. Venæ quoq; in scroto inflantur, & si digito pressimus, cedit humor, circumfluensq; id quod non premitur, attollit, & tanquam in vitro cornu' ve per scrotum apparet, isq; (quantum in ipso est) sine dolore est. Sedes autem eius sic deprehenditur: Si inter summam medianq; tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos reuertēs subit, scrotum ipsius albidius est. Si ducitur, aut nihil, aut paruulū intenditur, testiculus ea parte neq; visu, neq; tactu sentitur. At si sub media tunica est, intētum scrotum magis se attollit, adeo, ut superior coles sub tumore eo deliteſcat. Præter hæc æque integris tunicis ramex innascitur *νιγσονήλην* Græci appellant, cum venæ intumescunt. Hæ quoq; intortæ conglomeratæq; ad superiorem partem, vel ipsum scrotum implent, vel mediam tunicam, vel imam. Interdum etiam sub ima tunica circa ipsum testiculū neruumq; eius increſcunt. Ex his eæ quæ in ipso scroto sunt, oculis patent: hæ verò quæ mediæ imæ' ve tunicæ insident, ut magis conditæ, non æquè quidem cernuntur, sed tamen etiam visui subiectæ sunt, præterquàm quòd & tumoris aliquid est, pro venarum magnitudine & modo: & id prementi magis renititur, ac per ipsos venarum toros inæquale est: & qua parte id est, testiculus magis iusto dependet. Cum verò etiam super ipsum testiculū neruumq;

neruumq; eius, id malum increuit, aliquāto longius testiculus ipse descendit, minorq; altero fit, utpote alimento amisso. Raro, sed aliquando caro quoque inter tunicas increscit, σαρκονικλήνυ Greci vocant. Interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoq; adfert, & nisi celeriter ea inflammatio conquieuit, dolor ad inguina atq; ilia peruenit, partesq; hæ intumescunt: nervus ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulq; indurescit: super hæc inguen quoq; nonnunquam varices implent, ἑσθῶνα κλήνυ appellant.

De testiculorum curationibus communibus, & primò de incisione & curatione inguinis, vel scroti.

CAP. XIX.

His cognitis, de curatione dicendum est, in qua quædam cōmunia omnium sunt, quædam propria singulorum. Prius de communibus dicam. Loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant. Nam quæ vel sanari nō possint, vel aliter nutriri debeant, dicendum erit, simul ad species singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. In utraq; curatione, homo ante triduum bibere aquam, pridie abstinere etiam à cibo debet, ipso autem die collocari supinus: deinde si inguen incidendum est, idq; iam pube contegitur, antè radendum est, & tum extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit, id incidendum sub imo ventre, qua cum abdomine tunica inferiores committuntur. Ape-

E S riendum

riendum autem audacter est, donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur, perueniaturq; ad eam, qua media est plaga facta. Foramen deorsum versus subest. In id demittendus est sinistrae manus digitus index, ut diductis interuenientibus membranulis simul laxet. Minister autem sinistra manu comprehenso scroto, sursum versus eum debet extendere, & quammaximè ab inguinibus abducere: primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas, quæ super mediam tunicam sunt, si digito deducere non potest, scalpello abscindat. Deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ iungatur, digitoq; inde promatur, & super ventrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde si qua vitiosa sunt, circuncidenda sunt. In quibus cum multæ venæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: maiores verò antè longiore lino deligandæ sunt, ne periculose sanguinem fundât. Si media tunica vexata erit, aut sub ea malum increuerit, excidenda erit, sic, ut alte ad ipsum inguen præcidatur. Infra tamen non tota demenda est. Nam quod ad basim testiculi vehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo non potest. Itaq; ibi relinquendum est. Idem in ima quoq; tunica, si læsa est, faciendum est. Sed non à summa inguinis plaga, verum infra paulum ea abscindenda, ne læsa abdominis mēbrana inflammationes moueat. Neq; tamen nimium ex ea sursum relinquendum est, ne post

ne postea sinuetur, & sedem eidem malo præstet. Purgatus ita testiculus per ipsam plagam, cum venis & arterijs, & nervo suo leuiter demittendus est, videndumq; ne sanguis in scrotum descendat, ne' ve concretus aliquo loco maneat. Quæ ita fient, si venis vinciendo medicus prospexerit: lina quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere debebunt, quæ pure orto sine ullo dolore excident. Ipsi autem plagæ injiciendæ duæ fibulæ sunt, & in super medicamento quo glutinentur. Solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix maior & latior fiat. Quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda, sed leuiter tantum ponenda sunt, supraq; ea quæ inflammationem repellant, id est, ex aceto vel lana succida vel spongia. Cætera eadem quæ ubi pus moueri debet, adhibenda sunt. At cum infra incidi oportet, resupinato homine subijcienda sub scroto sinistra manus est, deinde id vehementer apprehendendum, et incidendum. Si paruulum est quod nocet, modice, ut tertia pars integra ad sustinendum testiculum infra relinquatur. Si maius est, etiam amplius, ut paulum tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit, integrum maneat. Sed primo rectus scalpellus, quamleuissima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat. Tum iuclinandus mucro est, ut transversa membrana secet, quæ inter summam mediamq; tunicam sunt. At si vitium in proximo est, mediam
tunicam

tunicam attingi non oportet. Si sub illa quoque
conditur, etiam illa incidenda est, sic ut tertia
quoque, si illa vitium tegit. Vbiq; repertum ma-
lū est, ministrū ab inferiore parte exprimere mo-
derate scrotum oportet, medicum digito, manu-
briolo, vel scalpello diductam inferiorem partem
tunica extra collocare: deinde eam ferramento,
quod ad similitudinem curuum vocant, incidere,
sic ut in eandē intrare duo digiti, index & me-
dius possint. His deinde coniectis, excipienda re-
liqua pars tunicae, & inter digitos scalpellus
immittendus est, eximēdumq; aut effundendum
quicquid est noxium. Quancūq; autem tunicam
quis violavit, illam quoque debet excidere, ac me-
diam quidem (ut supra dixi) quā altissime ab
inguine, imam autem paulo infra. Ceterum an-
tequam excidantur, hae quoque vinciri lino sum-
me debent, & eius lini capita extra plagam re-
linquenda sunt, sicut in alijs quoque venis, quae id
requisierint. Eo facto testiculus intus reponen-
dus est, oraq; scroti suturis inter se committen-
da, neque paucis, ne parum glutinentur, et longior
fiat curatio, neque multis, ne inflammationem au-
geant. Atque hic quoque videndum est, ne quid in
scroto sanguinis maneat. Tum imponenda gluti-
nantia sunt. Si quando autem in scrotum san-
guis defluxit, aliquidve concretum ex eo deci-
dit, incidi subter id debet, purgatoq; eo spongia
acri aceto madens circumdari. Deligatur autem
vulnus omne, quod ex his causis factum est. Si
dolor

dolor nullus est, quinq; primis diebus non est resoluendum, sed bis die tantum aceto irroranda lana vel spōgia. Si dolor est, tertia die resoluendum, & ubi fibulae sunt, hae incidendae, ubi linamentum, id mutandum est: rosaq; & vino madesaciendum id, quod imponitur. Si inflammatio increscit, adijciendum prioribus cataplasma ex lenticula et melle, vel ex malicorio, quod in austero vino coctum sit, vel ex his mistis. Si sub his inflammatio non conquirit, post diem quintum multa calida aqua vulnus fouendum, donec scrotum ipsum & extenuetur, & rugosius fiat. Tum imponendum cataplasma ex triticea farina, cui resina pinea adiecta sit. Quae ipsa si robustus curatur, ex aceto: si tener, ex melle coquenda sunt. Neq; dubium est, quodcūq; initium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quae prius mouent, imponenda sint. Quod si prius in ipso scroto ortum est, paulum id incidi debet, ut exitus detur. Linamentumq; eatenus imponendum est, ut foramen tegat. Inflammatione finita, propter nervos priore cataplasmate, dein cerato utendum est. Hec proprie ad eiusmodi vulnera pertinent. Cetera & in curatione, & in victu similia his esse debent, quae in alio quoq; vulnerum genere praecipimus.

De Intestini curatione.

CAP. XX.

His propositis ad singulas species veniendum est, ac si cui paruulo puero intestinum descendit antè scalpellum experienda iunctura est.

est. Fascia eius rei causa fit, cui imo loco pila as-
futa est ex panniculis facta, quæ ad repellendum
intestinum ipsi illi subiicitur, deinde reliqua fa-
scia pars arte circumdatur, sub quo sæpe & in-
tus compellitur intestinum, & inter se tunice
glutinantur. Rursus si etas processit, multumq;
intestini descendisse ex tumore magno patet, ad-
ijciunturq; dolor & vomitus, quæ ex stercore,
& ex cruditate eò delapso ferè accidunt, scal-
pellum adhiberi sine pernicie non posse manife-
stum est. Leuandum tantummodo malum, &
per alias curationes extrahendum est. Sanguis
mitti ex brachio debet, deinde, si vires patiun-
tur, imperanda tridui abstinentia est: si minus,
certe pro vi corporis quamlongissime. Eodè verò
tempore supèr habendum cataplasma ex lini se-
mine, quod antè aliquis ex mulso decoxerit. Post
hæc & farina hordeacea cum resina injicienda,
& is demittendus in solium aquæ calidæ, cui o-
leum quoq; adiectum sit, dandumq; aliquid cibi
lenis calidi. Quidam etiam aluum ducunt. Id du-
cere aliquid in scrotum potest, educere ex eo nō
potest. Per ea verò, quæ suprà scripta sunt, leua-
to malo, si quando aliàs dolor reuerterit, eadem
erunt facienda. Sine dolore quoq; si multa inte-
stina prolapsa sunt, secari superuacuum est, non
quòd excludi à scroto non possint, nisi tamen id
inflammatio prohibuit, sed quò repulsa inguini-
bus immorentur, ibiq; tumorem excitent, atque
ita fiat mali non finis, sed mutatio. At in eo què
scalpello

scalpello curari oportebit, simulatq; ad mediam tunicam vulnus in inguine factum pervenerit, duobus hamulis ea iuxta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberat. Neq; enim cum periculo læditur, quæ excidenda est, cum intestinum esse nisi sub ea non possit. Vbi deducta autem erit, ab inguine vsq; ad testiculum incidi debet, sic, ne ipse lædatur, tum excidi. Ferè tamen hanc curationem puerilis ætas, & modicum malum recipit. Si vir robustus est, maiusq; id vitium est, extrahi testiculus nõ debet, sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem ratione vsq; ad mediam tunicam scalpello aperitur, eaq; tunica eodem modo duobus hamis excipitur, sic ut à ministro testiculus eatenus contineatur, ne per vulnus exeat: tñ ea tunica deorsum versus scalpello inciditur, sub eaq; index digitus sinistrae manus ad imum testiculum demittitur, eumq; ad plagam cõpellit. Deinde dextræ manus duo digiti pollex atq; index, venam & arteriam & nervum, tunicamq; eorum à superiore tunica diducunt. Quod si aliquæ membranulæ prohibent, scalpello resolvuntur, donec ante oculos tota iam tunica sit. Excisis quæ excidenda sunt, repositoq; testiculo, ab ora quoq; eius vulneris, quod in inguine est: demenda habenula paulò latior est, quo maior plaga sit, & plus creare carnis possit.

De

AT si omentum descendit, eodē quidem modo, quo suprà scriptum est, aperiendum inguen, diducendæq; tunicae sunt. Cōsiderandum autē est, maior'ne is modus, an exiguus sit. Nam quod paruulum est, super inguen in aluum vel digito vel auerso specillo repellendum est. Si plus est, sinere oportet dependere, quantum ex vtero prolapsum est, idq; adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur & excidat. Quidam hic quoq; duo lina acu traiciunt, binisq; singulorum capitibus diuersas partes astringunt. Sub quo aequae, sed tardius emoriatur. Adicitur tamen hic quoq; celeritati, si omentum super vinculum illinitur medicamentis quae sic exedunt, ^{* ομη/α.} ne erodant, ομη/ινά Græci vocant. Fuerunt etiā qui omentum forfice præciderent, quod in paruulo non est necessarium. Si maius est, potest profusionem sanguinis facere. Siquidem omentum quoq; venis quibusdam etiam maioribus illigatū est. Neq; verò si discusso ventre id prolapsum forfice præciditur, cum & emortuum sit, & aliter tutius auelli nō possit, inde huc exemplum transferendum est. Vulnus autem curari, si relictum omentum est, sutura debet. Si id amplius fuit, & extrā emortuum est, excisis oris, sicut suprà propositum est. Si verò humor intus est, incidendum est, in pueris quidem inguen, nisi in his quoq; liquoris eius maior modus prohibet: in viris verò & ubicunq; multus humor subest,

subest, scrotum. Deinde si inguen incisum est, eò protractis tunicis humor effundi debet. Si scrotum, & sub hoc protinus vitium est, nihil aliud quàm humor est effundendus, abscindendaq; membranæ sunt, si quæ eum cōtinuerūt: deinde eluendum id ex aqua, quæ vel salem adiectū, vel nitrum habeat: si sub media, ima'ue tunica, tota hæ extra scrotum collocanda, excidendaq; sunt.

De Ramicis curatione.

CAP. XXII.

Ramex autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis fferamentis, quæ ipsis uenis infigantur, cum eo ne amplius quàm has vrant, maximeq; vbi inter se implicatæ glomerantur, eò ferrum id admouendum est, tum super farina ex aqua frigida subacta iniicienda est, vtendumq; eo vinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui. Tercio die lenticula cum melle imponenda est, post eiectionis crustis vlcera melle purganda, rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. Quibus uerò super mediam tunicā uenæ tument, incidendū inguen est, atq; tunica promouenda, ab eaq; uenæ digito vel manubriolo scalpelli separanda. Qua parte uerò inhaerebunt, & ab superiore & ab inferiore parte lino vincienda, tum sub ipsis vinculis præcidenda, reponendusq; testiculus est. At vbi supra tertiam tunicam ramex insedit, mediam excidi necesse est. Deinde, si due tres'ue venæ tument, & ita pars aliqua obsidetur, vt maiore vitio vacet, idem faciendum

F dum

dum quod supra scriptum est, ut ab inguine & à testiculo deligata vena præcidantur, isq; con-
datur. Sin totum id ramex obsederit, per pla-
gam demittendus digitus index erit, subijci-
endusq; venis, sic ut paulatim protrahat æquè ad-
ducendo, donec is testiculus par alteri fiat. Tum
fibula oris sic vincienda, ut simul eas quoq; ve-
nas comprehendant. Id hoc modo fit: Acus ab
exteriore parte oram vulneris perforat. Tum
non per ipsam venam, sed per membranam eius
immittitur, per eamq; in alteram oram compel-
litur. Venæ vulnerari non debent, ne sanguinem
fundant. Membrana semper inter has venas est,
ac neque periculum affert, & filo comprehensas
illas abunde tenet. Itaque etiam satis est, duas
fibulas esse: tum venæ quæcunq; protractæ sunt
in ipsum inguen, aduerso specillo comprehendi
debent: soluendi fibulas tempus inflammatione
finita & purgato vulnere est, * ut vna simul &
oras & venas cicatrix deuinciat. Vbi verò
inter imam tunicam & ipsum testiculum ner-
uumq; eius ramex ortus est, vna curatio est, quæ
totum testiculum abscindit. Nam neq; ad gene-
rationem quicquam is confert, & omnibus inde-
core, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed
tum quoque inguen incidendum, media tunica
promenda, atque excidenda est, idem in ima fa-
ciendum, nervusq; ex quo testiculus dependet,
præcidendus. Post id venæ & arteriæ ad in-
guen lino deligandæ, & infra vinculum abscin-
dendæ

denda sunt.

De Carne quæ inter tunicas testiculorum concreuit, & de nervo indurato. CAP. XXIII.

Caro quoq; si quando inter tunicas concreuit, nihil dubij est, quin eximenda sit, sed id ipso scroto inciso fieri comodius est. At si nervus induruit, curari res neq; manu neq; medicamento potest. Urgent enim febres ardentes, & aut virides aut nigri vomitus: præter hæc ingens sitis, & linguae aspritudo, fereq; à die tertio spumās bilis aluo cum rosione redditur. Atq; neq; assumi facile cibus, neq; cōtineri potest, neq; multo post extrema partes frigescent, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur, deinde in fronte frigidus sudor, eumq; mors sequitur.

De Ramice inguinis. CAP. XXIII.

Vbi verò in ipso inguine ramex est, si tumor modicus est, semel incidi: si maior duabus lineis debet, ut medium excidatur: deinde non extracto testiculo, sicut intestinis quoq; prolapsis interdum fieri docui, colligendæ venæ vinciendæq; ubi tunicis inhærebunt, & sub his nodis præcidendæ sunt. Neq; quicquam novi curationis vulneris eius requirit.

Ad tegendam glandem colis, si nuda est.

CAP. XXV.

A his ad ea transeundum est, quæ in cole ipso sunt, in quo si glans nuda est, vultq; aliquis eam decoris causa tegere, fieri potest, sed

F 2 exped

expeditius in puero quàm in viro. In eo cui id naturale est, quàm in eo, qui quarundam gentium more circumcissus est. In eo cui glans parua iuxtaq; eam cutis, spatiosior uerò ipse coles est, quàm in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, quibus id naturale est, eiusmodi est: Cutis circa glandem apprehenditur & extenditur, donec illam ipsam condat, ibiq; deligatur. Deinde iuxta pubem in orbem tergus inciditur, donec coles nudetur, magnaq; cura cauetur ne vel urinae iter, vel venae, quae ibi sunt, incidantur. Eo facto cutis ad vinculum inclinatur, nudaturq; circa pubem velut circulus, eoq; linamenta dantur, ut caro increseat & id impleat, satisq; velamenti supra latitudo plagae praestat. Sed donec cicatrix sit, vinctum esse id debet, in medio tantum relicto exiguo urinae itinere. At in eo qui circumcissus est, sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab interiore cole est. Non ita dolet, quia summo soluto, deduci deorsum usque ad pubem manu potest. Neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur, ultra glandem. Tum multa frigida aqua fouetur, emplastrumq; circa datur, quod valentem inflammationem reprimat, proximisq; diebus ut propè à fame uictus est, ne forte eam partem satietas excitet. Vbi iam sine inflammatione est, deligari debet à pube usq; circulum. Super glandem autem aduerso emplastro imposito induci. Sic enim fit, ut inferior pars glutinetur, superior ita sanescat,

nescat, ne inhereat.

Quomodo glans penis contacta aperiri possit.

Contra si glans ita contacta est, ut nudari non possit, quod vitium Græci *φύμωσις* appellant, aperienda est. Quod hoc modo fit: Subter à summa ora cutis inciditur recta linea usque ad frænum, atque ita superius tergus relaxatum cedere retro potest. Quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est, sic ut vertex eius ad frænum basis in tergo extremo sit. Tum superdanda linamenta sunt, aliaque medicamenta quæ ad sanitatem perducant. Necessarium autem est donec cicatrix sit conquiescere. Nam ambulatio atterendo ulcus sordidum reddit.

Infibulandi ratio.

Infibulare quoque adolescentulos interdum uocis, interdum valetudinis causa quidam consuerunt. Eiusque hæc ratio est. Cutis quæ super glandem est extenditur, notaturque utrinque à lateribus atramento quâ perforatur, deinde remittitur. Si super glandem notæ reuertuntur, nimis apprehensum est, et ultra notari debet. Si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulæ est. Tum quâ notæ sunt, cutis acu filum ducente transiit, eiusque fili capita inter se deligantur, quotidieque id mouetur, donec circa foramina cicatriculæ fiant. Vbi hæc confirmatæ, exempto filo fibula additur, quæ quo melior, eo lenior est. Sed

F 3 hoc

hoc quidem sæpius inter supernacua, quàm inter necessaria est.

De urinae reddendæ difficultate, & de Calculo,
rationibusq; eorum. CAP. XXVI.

Res verò interdū cogit emoliri manu vrinam, cum illa non redditur, aut quia senectute iter eius collapsum est, aut quia calculus, vel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit. At mediocris quoque inflammatio sæpe eam reddi naturaliter prohibet. Idq; non in viris tantummodo, sed in fœminis quoque interdum necessarium est. Ergo aeneæ fistulae fiunt, quæ ut omni corpori ampliori minoriq; sufficiant, ad maiores tres, ad fœminas duæ medico habendæ sunt. Ex virilibus maxima decem & quinq; est digitorum: media, duodecim: minima, nouem. Ex muliebribus, maior nouē: minor, sex. Incuruas verò esse eas paulum, sed magis viriles oportet, leuesq; admodum: ac neq; nimis plenas, neq; nimis tenues. Homo tum resupinus, eo modo quo in curatione ani figuratur, super subsellium aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra verò fistulam demittere in iter urinae debet. Atq; vbi ad ceruicem vesicæ ventum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam vesicam compellere, eamq; urina reddita recipere. Fœmina breuius urinae similiter & rectius iter habet, quod mammula simile inter imas oras super naturale positū, non minus sæpe
auxil

auxilio eget, aliquanto minus difficultatis exigit. Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longè ab exitu inhaerescit. Eum si fieri potest, oportet vellere, vel oriculario specillo, vel eo feramento, quo in sectione calculus protrahitur. Si id fieri non potuit, cutis extrema quamplurimum attrahenda, & condita glande lino vincienda est, deinde à latere recta plaga coles incidendus, & calculus eximendus est, tum cutis remittenda. Sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat, & vrina naturaliter profluat.

Quæ curatio calculosis adhibeatur.

Cum vesicæ verò calculiq; facta mentio sit, locus ipse exigere videtur, ut subiiciam, quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. Ad quam festinare, cum præceps sit, nullo modo conuenit: ac neq; omni tempore, neq; in omni ætate, neque in omni vitio id experiendū est, sed solo vere, in eo corpore, quod iam nouem annos, nondum quatuordecim excessit, & si tantum mali subest, ut neq; medicamentis vinci possit, neq; etiam trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo non interdum etiam temeraria medicina proficiat, sed quo sæpius utiq; in hoc fallat, in quo plura & genera & tēpora periculi sunt. Quæ simul cum ipsa curatione proponam. Igitur ubi vltima experiri statutū est, antè aliquot diebus victu corpus præparandum est, ut modi-

cos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi verò inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad vesicæ cervicem descendat. Quod an inciderit, digitis quoque, sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. Vbi eius rei fides est, pridie is puer in ieiunio continendus est, & tum loco calido curatio adhibenda, quæ hoc modo ordinatur: Homo prævalens & peritus in sedili alto confidit, supinumque eum & aduersum super genua sua coxis eius collocatis comprehendit, reductisque eius cruribus, ipsum quoque iubet manibus ad suos poplites datis eos quam maxime possit attrahere, simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo valentes insidunt, quo & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. Tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atque alter prout consedit sinistrum crus eius, alter dextrum, simulque ipse poplites suos attrahit. Siue autem vnus, siue duo continent, super humeros eius suis pectoribus incumbunt. Ex quibus euenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extentus, & in angustum compulsa vesica, facilius calculus capi possit. Præter hæc etiamnum à lateribus duo valentes obijciuntur, qui circumstantes leuare vel vnum vel duos, qui puerum continent, non sinunt. Medicus deinde diligenter vnguibus circuncisis, atque sinistra manu duos eius digitos,

tos, indicem et medium, leniter prius vnum, de-
inde alterum in anum eius demittit, dextraq;
digitos super imum abdomen leniter imponit, ne
si vtrinq; digiti circa calculum vehementer con-
currerint, vesicam ledant. Neq; verò festinan-
ter in hac re, vt in plerisq;, agendum est, sed ita,
vt quamaxime id tutò fiat. Nam lesa vesica
neruorum distentiones cum periculo mortis ex-
citât. Ac primum circa ceruicem quæritur cal-
culus. Ibi repertus minore negotio expellitur.
Et ideo dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc
indicij suis cognitum est. Si verò aut ibi non
fuit, aut recessit retro, digiti ad vltimam vesti-
cam dantur, paulatimq; dextra quoque manus
eius vltra translata subsequitur. Atque vbi re-
pertus est calculus, qui necesse est in manus in-
cidat, eo curiosius deducitur, quo minor leniorq;
est, ne effugiat, id est, ne sæpius agitanda vesica
sit. Ergo vltra calculum dextra semper manus
eius opponitur, sinistræ digiti deorsum eum
compellunt, donec ad ceruicem peruenitur. In
quam si oblongus est, sic compellendus est, vt
pronus exeat: si planus, sic, vt transuersus sit:
si quadratus, vt duobus angulis sedeat: si altera
parte plenior, sic vt prius ea, qua tenuior sit,
euadat. In rotundo nihil interesse ex ipsa figu-
ra patet, nisi si leuior altera parte est, vt ea an-
tecedebat. Cum iam eò venit, vt incidi super ve-
sicæ ceruicē iuxta anum cutis plaga lunata usq;
ad ceruicem vesicæ debeat, cornibus ad coxas

spectantibus paulum, deinde ea parte qua stri-
 ctior ima plaga est, etiamnum sub cute altera
 transversa plaga facienda est, qua ceruix ape-
 riatur, donec urinae iter pateat, sic ut plaga pau-
 * meatum lo maior, quam calculus sit. Nam qui * metu fi-
 * χορῖα δα stula, quam illo loco * σπῖθραυ Græci vocant, pa-
 vel σγουά- rum patefaciunt, cum maiore eodem periculo re-
 δα uoluntur, quia calculus iter, cum vi promitur,
 facit, nisi accipit. Idq; etiam perniciosius est, si
 figura quoque calculi vel aspritudo aliquid eò
 contulit. Ex quo & sanguinis profusio, & dis-
 tentio neruorum fieri potest. Quæ si quis euasit,
 multo tamē patientiorem fistulam habiturus est,
 rupta ceruice, quam habuisset incisa. Cum verò
 patefacta est, in conspectum calculus venit, in
 cuius corpore nullum discrimen est. Ipse si exi-
 guus est, digitis ab altera parte propelli, ab alte-
 ra protrahi potest. Si maior, injiciendus à supe-
 riore ei parte vncus est, eius rei causa factus.
 Is est ad extremum tenuis, in semicirculi speciem
 retusæ latitudinis, ab exteriori parte levis qua
 corpori iungitur, ab interiori asper, qua calcu-
 lum attingit. Isq; longior potius esse debet. Nam
 brevis extrahendi vim habet. Vbi iniectus est,
 in vtrunque latus inclinandus est, ut appareat
 calculus, & teneatur, quia si apprehensus est,
 ille simul inclinatur. Ideoq; eo minimo opus est,
 ne cum adduci vncus cœperit, calculus intus
 effugiat, hic in oram vulneris incidat, eamq;
 conuulneret. In qua re quod periculum esset, iam
 supra

suprà proposui. Vbi satis teneri calculum patet, eodem penè momento triplex motus adhibendus est, in vtrunque latus, deinde extra, sic tamen, vt leniter id fiat, paulumq; primo calculus attrahatur: quo facto, attollendus vnus extremus est, vt intus magis maneat, faciliusq; illum producat. Quod si aliquando à superiore parte calculus parum commode comprehendatur, à latere erit apprehendendus. Hæc est simplicissima curatio. Sed varietas rerum quasdam etiamnum animaduersiones desiderat. Sunt enim quidam non asseri tantummodo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in ceruicem, sine vllò periculo eximuntur. In vesica verò non tuto vel hi conquiruntur, vel attrahuntur, quoniam vbi illam conuulnerant, ex distentione nervorum mortem maturant: multoq; magis, si spina aliqua vesicæ inhaeret, eamq; cum ducere-
tur, duplicauit. Colligitur autem eo, quòd difficilius vrina redditur, in ceruice calculum esse: eo quòd cruenta destillat, illum esse spinosum, maximeq; id sub digitis quoque experiendum est, neq; adhibenda manus, nisi id constitit. Ac tum quoq; leniter intus digiti obijciendi, ne uiolenter promouendo conuulnerent, tum incidendū. Multi hic quoq; scalpello vsi sunt. Meles (quoniam is infirmior est, potestq; in aliqua prominentia incidere, incisoq; super illam corpore, quà cauum subest, non secare, sed relinquere, quod iterū incidi necesse sit) ferramentum fecit rectum, in sum-

ma

ma parte labrosum, in ima semicirculatum acutumq;. Id receptum inter duos digitos indicem ac medium super pollice imposito sic deprimebat, ut simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret. Quo cum sequebatur, ut semel quantum satis esset, aperiret. Quocunque autem modo ceruix ea parte facta est, leniter extrahi, quod asperum est, debet, nulla propter festinationem vi admota.

Signa calculorum, vel arenosorum,
vel mollium.

AT calculus arenosus, & antè manifestus est, quoniam & vrina quæ redditur, arenosa est: & in ipsa curatione, quoniã inter subiectos digitos neq; æque leniter renititur, & insuper dilatatur. Item mollis calculus, & ex pluribus minutisq;, sed inter se parum astrictis compositus indicatur, in se attrahens quasdam quasi squamulas. Hos omnes leniter permutatis subinde digitorum vicibus sic oportet abducere, ne vesicam ledant, ne'ue intus aliquæ dissipatæ reliquæ maneat, quæ postmodum curationi difficultatem faciãt. Quicquid autem ex his in conspectum venit, vel digitis vel vnco eximendum est. At si plures calculi sunt, singuli protrahi debent, sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinquatur. Siquidem in vesica difficulter inuenitur, inuentusq; celeriter effugit. Ita longa inquisitione vesica leditur, excitatq; inflammationes

tiones mortiferas, adeo ut quidam secti, cum diu frustra; per digitos vesica esset agitata, decesserint. Quibus accedit etiā quod exiguus calculus, ad plagam vrina postea promouente, excidit. Si quando autem is maior, non videtur, nisi rupta ceruice extrahi posse, findendus est. Cuius repertor Ammonius, ob id Lithotomos cognominatus est. Id hoc modo fit. Vncus inijcitur calculo, sic ut facile eum concussum quoque teneat, ne is retro reuoluatur. Tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ, prima parte tenui, sed retusa, quod admotū calculum ex altera parte ictum findit: magna cura habita, ne aut ad ipsam vesicam per ferramentum perueniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

De Calculis foeminarum.

Hæc vero curationes in foeminis quoque similes sunt, de quibus tamen parum proprie quædam dicenda sunt. Siquidem in his ubi paruulus calculus est, scalpellus superuacuus est, quia is vrinam in ceruicem non compellit, quæ & breuior, quàm in maribus, et laxior est. Ergo & per se sepe excidit, & si in primo quod est angustius inhaeret, eodem tamen vnco sine vlla noxa educitur. At in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini subijci digiti tanquam masculo: mulieri per naturalia eius debet. Tum virgini quidem sub ima sinisteriore ora. Mulieri verò inter vrinae iter & os pubis incidendū est, sic ut utroque loco pla-

ga transversa sit: neq; terreri conuenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

Quæ curatio calculo euulso habenda sit.

Calculo euulso, si valens corpus est, neque magnopere vexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur. Atq; ingredi quoq; eum paulum non alienū est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. Quod si per se non destitit, rursus ne vis omnis intereat, suppressi debet. Idq; protinus in imbecillioribus ab ipsa curatione faciendum est. Siquidem ut distentione neruorum periclitatur aliquis, dum vesica eius agitur: sic alter metus excipitur remotis medicaminibus, ne tantū sanguinis profluat ut occidat. Quod ne incidat, desiderare is debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adiectum. Sub quo & sanguis fere conquiescit, & astringitur vesica, ideoq; minus inflammatur. Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est & inguinibus & coxis, & super pubem. Vbi iam satis vel euocatus est sanguis, vel prohibitus, resupinus collocandus est, sic ut caput humile sit, coxæ paulum excitentur: ac super vlcus imponendum est duplex aut triplex linteolum, aceto madens. Deinde interpositis duabus horis in solum is aquæ calidæ resupinus demittendus est, sic, ut à genibus ad umbilicum aqua teneat, cetera vestimentis circumdata sint, manibus tantummodo pedibusq; nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat.

maneat. Ex quo sudor multus oriri solet, qui spongia subinde facile detergendus est, finisq; eius fomenti est, donec infirmo offendat. Tum multo is oleo perungendus, inducendusq; * hapsus lanae mollis, tepido oleo repletus, qui pubem & coxas & inguina, & plagam ipsam contacta eodem ante se linteolo protegat, isq; subinde oleo tepido madefaciendus est, ut neq; frigus ad vesicam admittat, & nervos leniter molliat. Quidam cataplasmatibus calefacientibus utuntur. Ea plus pondere nocent, quae vesicam urgendo vulnus irritat, quam calore proficiunt. Ergo ne vinculum quidem ullum necessarium est. Proximo die, si spiritus difficilius redditur, si urina non excedit, si locus circa pubem mature intumuit, scire licet in vesica sanguinem concretum remansisse. Igitur demissis eodem modo digitis leniter pertractanda vesica est, & discutienda si quae coierunt. Quo fit, ut per vulnus postea procedant. Non alienum etiam est, oriculario clystere acetum nitro mistum per plagam in vesicam compellere. Nam sic quoq; discutiuntur, si quae cruenta coierunt. Ea q; facere etiam primo die convenit. Si timemus, ne quid intus sit, maximeq; ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit, cetera eadem facienda sunt: ut demittatur in solium, ut eodem modo panniculus, eadem lana superimiciatur. Sed neque saepe, neque tandiu in aqua calida puer habendus, quam adolescens est: infirmus, quam valens: levis, quam gra-

*Hapsus id
latinis di-
ci videtur,
Græcis

πλανυξ,
quod Sui-
das expo-
nit σκῆπτρον

μυξ, Hesy-

chius ζώ-

θηρ. signifi-

cat autem

vel saccu-

lū, crume-

nā, vel hu-

iusmodi ali-

quid, aut

testoriū,

aut vela-

men, aut

cingulum,

sacculi, aut

crumenæ

modo fa-

ctum.

uiore

uiore inflammatione adfectus : is cuius corpus digeritur, quàm is cuius astrictum est. Inter hæc verò si somnus est, & æqualis spiritus, & madens lingua, & sitis modica, & venter imus, sed & mediocris est cum febre modica dolor, scire licet recte procedere curationem. Atq; in his inflammatio fere quinto vel septimo die finitur. Qua leuata, solum superuacuum est. Supini tantummodo vulnus aqua calida fouendum est, vt si quid vrinæ rodet, abluatur. Imponenda autem medicamenta sunt pus mouentia, & si purgandum vlcus videbitur melle linendum. Id si rodet, rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum videtur Enneapharmacum emplastrum. Nam & seuum habet ad pus mouendum, & mel ad vlcus repurgandum : medulla etiam maximeq; vitulina, quod in id ne fistula relinquatur, præcipue proficit. Linamenta verò tum super vlcus non sunt necessaria, super medicamentum ad id continendum, recte imponuntur. At vbi vlcus purgatum est, puro linamento ad cicatricem perducendum est. Quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, varia circa pericula oriuntur. Quæ præ sagire protinus licet, si continua vigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis vehemens, si venter imus tumet, si vulnus hiat, si *transfluens similiter ante tertium diem quedam liuida excidunt, si is aut nihil, aut tarde respondet, si vehementes dolores sunt, si post diem quintum magne

gnæ febres urgent, & fastidium cibi permanet, si cubare in ventrem iocundius est. Nihil tamen prius est distentione nervorum, & ante nonum diem vomitu bilis. Sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinentia, modicis & tempestivis cibis, inter hæc fomentis, de quibus supra scripsimus, oportet.

De cancro qui excisa vesica nascitur, & qua curatione uti deceat.

C A P. XXVII.

Proximus canceri metus est: is cognoscitur, si & per vulnus, & per ipsum colem fluit sanies mali odoris, cumq; eo quedam à concreto sanguine non abhorrentia, tenuesq; carunculae lanulus similes: præter hæc si oræ vulneris arida sunt, si dolent inguina, si febris non defuit, eaq; in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Considerandum autem est, in quam partem cancer is tendat. Si ad colem, indurescit is locus, & rubet, & tactu dolorem excitat, testiculiq; intumescunt. Si in ipsam vesicam, ani dolor sequitur, coxæ durescunt, non facile crura extendi possunt. At si in alterutrum latus, oculis id expositum est, paresq; utrinque easdem notas, sed minores habet. Primum autem ad rem pertinet, corpus recte iacere, ut superior pars semper eadem sit, in quam vitium fertur: ita si ad colem it, supinus is collocari debet: si ad vesicam, in ventrem: si in latus, in id quod integrius est. Deinde ubi vetum fuerit ad curationem,

G nem,

nem, homo in aquam demittetur, in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus aut myrtus, idemque humor clystere intus adijcietur. Tum super ponetur lenticula cum malicorio mista, quæ utraq; ex vino decocta sint: vel rubus aut oleæ folia, eodem modo decocta, aliaque; medicamenta, quæ ad cohibendos purgandosque; cancri proposui, ex quibus, si qua erunt arida, per scriptorium calammum inspirabuntur. Vbi stare coeperit cancer, mulso vulnus eluetur. Vitabiturque; eo tempore ceratum, quod ad recipiendum id malum corpus emollit, potius plumbum elotum cum vino inungetur, superque; idem linteolo illitum imponetur. Sub quibus perueniri ad sanitatem potest, cum eo tamen quod non ignoremus, orto Cancro sæpe affici stomachum, cui cum vesica quoddam consortium est, exque; eo fieri, ut neque; retineatur cibus, neque; si quis retentus est, concoquatur, neque corpus alatur: ideoque; ne vulnus quidem aut purgari, aut ali possit, quæ necessario mortem maturant: sed ut his succurri nullo modo potest, sic à primo tamen diu tenenda ratio curationis est. In qua quædam observatio ad cibum quoque; potionemque; pertinens necessaria est. Nam cibus inter principia non nisi humidus dari debet. Vbi vlcus purgatum est, ex media materia olera & salsamenta semper aliena sunt. Potione opus est non modica. Nam si parum bibitur, accenditur vulnus, & vigilia urget, & vis corporis minuitur. Si plus æquo assumitur, subinde vesica impletur

impletur, eoq; irritatur. Non nisi aquā autem bibendam esse manifestius est, quam ut subinde dicendum sit. Solet verò sub eiusmodi victu venire, ut alius non reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua vel fœnum græcū vel malua decocta sit. Idem humor rosa mistus in ipsum vulnus oriculario clystere agendus est, ubi id rodit vrina, neque purgari patitur. Fere verò primo per vulnus exit hæc, deinde eo sanescēte diuiditur, & pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur, quod interdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoq; anno fit. Neq; desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut vehementer rupta cervix est, aut ex cancro multæ magnæq; caruncule, simulq; nervosa aliqua exciderunt. Sed ut vel nulla ibi fistula, vel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo cum iam ad cicatricē vulnus * tendit ex- *intendit tentis iacere feminibus, & cruribus oportet, nisi tamen molles, arenosæve calculi fuerunt. Sub his enim tardius vesica purgatur. Ideoq; diutius plagam patere necessarium est, & tum demum ubi iam nihil tale extrā fertur, ad cicatricem perducī: quod si antequam vesica purgata est, oræ se glutinarunt, dolorq; & inflammatio redierunt, vulnus digitis vel aduerso specillo diducendū est, ut torquentibus exitus detur, hisq; effusis tum diutius pura vrina descendat. Tum demum quæ cicatricē inducant, imponenda sunt,

extendi q̄; vt supra docui, pedes quàmmaxime
vincti. Quòd si fistula metus ex his causis, quas
proposui, subesse videbitur, quo facilius clauda-
tur ea, vel certè coangustetur, in anum quoque
danda plumbea fistula est: extentis q̄; cruribus,
femina tali q̄; inter se deligāda sunt, donec qua-
lis futura est, cicatrix sit.

Si naturalia foeminarum concubitus non ad-
mittunt, quomodo curari conueniat.

C A P. XXVIII.

ET hoc quidem commune esse maribus &
foeminis potest. Proprie verò quaedam ad
foeminas pertinent, vt in primis quòd earū natu-
ralia nonnunquā inter se glutinatis oris, cōcubi-
tum non admittunt. Id q̄; interdū euenit protinus
in vtero matris, interdum exulceratione in his
partibus facta, & per malam curationē his oris
sanescendo iunctis. Si ex vtero est, membrana ori
vulue opposita est. Si ex vlcere, caro id reple-
uit. Oportet autem membranā duabus lineis in-
ter se transuersis incidere ad similitudinē literæ
X, magna cura habita, ne vrina iter violetur.
Deinde vndiq; eam membranam excidere: ac si
caro increuit, necessarium est recta linea patefa-
cere. Tum ab ora vel volsella vel hamo apprehen-
sam, tanquam habenulā excidere: & intus im-
plicitum in longitudinē linamentum, ἀμύμιον οὖρον
Græci vocant, in aceto tinctū demittere, supra q̄;
succidam lanam aceto madētem deligare. Tercio
die soluere vlcus, & sicut alia vlcera curare.

Cum q̄;

Cumq; iam ad sanitatē tendet, plumbeā fistulam medicamēto cicatricem inducente illinere, eamq; intus dare. Supraq; idem medicamentum injicere, donec ad cicatricem plaga perueniat.

Qua curatione partus emortuus ex utero excutiat.

C A P. XXIX.

Vbi concipit autem aliqua, si iam propè maturus partus intus emortuus est, neq; excidere per se potest, adhibēda curatio est, quæ numerari inter difficilimas potest. Nam et summā prudentiam moderationemq; desiderat, & maximum periculum affert. Sed ante omnia vulvæ natura mirabilis, cum in multis alijs, tum in hac re quoq; facile cognoscitur. Oportet autem ante omnia resupinā mulierem trāsverso lecto sic collocare, ut feminibus eius ipsius ilia comprimantur. Quo fit, ut & imus venter in cōspectu medici sit, & infans ad os vulvæ compellatur, quæ emortuo partu id comprimit, ex intervallo verò paulum dehiscere. Hac occasione usus medicus, vinctæ manus indicem digitum primum debet inferere, atque ibi continere, donec iterum ad os aperiatur, rursusq; alterum digitum demittere debebit, & per easdem occasiones alios, donec tota esse intus manus possit. Ad cuius rei facultatem multum confert, & magnitudo vulvæ, & vis nervorum eius, & corporis totius habitus, & mentis etiam robur, cum præsertim intus nonnunquā etiam duæ manus dari debeant.

G 3 Pert

Pertinet etiam ad rem quamcalidissimum esse
 *dum in-imum ventrem, & extrema corporis, neq; *cum
 flamma- inflammatione incepisse, sed recenti re protinus
 tionē cœ- adhiberi medicinam. Nam si corpus iam intus-
 pisse, munit, neq; demitti manus, neq; educi infans, nisi
 agerrime potest, sequiturq; sepe cum vomitu
 & cum tremore mortifera nervorum distentio.
 Verū intus emortuo corpori manus iniecta, pro-
 tinus habitum eius sentit. Nam aut in caput aut
 in pedes conuersum est, aut in transuersum ia-
 cet, fere tamen sic vt vel manus eius vel pes in
 propinquo sit. Medici verò propositū est, vt eum
 *manus manu dirigat, vel in*caput, vel etiam in pedes,
 si fortē aliter compositus est: ac si nihil aliud est,
 manus vel pes apprehensus, corpus rectius red-
 dit: nam manus in caput, pes in pedes eum con-
 uertet. Tum si caput proximum est, demitti de-
 bet vncus vndiq; lauis, acuminis brevis, qui vel
 oculo, vel auri, vel ori, interdū etiam fronti re-
 cte inicitur, deinde attractus infantem educit,
 neq; tamen quolibet is tempore extrahi debet.
 Nam si compresso vuluæ ore id tentatum est,
 non emittente eo infans abrumpitur, & vnci
 acumen in ipsum os vuluæ delabitur, sequiturq;
 nervorum distentio, & ingens periculum mor-
 tis. Igitur compressa vulua, conquiescere: hiantē,
 leniter trahere oportet, & per has occasiones
 paulatim eum educere. Trahere autem dextra
 manus vncum, sinistra intus posita infantem
 ipsum, simulq; dirigere eum debet. Solet etiam
 euenire,

euenire, vt is infans humore distendatur, ex q̃
eo profluat fœdi odoris sanies. Si quid tale est,
indice digito corpus illud forandum est, vt effu-
so humore extenuetur. Tum id leniter per ipsas
manus recipiendum est, nam vncus iniectus
facile hebeti corpusculo eleuabitur. In quo quid
periculi sit, supra positū. Sed in pedes quoq; con-
uersus infans non difficulter extrahitur, quibus
apprehensis per ipsas manus commode educi-
tur. Si verò transversus est, neq; dirigi potuit,
vncus ale inijciendus, paulatimq; attrahendus
est. Sub quo fere cervix replicatur, retroq; caput
ac reliquum corpus spectat. Remedio est, cervix
præcisa, vt separatim vtraq; pars auferatur. Id
vncus fit, qui priori similis in interiorem tantum
partem per totā aciem exacuitur. Tum id agen-
dum est, vt antè caput, deinde reliqua pars au-
feratur, quia fere maiore parte extracta, caput
in vacuam vuluam prolabitur: extrahiq; sine
summo periculo non potest, si tamen id incidit,
super ventrem mulieris duplici panniculo inie-
cto, valens homo non imperitus à sinistro latere
eius debet assistere, & super inum ventrem e-
ius duas manus imponere, alteraq; alteram pre-
mere. Quo fit, vt illud caput ad os vuluæ com-
pellatur. Idq; eadem ratioe quæ supra posita est,
vncus extrahitur. At si pes alter iuxta repertus
est, alter retro cum corpore est, quicquid pro-
tractum est, paulatim abscindendum est: & si
clunes os vuluæ vrgere cœperunt, iterum retro

repellendæ sunt, conquisitusq; pes eius adducendus. Aliæq; etiamnum difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, cōcisus eximi debeat. Quoties autem infans protractus est, tradendus ministro est. Is eum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita ne abrumpat, dextraq; eum
 secundæ. sequi vsq; ad eas, quas secundas vocant, quod velamentum infantis intus fuit, hisq; ultimis apprehensis venulas membranulasq; omnes eadem ratione manu diducere à vulua, totumq; illud extrahere, & si quid intus præterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in vnum feminibus, illa in cōclavi collocanda est, modicum calorem sine vlllo perflatu habente. Super imum ventrem eius imponenda lana succida in aceto & rosa tincta. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, & in his vulneribus, quæ in nervosis locis sunt, adhibeatur.

De Ani vitijs, & eorum curatione.

C A P. XXX.

ANi quoque vitia vbi medicamentis non vincuntur, manus auxilium desiderant. Ergo, si qua scissa in eo vetustate induruerunt, iamq; callum habent, commodissimum est ducere alium, tum spongiam calidam admovere, ut relaxentur illa, & foras prodeant. Vbi in conspectu sunt, scalpello singula excidere, & vlceræ
 *remouere
 *renouare, deinde imponere linamentum molle, et supèr linteolum illitum melle, locumq; eum molli

molli lana implere, & ita vincire altero die, deincepsq; ceteris lenibus medicamentis uti, quæ ad recentia eadē vitia necessaria esse aliās proposui, & utiq; per primos dies sorbitionibus cū sustinere, paulatim deinde cibis adijcere aliquid, generis tamen eius: quod eodem loco præceptum est. Si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit, incidendum est, ne anus ipse suppuret. Neq; tamen antè properandum est: nam si crudum incisum est, inflammationis multum accedit, et puris aliquanto amplius concitatur. His quoq; vulneribus, lenibus cibis, iisdemq; medicamentis opus est.

De condylomatum curatione.

AT tubercula, quæ condylomata appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur: Aluus ante omnia ducitur, tum volsella tuberculum apprehensum iuxta radices exciditur. Quod ubi factum est, eadem sequuntur, quæ supra post curationem adhibenda esse proposui. Tantummodo si quid increscit, squama æris coercendum est. Ora etiam venarum fundentia sanguinem sic tolluntur: Vbi sanguini qui effluit, sanies adijcitur, aluus acrius ducitur, quo magis ora promoveantur. Eoq; fit, ut *omnia vela, *omnes quasi capitula conspicua sint. Tum si capitulum vene exiguum est, basimq; tenuem habet, astringendum lino paulum supra est quàm ubi cum ano committitur. Imponenda spongia aqua calida est, donec id libeat. Deinde aut vngue, aut scal-

G S pello

pello suprà nodum id exulcerandum est. Quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur, interdum etiam vrinae difficultas. Si id maius est, & basis latior, hamulo vno aut altero excipiendum est, paulumq; suprà basim incidendum, neq; relinquendum quicquam ex eo capitulo, neque quicquam ex ano demendum est. Quod consequitur is, qui neq; nimium, neq; parum hamos ducit. Quà incisum est, acus debet immitti, infraq; eam lino id capitulum alligari: si duo tria' ve sunt, imum quodq; primum curandum est. Si plura, nō omnia simul, ne tempore eodem vndiq; tenere cicatrices sint: si sanguis profluit, excipiendus est spongia, deinde linamentum imponendum. Vngenda femina & inguina, et quicquid iuxta vlcus est, ceratumq; superdandum est. Farina hordeacea calida implendus is locus est: sic deligandus est. Postero die is desiderare in aqua calida debet, eodemq; cataplasmate foueri. Ac bis die, & ante curationem, & post eam, ceruices ac femina liquido cerato perungenda sunt, tepidoq; is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda. Si capitula simul non exciderunt, digito promouenda. Tum lenibus medicamentis, ysdemq; quæ alibi posui, vlcera ad sanitatem perducenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, iam aliàs superius exposui.

A De varicum curatione. CAP. XXXI.
 B his ad crura proximus transitus est, in quibus

quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem & earum venularum quæ in capite nocent, & eorum varicum qui in ventre sunt, curationem distuli: quoniam ubiq; eadem est. Igitur vena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescit, aut manu exciditur. Si recta est, si quavis transuersa, tamen simplex, si modica est, melius aduritur. Si curua est, & velut in orbes quosdam implicatur, pluresq; inter se inuoluuntur, vtilius eximere est. Adurendi ratio hæc est: Cutis superinciditur, tum patefacta vena tenui & retuso ferramento candente modice premitur, vitaturq; ne plagæ ipsius oræ adurantur, quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum varicem fit, & tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur. At exciditur hoc modo: Cute eadē ratione super venam incisa, hamulo oræ excipiuntur, scalpelloq; vndiq; à corpore vena ducitur, caneturq; ne inter hæc ipsa ledatur, eiq; retusus hamulus subijcitur, impositoq; eodem fere spatio quod supra positum est, in eadem vena idem fit, quæ quò tendat, facile hamulo extento cognoscitur. Vbi iam idem, quacunq; varices sunt, factum est, vno loco adducta per hamulum vena præciditur, deinde quæ proximus hamus est, attrahitur & euellitur, ibi rursus abscinditur. Ac sic vndiq; varicibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur, & super emplastrum glutinans inijcitur.

Curatio

AT si digiti vel in vtero protinus, vel propter communem exulcerationem postea cohaeserunt, scalpello diducuntur, dein separatim vterq; non pingui emplastro circundatur. Atq; ita per se vterq; sanescit. Si vero fit ulcus in digito, posteaq; male inducta cicatrix curuum eum reddit, primum malagma tentandum est. Dein, si id nihil prodest (quod & in veteri cicatrice, & ubi nerui lesi sunt, euenire cōsuevit) videre oportet, nerui'ne id vitium, an cutis sit. Si nerui est, attingi non debet, neq; enim sanabile est: si cutis, tota cicatrix excidenda est, quæ ferè callosa efficit vt extendi digitum non patiatur, tum rectus sic ad nouam cicatricem perducendus est.

De Gangrænæ curatione. CAP. XXXIII.

GAngræna inter vngues alasq; aut inguina nasci, & si quando medicamenta vincuntur, membrū præcidi oportere, alio loco mihi dictum est. Sed id quoq; cum periculo summo fit. Nam sæpe in ipso opere, vel profusione sanguinis, vel animæ defectione moriuntur. Verum hic quoq; nihil interest an satis tutum præsidium sit, quod vnicum est. Igitur inter sanam vitiatamq; partem incidēda scalpello caro vsq; ad os est: sic vt neq; contra ipsum articulū id fiat: & potius ex sana parte aliquid excidatur, quàm ex egra relinquantur. Vbi ad os ventum est, reducenda ab eo sa

eo sana caro, & circa os subsecanda est, ut ea quoque parte aliquid os nudetur: dein id serrula præcidendum est, quàm proxime sanæ carni etiam inherenti: actum frons ossis quam serrula exasperavit, leuanda est, supraque inducenda cutis, quæ sub eiusmodi curatiõe laxa esse debet, ut quàm maxime undique os contegat. Quò cutis inducta non fuerit, id linamentis erit contegendum, & super id spongia ex aceto deliganda. Cætera postea sic facienda, ut in vulneribus, in quibus pus moueri debet, præceptum est.

LIBER VIII.

De positu & figura totius humani corporis.
CAP. I.

SUPEREST ea pars quæ ad ossa pertinet, quæ quo facilius accipi possit, prius positus, figurisque eorum indicabo. Igitur caluaria incipit ex interiore parte concaua, extrinsecus gibba, utrinque leuis, & quæ cerebri membranam contegit, & quæ cute capillū gignente contegitur. Eaque simplex ab occipitio & temporibus, duplex usque in verticē à fronte est. Ossaque eius ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. Interque ea venæ discurrent, quas huius alimentum ministrare credibile est: rarò autem caluaria solida sine suturis est. Locis tamen æstuosis facilius inuenitur. Et id caput firmissimum, atque à dolore tutissimum.

tutissimum est: ex ceteris, quo suturæ pauciores sunt, eo capitis valetudo commodior est. Neq; enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem. Ferè tamen duæ super aures, tēpora à superiore capitis parte discernunt. Tertia ad aures per verticem tendens occipitium à summo capite diducit. Quarta ab eodem vertice per medium caput ad frontem procedit, eaq; modo sub imo capillo desinit; modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. Ex his ceteræ quidem suturæ in unguem committuntur. Hæ verò quæ super aures transuersæ sunt, totis oris paulatim extenuantur, atq; ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. Crassissimum verò in capite os post aurem est, quia capillus, ut verisimile est, ob id ipsum nō gignitur. Sub his quoq; musculis, qui tēpora connectunt, os medium in exteriorem partem inclinatum positum est. At facies suturam habet maximam, quæ à tēpore incipiens, per medios oculos naresq; transuersa peruenit ad alterum tempus. A qua breues duæ sub interioribus angulis deorsum spectant. Et mala quoq; in summa parte singulas transuersas suturas habent. A medijsq; naribus aut superiorum dentium gingiuis per medium palatum una procedit, aliaq; transuersa idem palatum secat. Et suturæ quidem in plurimis hæ sunt. Foramina autem intra caput maxima oculorum sunt, deinde narium, tum quæ in auribus habemus. Ex his quæ oculorum sunt, recta simpliciaq; ad cerebrum tendunt. Narium duo

duo foramina osse medio discernuntur. Siquidem hæc primum à supercilijs angulisq; oculorum osse inchoantur ad tertiam fere partem: deinde in cartilagine versæ quo propius ori descendunt, eo magis caruncula quoq; molliuntur. Sed ea foramina, quæ à summis ad imas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera diuiduntur. Aliaq; ex his ad fauces peruia spiritum & reddunt et accipiunt, alia ad cerebrum tendunt. In vltima parte in multa & tenuia foramina dissipantur, per quæ sensus odoris nobis datur. In aure quoq; primo rectum & simplex iter procedendo flexuosum fit, quod ipsum iuxta cerebrum in multa & tenuia foramina diducitur, per quæ facultas audiendi est: iuxta ea duo paruuli quasi sinus sunt, superq; eos finitur os, quod transuersum à genis tendens ab inferiorioribus ossibus sustinetur, iugale appellari potest, ab eadem similitudine, à qua id Græci ζυγῶδες appellant. Maxilla verò est molle os, eaq; vna est, cuius eadem & media & etiam ima pars mentum est, à quo vtrinq; procedit ad tempora, solaq; ea mouetur. Nam male cum toto osse, quod superiores dētes^{*excipit} exigit, immobiles sunt. Verum ipsius maxillæ partes extremæ quasi bicornes sunt. Alter processus intrà latior, vertice ipso tenuatur, longiusq; procedens sub osse iugali subit & super id temporum musculis illigatur. Alter breuior & rotundior, & in eo sinu qui iuxta foramina auris est cardinis modo fit: ibiq; huc & illuc

illuc se inclinās maxillæ facultatem motus præstat. Duriores osse dētes sunt, quorum pars maxillæ, pars superiori ossi malarum hæret. Ex his
 *τεμνι- quaterni primi quia secant, *τομνοὶ à Græcis
 νοὶ nominantur, hi deinde quatuor caninis dentibus
 Canini. ex omni parte cinguntur. Ultra quos utrinq; fe-
 Maxilla- re maxillares quaterni sunt, præterquam in his
 res. in quibus tres ultimi qui sero gigni solent, non increuerunt. Ex his priores singulis radicibus, maxillares utiq; binis, quidā etiam ternis quaternis' ve nituntur. Fereq; longior radix breviorē dentem edit, rectiq; dentis recta etiam radix, curui flexa est: ex eadem radice in pueris nouus dens subit, qui multo sæpius priorem expellit, interdum tamen supra infra' ve eum se ostendit. Caput autem spina excipit. Ea constat ex vertebra quatuor & viginti. Septem in ceruice sunt, duodecim ad costās, reliquæ quinque sunt proximæ costis. Hæ teretes breuesq; ab utroq; latere, processus duos exigunt: mediæ perforatæ, quā spinæ medulla cerebro commissa descendit, circā quoq; per duos processus tenuibus cauis peruiæ, per quæ à membrana cerebri similes membranule deducuntur. Omnesq; vertebra exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis processibus parū desidentes sinus habent, ab inferiore alios deorsum versus processus exigunt. Summa igitur protinus caput sustinet, per duos sinus receptis exiguis eius processibus. Quo fit, ut caput sursum deorsum versus tuberibus exasper

exasperetur, secunda superiori parti inferiore. Quod ad circuitum pertinet, pars summa angustiore orbe finitur. Itaque superior summæ circumdata, in latera quoque caput moueri finit. Tertia eodem modo secundam excipit. Ex quo facilis cervici mobilitas est. Ac ne sustinere quidem caput posset, nisi utrinque recti valentesque nervi collum continerent, quos **ναρῶτας* Græci appellant. Siquidem horum inter omnes flexus alter semper intentus ultra prolabi superiora non patitur. Iamque vertebra tertia tubercula quæ inferiori inserantur, excipit. Ceteræ processibus deorsum spectantibus, in inferiores insinuantur, ac per sinus quos utrinque habent, superiores accipiunt, multisque nervis & multa cartilagine continentur. Ac sic uno flexu modico in promptum dato ceteris negotiis homo & rectus insistit, & alioqui ad necessaria opera curvatur. Infra cervicem verò summa costæ contra humeros sita est, inde undecim inferiores usque ad imum pectus perueniunt, hæque primis partibus rotundæ & leniter quasi capitulatæ, vertebrarum transversis processibus ibi quoque paulum insinuatæ inhaerent. Inde pateſcunt, & in exteriorem partem recurvatæ, paulatim in cartilaginem degenerant. Eaque parte rursus in interiora leniter flexæ committuntur cum osse pectoris. Quod valens ac durum à faucibus incipit, ab utroque latere lunatum, & à præcordiis iam ipsum quoque cartilagine mollium terminatur: sub costis

*Sic quidem
hos nervos
Ludovicus
Cælius dicendos esse
contendit,
tamē Her-
mo. Barb.
Tenōtasap
pellandos
putavit.

H verò

**ποῶς* verò prioribus quinque, quas *Νόθος* Græci nominant, breues tenuioresq; atq; ipsæ quoq; paulatim in cartilagine[m] versæ, extremis abdominis partibus inhaerescunt, imaq; ex his maiorem partem nihil nisi cartilago est. Rursus à ceruice duo lata ossa utrinque ad scapulas tendunt, nostri *σκοπύλα* operta *ὠμόπλευρα* Græci nominant. Ea in summis verticibus sinuata, ab his triangula, paulatimq; lateſcentia ad spinam tendunt, & quo latiora quaque parte sunt, hoc hebetiora. Atq; ipsa quoque in imo cartilaginosa, posteriore parte velut innatant, quoniam nisi in summo nulli ossi inhaerescunt. Ibi verò validis musculis nervisq; constricta sunt. At à summa costa paulo interiorius quàm ubi ea media est, os excrescit, ibi quidem tenue, procedens verò quo propius lato scapulari ossi fit, eo plenius latiusq; & paulatim in exteriora curuatur; quod propius altera verticis parte modice intumescens, sustinet ingulum. Id autem ipsum recuruum ac neque inter durissima ossa numerandum, altero capite in eo quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit: paulumq; motu brachij mouetur, & cum lato osse scapularum infra caput eius, nervis & cartilagini connectitur. Hinc humerus incipit, extremis utrinque capitibus tumidus, mollis, sine medulla, cartilaginofus; medius teres, durus, medullosus, leniter gibbus, & in priorem & posteriorem, interiorem, & anteriorem partem. Prior autem pars est, quæ à pectore

pectore est, posterior quæ ab scapulis, interior
 quæ ad latus tendit, exterior quæ ab eo recedit,
 quod ad omnes articulos pertinere in vltiori-
 bus patebit. Superius autem humeri caput ro-
 tundius, quàm cetera ossa, de quibus adhuc dixi,
 * verticulatis scapularum ossibus paruo excessu * verticil-
 inseritur, ac maiore parte ex transitu nervi de-
 ligatur. At inferius duos processus habet, inter
 quos quod mediū est, magis etiam extremis par-
 tibus sinuatur. Quæ res sedem brachio præstat,
 quod constat ex ossibus duobus. Radius, quem
 ῥαδια Græci appellant, superior breuiorq; Radius.
 primo tenuior, rotundo & leniter cauo capite
 exiguum humeri tuberculum recipit, atque ibi
 nervi & cartilagine continetur. Cubitus infe-
 rior longiorq; & primo plenior in summo capi-
 te, duobus quasi verticibus extantibus in sinu
 humeri, quem inter duos processus eius esse pro-
 posui, se inserit. Primo verò duobus radijs bra-
 chij ossa iuncta paulatim dirimuntur, rursusq;
 ad manum cœunt, modo crassitudinis mutato.
 Siquidem ibi radius plenior, cubitus admodum
 tenuis est. Dein radius in caput cartilagosum
 consurgens, in verticem eius sinuatur. Cubitus Cubitus.
 rotundus in extremo, parte altera paulum pro-
 cedit. Ac ne sæpius dicendum sit, illud ignorari
 non oportet, plurima ossa in cartilaginem * desi- * desinero
 dere, nullum articulum non sic finiri. neque enim
 aut moveri posset, nisi leui inniteretur, aut cum
 carne nervisq; coniungi, nisi ea media quedam

materia committeret. In manu verò prima pal-
 mæ pars ex multis minutisq; ossibus constat,
 quorū numerus incertus est. Sed oblonga omnia
 & triangula structura quadam inter se conne-
 ctuntur, cum inuicem superior alterius angulus,
 alterius planities sit, eoq; fit ex his vnus ossis
 paulum in interiora concaui species. Verum ex
 manu duo exigui processus in sinus radij conij-
 ciuntur. Tum ex altera parte recta quinque ossa
 ad digitos tendentia palmam explent, à quibus
 ipsi digiti oriuntur, qui ex ossibus ternis con-
 stant, omniumq; eadem ratio est. Interius os in
 verticem sinuatur, recipitq; exterioris exiguum
 tuberculum, neruiq; ea continent, à quibus orti
 ungues indurescunt. Ideoq; non ossi, sed carni
 magis radicibus suis inhaerent. Ac superiores
 quidem partes sic ordinatæ sunt. Ima verò spi-
 na in coxarū ossē desidit, quod transversum lon-
 geq; valentissimum, vuluam, vesicam, rectum
 intestinum tuetur, idq; ab exteriori parte gib-
 bum, ad spinam resupinatum, à lateribus, id est,
 in ipsis coxis sinus rotundos habet: à quibus ori-
 tur os, quod pectinem vocant, idq; super intesti-
 na sub pube transversum ventrem firmat: rectius
 in viris, recurvatum magis in exteriora in fœ-
 mina. minis, ne partum prohibeat. Inde femina oriun-
 tur, quorum capita rotundiora etiam quàm hu-
 merorum sunt, cum illa ex cæteris rotundissima
 sint. Infra verò duos processus à priore & à po-
 steriore parte habent. Dein dura, & medullosa

et

Et ab exteriori parte gibba: rursus ab inferioribus quoque capitibus intumescunt. Superiora in sinus coxae, sicut humeri in ea ossa, quae scapularum sunt, coniunguntur, tum infra introrsus leniter tendunt, quo equalius superiora membra sustineant. Atque in eo inferiora quoque capita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint. Quae commissura, osse paruo, molli, cartilaginoso tegitur, patellam vocant. Hæc su- Patella.
 per innatans, nec ulli ossi inherens, sed carne et nervis deligata, pauloq; magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur. Ipsum autem crus est ex ossibus duobus. Etenim per omnia femur humero, crus uero brachio simile est: adeo ut habitus quoq; et decor alterius ex altero cognoscatur, quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. Verum alterum os ab exteriori parte supra positum est, quod ipsum quoq; Sura rectè nominatur. Id breuius, supraq; tenuius ad ipsos talos intumescit. Alterum à priore parte positum, cui Tibiæ nomen est, longius et in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur, sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque ossa infra supraq; coniuncta media, ut in brachio dehiscunt. Excipitur autem crus infra ossa ex transverso talorum, idq; ipsum super os calcis situm est, quod quadam parte sinuatur, quadam excessus habet, et procedentia ex talo recipit, et in sinum eius inferitur. Idq; sine medulla durum, magisq; in
 H 3 poster

posteriorem partem proiectum, teretem ibi figuram representat. Cetera ossa pedis ad eorum quæ in manu sunt, similitudinem instructa sunt. Planta palmis, digiti digitis, ungues unguibus, respondent.

Ossa vitata & corrupta quibus signis cognoscantur, & qua ratione curentur. CAP. II.

Omnino autem os, ubi iniuria accessit, aut vitatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur. Id quod vitatum est, primo fere pingue fit, deinde vel nigrum uel cariosum. Quæ super natis grauibz ulceribus aut fistulis, hisq; vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis eueniunt. Oportet ante omnia os nudare ulcere exciso: & si latius eius vitium est, quam vlcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os undiq; pateat: tum id quod pingue est, semel iterum'ue satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo statu secedat: aut eradere donec iam aliquid cruoris ostendatur, quæ integrioris nota est. Nam necesse est aridum sit, id quod vitatum est. Idem in cartilagine quoq; lesa faciendum est. Siquidem ea quoq; scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquatur. Deinde si vel os, siue cartilago rasa est, nitro bene trito respergendum est. Neque alia facienda sunt ubi caries, nigrities'ue in summo osse est. Siquidem id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum vel radendum est. Qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, ut

¶

Et agat aliquid, et maturius desinat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad solidum uentum est. Albo finire ex nigritie vitium, soliditate quadam ex carie manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro, supra dictum est. Si quando autem altius descenderit, utrumlibet dubium est. In carie quidem expedita cognitio est. Specillum tenue in foramen demittitur, quod magis minusue intrando, vel in summo cariem esse, vel altius descendisse testatur. Nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore et ex febre. Quae ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest. Manifestior tamen adacta terebra fit. Nam finis vitij est, ubi scobis nigra esse desit. Igitur si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est, quae altitudine vitium aequent. Tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec inde siccum os ex toto fiat. Simul enim post haec et resoluatur ab inferiore osse, quodcumque vitiatum est, et is sinus carne replebitur: et humor aut nullus postea feretur, aut mediocrius. Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. Atque idem in carie quoque ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. Sed quod totum vitiatum, totum eximendum est. Si inferior pars integra est, eatenus quod corruptum est, excidi debet. Item siue capitis, siue pectoris os, siue costa cariiosa est, inutilis vitio est, et excidendi necessitas est. Neque audiendi sunt, qui osse nudato,

H 4 diem

diem tertium expectant, ut tunc excidant. Ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque quantum fieri potest, eodem momento et cutis incidenda est, et os detegendum, et omni vitio liberandum est. Longeque perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia uix etiam si recte cessit, curatio veram sanitatem reddit.

Quomodo os excidatur: & de Modiolo, & Terebra, ferramentis ad id paratis. CAP. III.

EXciditur verò os duobus modis. Si parvulum est, quod laesum est, modiolo, quem *χοι-
νίον* Græci vocant: Si spatiosum, terebris. Vtriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concavum teres est, imis oris ferratū, per quod medium clauus ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrariū autem duo genera sunt: Alterum simile ei, quo fabri utuntur. Alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit, atque iterū ab alio principio paulo minus quam equaliter sursum procedit. Si vitium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. Et si caries subest, medius clauus in foramen demittitur. Si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, qui clauum recipiat, ut eo insistente circumactus modiolus delabi non possit. Deinde is habena quasi terebra cōuertitur. Estque quidam premendi modus, ut et foretur, et circumagatur, quia si leuiter imprimitur, parum proficit: Si grauius, non mouetur. Neque alienum est instillare paulum

paulum rose, vel lactis, quo magis lubrico circumagatur. Quod ipsum tamen si ^{*}obtusius est, ^{*}copiosius aciem ferramenti hebetat: at ubi iam iter modiolus pressum est, medius clauus educitur, & ille per se agitur. Deinde cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remouetur: at si latius vitium est, quam ut illo comprehendatur, terebra res agenda est. Ea foramen fit in ipso fine vitiosi ossis atq; integri, deinde alterum non ita longè, tertiumq; donec totus is locus qui excidendus est, his cavis cinctus sit, atque ibi quoq; quatenus terebra agenda sit, scobis significat. Tunc excisoriis scalper ab altero foramine ad alterum malleolo adactus, id quod inter utrumq; medium est, excidit: ac sic ambitus similis ei fit, qui in angustiore orbem modiolus imprimitur. Vtro modo verò id circumductum est, idem excisoriis scalper in osse corrupto planus summam quamq; testam læsit, donec integrum os relinquatur. Vix vnquam nigrities integrum, caries per totum os perrumpit, maximeq; ubi vitiosa caluaria est. Id quoq; signi specillo significatur, qui depressus in id foramen, quod infra solidam sedem habet, & ob id remittens aliquid inuenit, & madens exit. Si peruium inuenit, altius descendens inter os & membranam nihil oppositum inuenit, educiturq; siccus, non quo non subsit aliqua vitiosa sanies, sed quoniam ibi ut in latiore sede diffusa sit. Siue autem nigrities, quam terebra detexit, siue caries, quam specillum ostendit, os

H 6 transit,

transit, modioli quidē vsus fere superuacuius est, quia latius pateat necesse est, quod iam alte processit. Terebra verò ea, quam secundo loco posui, vtendū, eaq; ne nimis incalasciat, subinde in aquā frigidā demittēda est. Sed tum maiore cura agendū est, cum iam aut simplex os dimidiū perforatū est, aut in duplici, superius. Illud, spatium ipsum: hoc, sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda habena suspendendaq; magis sinistra manus est, & sæpius attollēda, & foraminis altitudo consideranda: vt quandocunq; os perumpitur, sentiamus: neq; periclitemur, ne mucrone cerebri membrana ledatur. Ex quo graues inflammationes cum periculo mortis oriuntur. Factis foraminibus eodem modo media sæpe, sed multo circumspectius excidenda sunt, ne forte angulus scalpri eandē membranā violet, donec fiat aditus, per quem membranæ custos immittatur *μύλον* *φύλακα* Græci vocant. Lamina anea est, firma, paulum resima ab exteriori parte leuius, quæ demissa est, vt exterior pars eius cerebro propior sit, subinde ei subijcitur, quod scalpro discutiendū est: ac si excipit eius angulū, vltra transire non patitur, eoq; & audacius et tutius scalpri malloleolo subinde medicus ferit, donec excisum vndiq; os eadē lamina leuetur, tolliq; sine ulla noxa cerebri potest. Vbi totū os eiectum est, circumradendæ leuandæq; sunt ora, & si quis scobis membranæ insedit, colligendum. Vbi superiori parte sublata, inferior relictæ est, non ora tantum, sed

os quoq; totum lauandum est, vt sine noxa postea cutis increseat, quæ aspero osse innascēs protinus non sanitatē, sed novos dolores mouet. Patefacto cerebro, qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fracta ossa peruenero. Si basis aliqua seruata est, super imponēda sunt medicamenta non pingua, quæ recentibus vulneribus accommodantur, supraq; imponēda lana succida oleo atq; aceto madens. Vbi tempus processit, ab ipso ore caro increscit, eaq; factū manu finum complet. Si quod etiam os aduētum est, à parte sana recedit: subitq; inter integram atque emortuam partem caruncula, quæ quod abscessit, expellat, eaq; fere quia testa tenuis & angusta est, squama est, id λεπίς à Græcis nominatur. Potest etiam euenire, vt ex ictu neq; findatur os, neq; perfringatur, sed summū tamē collidatur, exaspereturq;. Quod ubi incidit, radi & lauari satis est. Hæc quamuis maxime fiunt in capite, tamē cæteris quoq; ossibus communia sunt, vt ubicunq; idem incidet, eodem remedio sit vtendum. Atq; cum ea fracta, fissa, forata, collisa sunt, quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. De quibus protinus dicam, initio ab eadem caluaria accepto.

De caluariæ curatione.

CAP. IIII.

Igitur ubi ea pertusa, protinus requirendum est, num bilem is homo vomuerit, num oculi eius obcecati sint, num obmutuerit, num per nares aures'ue sanguis ei effluerit, num cōciderit,

21479

num sine sensu quasi dormiens iacuerit. Hac enim non nisi osse fracto eueniunt. Atque ubi inciderunt, scire licet necessariam, sed difficilem curationem esse. Si verò etiam torpor accessit, si mens non constat, si nervorum vel resolutio vel distentio secuta est, verisimile est etiam cerebri membranam esse violatam, eoq; in angusto magis spes est. At si nihil horum secutum est, potest etiam dubitari, an os fractum sit. Et protinus considerandum est, lapide an ligno, an ferro, an alio telo percussum sit, & hoc ipso leni an aspero, mediocri an vastiore, vehementer an leniter. Quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius est, quam certiore id nota explorare. Ergo quæ plaga est, demitti specillum oportet, neq; nimis tenue, neq; acutum, ne cum in quosdam sinus naturales inciderit opinionem, fracti ossis frustra faciat, neq; nimis plenum, ne paruula rimule fallant. Vbi specillum ad os venit, nihil nisi lene & lubricum occurrit, integrum id videri potest. Si quid asperi est, utiq; quæ suturæ non sint, fractum os esse testatur. A' suturis se deceptum esse, Hippocrates memoriæ prodidit, more scilicet magnorum virorum, & fiduciâ magnarum rerum habentium. Nam leuia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio, multaq; nihilominus habituro, conuenit et iâ simplex veri erroris confessio, præcipueq; in eo ministerio quod utilitatis causa posteris traditur,

tur, ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis ante deceptus est. Sed hac quidem alioquin memoria magni professoris, uti interponeremus, effecit. Potest autem sutura eo nomine fallere, quæ æque aspera est, ut aliquis hanc esse, etiam si rima est, existimet eo loco, quo subesse hanc verisimile est. Ergo eo nomine decipi non oportet, sed os aperire tutissimum est. Nam neque utiq; certa sedes, ut supra posui, suturarum est, & potest idem, & naturaliter commissum, & ictu fissum esse, iuxta'ue aliquid fissum habere. Quin aliquid etiam, ubi ictus fuerit vehementior, quamvis specillo nihil inuenitur, tamen aperire commodius est. At si ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os atramentum scriptorium est, deinde scalpro id detrahendum. Nigritiem enim continet, si quid fissum est. Solet etiam euenire, ut altera parte fuerit ictus, & os altera fiderit. Itaq; si grauiter aliquis percussus est, si mala indicia subsequuta sunt, neq; ea parte qua cutis discussa est, rima reperitur, non incommodum est parte altera considerare, nunquis locus mollior sit, & tumeat, eumq; aperire. Siquidem ibi fissum os reperietur, nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiam si frustra desecta est. Os fractum nisi succursum est, grauib; inflammationibus afficit, difficiliusq; postea tractatur. Raro, sed aliquando tamen euenit, ut os quidem totum integrum maneat, intus verò ex ictu vena aliqua in cerebri membrana rupta
aliquid

aliquid sanguinis mittat, isq; ibi concretus magnos dolores moueat, oculos quibus obcæcet. Sed fere contra id dolor est, & eo loco cute incisa pallidum os reperitur. Ideoq; id quoque os excidendum est. Quacumq; autem de causa curatio hæc necessaria est: si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quicquid læsum est in conspectu sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex ipsa membranula quæ sub cute caluariam cingit, super os relinquatur. Siquidem hæc scalpro terebris'ue lacerata, vehementes febres cum inflammationibus excitat. Itaque eam commodius est ex toto ab osse diduci. Plagam, si ex vulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. Si manu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus transuersis lineis literæ x figurâ accepit, ut deinde à singulis procedentibus* singulis cutis subsequatur. Inter quæ
 * alij, lin- si sanguis fertur, sponsia subinde in aceto tincta
 gulis: alij, cohibendus est, occupandusq; obiectis linamen-
 tibus, & caput altius excitandum. Neque id vi-
 tium ullum metum, nisi inter musculos, qui tem-
 pora continent, adfert, sed ibi quoq; nihil tutius
 fit. In omni verò fisso fracto'ue osse protinus an-
 tiquiores medici ad ferramenta veniebant, qui-
 bus id excideret. Sed multo melius est, antè em-
 plastra experiri, quæ caluariæ causâ componun-
 tur. Eorumq; aliquid oportet ex aceto mol-
 litum, per se super fissum fractum'ue os impone-
 re, deinde super id aliquanto latius quàm vulnus
 est,

est, eodem medicamento illitum linteolum, & praterea succidam lanam aceto tinctam. Tunc vulnus deligare, & quotidie resolvere, similiterq; curare vsq; ad diem quintum. A sexto die, etiam vapore aque calidae per spongiam fouere, cetera ex eadem facere. Quod si caruncula incrementum coeperit, et febricula aut soluta erit, aut leuior, & cupiditas cibi reuerterit, satisq; somni accedet, in eodem medicamento erit perseverandum. Procedente deinde tempore, emolliendum id emplastrum adiecto cerato ex rosa facto, quo facilius carnem producat. nam per se reprimendi vim habet. Hac ratione saepe rimae callo quodam implentur, estq; ea ossis velut cicatrix, & lotius fracta ossa, si qua inter se non coherebant, eodem callo glutinantur, estq; aliquanto melius velamentum cerebro, quam caro quae exciso osse incrementum accipit. Si vero sub prima curatione febris intenditur, breuesq; somni & iidem per somnia tumultuosi sunt, vlcus madet, neque alitur, & in cervicibus glandulae oriuntur, magni dolores sunt, cibiq; super haec fastidium incrementum accipit, tum demum ad manum scalprumq; veniendum est. Duo vero sub ictu calvariae pericula sunt, ne vel findatur, vel medium desinat: si fissum est, possunt ore esse compressa, vel quia altera super alteram excessit, vel etiam quia vehementer rursus se commiserunt. Ex quo evenit, ut humor ad membranam quidem descendat, exitum vero non habeat, ac sic eam irriter, et graves inflammationes

tiones moueat. Vbi medium desedit, eandē cere-
 bri membranā os vrget, interdum etiam ex fra-
 ctura quibusdam velut aculeis pungentibus. His
 ita succurrendum est, vt tamen quā minimum
 ex osse dematur. Ergo si ora alteri insedit, satis
 est id quod eminet, plano scalpro excidere, quo
 sublato iam rima hiat quantum curationi satis
 est. At si ora inter se comprimuntur, à latere
 eius interposito digiti spatio terebra foramē fa-
 ciendum est, ab eoq; scalper duabus lineis ad ri-
 mam agendus ad similitudinem C literæ, sic vt
 vertex eius à foramine basis ad rimas sit. Quod
 si rima longius patet, ab altero foramine rursus
 similis sinus fieri debebit, & ita nihil latens in
 eo osse concavum est, abundeq; exitus datur in-
 tus ludentibus. Ne si fractum quidē os desedit,
 totum excidi necesse est. Sed siue totum perfra-
 ctum est, & ab alio ex toto recessit, siue circum-
 posita caluariæ inheret exigua parte, ab eo quod
 naturaliter se habet, scalpro diuidendum est: de-
 inde in eo quod desedit iuxta rimam quam fe-
 cimus, foramina addenda sunt. Si in angusto no-
 xa est, duo: si latius patet, tria: septaq; eorum
 excidenda: & tum scalper vtrique ad rimam
 agendus, sic vt luna tum sinum faciat, imaq; pars
 eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum
 spectent. Deinde, si qua labent, & ex facili re-
 moueri possunt, forfice ad id facta colligenda
 sunt, maximeq; ea quæ acuta membranam inse-
 stant. Si id ex facili fieri non potest subiicienda
 lamina

Lamina est, quam custodem eius membrana esse proposui, et super eam quicquid spinosum est, & intus eminet, excidendum est: eadē lamina quicquid deorsum insedit attollendum. Hoc genus curationis efficit, ut qua parte fracta ossa tamē inhaerent, solidentur: qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub medicamento tēpore excidant, spatiumq; inter hac satis illi magnū ad extrahendam sanie relinquatur, plusq; in osse propugnaculi cerebrum habeat, quā habiturum fuit eo exciso. His factis, ea membrana acri aceto respergenda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur: siue intus concretus cruor remanet, discutiatur. Tum idem medicamentū eodem modo, qui suprapositus est, mollium, ipsi membranae imponendū est. Ceteraq; eodem modo facienda sunt, quae ad linteolum illitum & lanam succidam pertinent, collocandusq; is loco in tepido, & curandum quotidie vulnus, bis etiā estate. Quod si membrana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepida. Si usq; eō tumebit, ut super ossa quoq; emineat, coërcebit eam bene trita lenticula, vel folia vitis contrita, & cum recenti vel butyro vel adipe anserino mista, cervixq; molliri debebit, liquido cerato ex irino facto. At si parū pura membrana videbitur, par modus eius emplastri & mellis miscendus erit, idq; super infundendū, eiusq; continendi causa unū aut alterū linamentū injiciendum, & super linteolo cui emplastrū illitum sit,

I conteg

contegendum. Vbi plus pura membrana est, eadem ratione adiiciendū emplastro ceratū, vt carnem producat. Quod ad abstinentiā verò & primos vltioresq; cibos potionesq; pertinet, eadē quæ in vulneribus præcepi, seruāda sunt: eò magis, quò periculosius hæc pars afficitur. Quinetiā cum iam non solū sustineri, sed ali his quoque apparebūt, tamen erunt vitanda quæcunq; mandanda sunt, item fumus, & quicquid excitat sternutamentū. Spem verò certam faciunt membrana* mobilis ac sui coloris, caro increscens rubicunda, facilis motus maxillæ atq; cervicis. Mala signa sunt, membrana immobilis, nigra, vel livida, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, nervorū vel resolutio, vel distentio, caro livida, maxillarū rigor, atq; cervicis. Ceteraq; quæ ad somnū, cibi desiderii, febrem, puris colorem attinent, eadem quæ in cæteris vulneribus, vel salutaria vel mortifera sunt: vbi bene res cedit, incipit ab ipsa membrana: vel si os eo loco duplex est, inde quoque caro increscere, eaq; id quod inter ossa vacuum est, replet, nonnunquam etiam super calvariā excrescit. Quod si incidit, inspergenda squama æris est, vt id reprimat, cohibeatq; ea carni superdādo, quæ ad cicatricem perducant. Omnibusq; ea locis commode inducitur, excepta frontis ea parte, quæ paulum super id est, quod inter supercilia est. Ibi enim vix fieri potest, vt per omnem ætatem sit exulceratio, quæ linteolo medicamentum habente contegenda sit.

fit. Illa utiq; capite fracto seruanda sunt, vt donec iam valida cicatrix erit, soluenda videntur, frequens balneum, maior vini modus.

De narium fractarum curatione. C A P. V.

IN naribus verè & os & cartilago frangi solet, & quidem modo aduersa, modo à latere. si aduersa facta sunt, alterumue ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur: si à latere os fractum est, is locus cauus est: si cartilago, in alteram partem nares declinatur. Quicquid in cartilagine incidit, excitandū leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinque compressis. Deinde in longitudinem implicata linamenta & molli pellicula cineta circumfutaq; , intus adyicienda sunt. Aut eodem modo compositū aliquid ex arido penicillo. Aut grandis pinna, gummi vel fabrili glutine illita, & molli pellicula circundata, quæ desidere cartilagine non sinat. Sed si aduersa ea fracta est, equaliter utraq; naris implenda est. Si à latere, crassius esse debet ab ea parte in qua nasus iacet, ab altera tenuius, id quod inseritur. Extrinsecus autem circundanda habena est mollis, media illita mistis inter se similia & thuris fuligine, eaq; ultra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutinanda est. Id enim corpori quasi gluten inhaerescit, & cum induruit, nares comode continet. Sin quod intus inditum est ledit, sicut maxime fit, vbi interior cartilago perfracta est, excicatæ nares eadē tantūmodo habena

continenda sunt. Deinde, post quatuordecim dies idipsum demendum est. Resolvitur autem aqua calida, eaq; tum is locus quotidie fouendus est. Sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est: atq; vbi aduersum id ictum est, vtraque naris implenda est: vbi à latere, ea inquam os impulsum est, imponendumq; ceratum, & paulo vehementius deligandum est, quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem increseit. A tertio die fouendum id aqua calida est, tantoq; magis, quanto propius esse sanitati debet. Quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda, imponendaq; extrinsecus eadem habena, & super eam ceratum, neque vltra fascia adhibenda est. At si quod fragmentum vndique resolutum cum ceteris non glutinabitur, intelligetur quidem ex humore, qui multus ex vulnere fertur, vossella verò extrahetur. Finitisq; inflammationibus, imponetur aliquod medicamentum ex ijs, quae leniter reprimunt. Peius est, vbi aut ossi, aut cartilagini fracta, cutis quoque vulnus accessit. Id admodum raro fit: si incidit illa quidem, nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt. Cuti verò superimponendum emplastrum aliquod ex his, quae recentibus vulneribus accommodata sunt, sed insuper nullo vinculo deligandum est.

De aurium fractarum curatione. C A P. VI.

In

IN aure quoq; interdum rumpitur cartilago: quod si incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentū est. Sape enim suppurationem prohibet, & aurem cōfirmat. Illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quidem cartilaginem ipsam glutinari, circa tamen carnem increescere, solidariq; eum locum. Itaq; si cum cute cartilago rupta est, cutis vtrinq; sutur. Nunc autē de ea dico, quæ cute integra frangitur. In ea vero si iam pus natum est, aperienda altera parte cutis, & ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est. Deinde vtendum est medicamento leniter supprimente, quale lyciū est aqua dilutū, donec sanguis fluere desinat. Tum imponendum linteolum cum emplastro: sic vt pingue omne vitetur, & à parte posteriore lana mollis auri subijcienda est, quæ quod est inter hanc & caput compleat. Tum ea leniter deliganda est, & à tertio die vapore, vt in naribus posui, fouenda. Atq; in his quoq; generibus abstinentia primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

De maxillæ fractæ curatione, deq; quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. CAP. VII.

AB his ad maxillā vēturus, indicāda quædam puto cōmuniter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadē dicenda sint. Omne igitur os modò rectum vt lignum in longitudinē finditur, modò frangitur transuersum, interdum obliquum: atq; id ipsum nonnunquā retusa habet ca-

1 3 pita

pita, nonnunquam acuta. Quod genus pessimum est, quia neq; facile committuntur, quæ nulli retuso innituntur, & carnem vulnerat, interdum neruum quoq; aut musculū. Quinetiam aliquando plura fragmenta à fragmento sunt. Sed in alijs quidem ossibus ex toto sepe fragmentum à fragmento recedit. Maxilla verò semper aliqua parte etiam vexata, ossa inter se coherēt. Igitur in primis digitis duobus utrinq; prementibus, et ab ore, & ab cute omnino ossa in suam sedem compellenda sunt. Deinde si transversa maxilla fracta est, sub quo casu ferè dens super proximū dentem excedit, ubi ea in suam sedem collocata est, duo proximi dentes: aut si hi labant, ulteriores inter se seta deligandi sunt. Id in alio genere fracturæ superuacuum est. Cetera eadem facienda sunt. Nam linteolū duplex madens vino & oleo superiniciendū, cum eadem simila, & eadē thuris fuligine est. Deinde aut fascia, aut mollis habena media in longitudinem incisa, ut utrinq; mentum cōplectatur, & inde capita eius supra caput adducta ibi deligantur. Illud quoq; ad omnia ossa pertinēs dictū erit, famem primū esse necessariam: deinde à die tertio humidū cibum, sublata inflammatione paulo pleniorē, eumq; qui carnē alat: per omne tempus vinū esse alienum. Deinde tertio die resolui debere: fōueriq; per spongiam vapore aquæ calidæ, eademq; quæ primo fuerūt superdari. Idem die quinto fieri, et donec inflammatio finiatur, quæ vel octavo die, vel

vel septimo fere resolvitur. Ea sublata rursus ossa esse tractanda, ut si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. Neq; id esse soluendum, nisi duæ partes eius temporis, intra quod quæq; ossa conserunt, transferint. Fere verò intra quartumdecimum & unū & vigesimum diem sanescunt, maxilla, mala, iugulum, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina coxarū, os tali, calx, manus, planta. Inter vigesimū & trigesimū diem crura, brachiaq;. Inter septimū & vigesimū & quadragesimum, humeri & femina. Sed in maxilla illud quoq; adiiciendum est, quod humidus cibus diu assumendus est. Atq; etiā cum tempus processit, in lagano, similibusq; alijs perseverandum, donec ex toto maxillā callus firmarit. Item utiq; primis diebus habendum silentium.

De Iuguli fracti curatione. CAP. VIII.

Iugulum verò si trāsuersum fractum est, nonnunquam per se rursus recte coit, & nisi mouetur, sanari sine iunctura potest. Nonnunquam verò, maximeq; ubi motum est, elabitur, fereq; id quod à pectore sub id quod ab humero est, in posteriorem partē inclinatur. Cuius ea ratio est, quod per se non mouetur, sed cum humeri motu consentit. Itaq; eo subsistente, sub id humerus agitur. Raro verò admodum in priorem partem iugulum inclinatur, adeo ut magni professores nunquam se vidisse memorie mandarint. Sed locuples tamen eius rei autor Hippocrates est. Verum ut dissimilis uterq; casus est, sic quedam

dissimilia requirit. Vbi ad scapulas iugulum ten-
 dit, simul extra manu plane propellendus in po-
 steriorem partem humerus est, & illud in prio-
 rem attrahendum. Vbi ad pectus conuersum est,
 ipsum quidem retro dandum, humerus autem in
 priorem partem adducendus est. Ac si is inferior
 est, non id quod à pectore est, deprimendum est, quia
 immobile est, sed humerus ipse attollendus. Si casu
 superior est, id quod à pectore est, implendum la-
 na, et humerus ad pectus deligendus est. Si acuta
 fragmenta sunt, incidi contra cutis debet: ex ossi-
 bus ea, quæ carnem vulnerant, præcidenda sunt:
 tunc retusa ossa committenda sunt. Si quod ab aliqua
 parte eminet, opponendum ei triplex linteolum
 est, in vino & oleo tinctum. Si plura fragmenta
 sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo,
 eodemque intus incerato, ne fascia diducatur, quæ
 iugulo composito circumdanda est sæpius potius,
 quam valentius. Quod ipsum quoque in omnibus
 ossibus fractis perpetuum est. A dextro vero
 iugulo, si id fractum est, ad alam sinistram, à si-
 nistro ad dexteram. Rursusque sub ala sua fascia-
 ri debet. Post hæc si iugulum ad scapulas incli-
 natum est, brachium ad latus: si in partem prio-
 rem, ad ceruicem deligandum est. Supinusque ho-
 mo collocandus, cæteraque eadem facienda, quæ
 supra comprehensa sunt. Sunt vero plura ossa
 fere immobilia, vel dura, vel cartilaginosa, quæ
 vel franguntur, vel forantur, vel colliduntur, vel
 finduntur, ut male, pectus, latus, os scapularum
 costæ,

costa, spina costarum, os tali, calx, manus, plantata. Horum omnium eadem curatio est. Si supra vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. Quo sanescente rimas quoque ossis, aut si quod ferrumen est, callus implet. Si cutis integra est, & os laesum esse ex dolore colligimus, nihil aliud, quam quiescendum, imponendumque ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

De costarum fracturarum curatione. CAP. IX.

Proprie tamen quaedam de costa dicenda sunt, quia iuxta viscera est, grauioribusque periculis is locus expositus est. Hec quoque igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quae rara est, laedatur: interdum sic, ut eam totam is casus perruperit. Si tota fracta non est, nec sanguis expuitur, nec febricula sequitur, nec quicquam suppurat, nisi admodum raro, nec dolor magnus est, tactu tamen is locus leniter indolescit, abunde est eadem quae supra scripta sunt, facere, & à media fascia incipere deligare, ne in alterutra partem hac cutem inclinet. Ab vno vero & vigesimo die, quo utique os esse debet glutinatum, id agendum. Cibis vberioribus est utendum, ut corpus quam plenissimum fiat, quo melius os vestiatur, quod illo loco tenerum adhuc iniuriæ sub tenui cute expositum est. Per omne autem tempus curationis vitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus vehementior corporis, fumus, puluis, & quicquid

1 § quid

quid vel tussim vel sternutamentum mouet, ne spiritum quidem magnopere continere expedit. At si tota costa perfracta est, casus asperior est. Nam & graues inflammationes, & febris & suppuratio, & saepe vitæ periculum sequitur, & sanguis spuitur. Ergo si vires patiuntur, ab eo brachio quod super eam costam est, sanguis mittendus est. Si nō patiuntur, alius tamen sine ullo acri ducēda est, diutiusq; inedia pugnandum. Panis verò ante septimum diem nō assumendus, sed vna sorbitione viuendum, imponendumq; ei loco ceratum ex lino factum, cui cocta quoq; resina adiecta sit, aut Polyarchi malagma, aut pannaces ex vino & rosa & oleo, superq; imponenda lana succida mollis, & duæ fasciæ à medijs orsæ, minimeq; astrictæ. Multo verò magis omnia vitanda, quæ supra posui, adeo, vt ne spiritus quidem saepius mouendus sit. Quòd si tussis infestabit, ad id potio sumenda erit, vel ex trixagine, vel ex ruta, vel ex herba stœchade, vel ex cumino & pipere. Grauioribus verò doloribus vrgentibus, cataplasma imponi quoq; conueniet vel ex lolio, vel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adiecta. Et id quidem interdum superiacebit. Noctu verò idem aut ceratum, aut malagma, aut panni, quia potest cataplasma * quæq; decidere. Ergo quotidie * quoq; resoluetur, donec iam cerato aut malagmate possumus esse contenti, et decem quidē diebus extenuabitur fame corpus, ab vndecimo verò ali incipiet. Ideoq; etiam

etiam laxior quàm primo fascia circunligabitur, fereq; ea curatio ad quadragesimũ diem perueniet: quæ si modus erit suppurationis, plus malagma quàm ceratum ad digerendũ proficiet. Si suppuratio vicerit, neque per quæ suprà scripta sunt discuti potuerit, omnis mora vitanda erit, ne os infrà vitietur: sed qua parte maxime tumebit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus perueniat, idq; effundẽdũ. Si nusquam caput se ostendit, vbi maxime pus subit, sic intelligimus: creta simolia totum locum illinimus, & siccari patiemur: quo loco maxime humor in ea perseuerauit, ibi pus proximum erit, eaq; vri debebit. Si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandũ, demittendũ erit linamentum, aut aliquid ex penicillo, quod summum lino sit deuinctum, vt facile educatur. Reliqua eadem, quæ in cæteris adustis facienda sunt. Vbi purum erit vlcus, ali corpus debebit, ne tabes perniciofa futura id malum subsequatur. Nonnunquam etiam leuius ipso osse adfecto, & inter initia neglecto, nõ pus, sed humor quidam muccis similis, intus coit, mollescitq; contra cutis, in qua simili vstione vtendum est.

De spinæ curatione.

IN spina quoq; est quod proprie notemus. Nã si id ex vertebra excidit, aliquo modo fractum est, locus quidem concavus fit, punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. Quo fit, vt homo in interiorẽ

rem

rem partem subinde nitatur. Hac noscendæ rei
caussa sunt. Medicamentis verò iisdem opus est,
quæ plurima parte huius capitis exposita sunt.

De humerorum, brachiorum, femorum, cru-
rum, digitorum fractorum vel euulso-
rum, communibus curationibus.

C A P. X.

Similes rursus ex magna parte casus cura-
tionesq; sunt humeris & femoribus. Cōmu-
nia etiam quedam humeris, brachijs, femoribus,
cruribus, digitis. Siquidem ea minime periculose
media franguntur. Quo propior fractura capiti
vel superiori vel inferiori est, eo peior est. Nam
& maiores dolores adfert, & difficilius cura-
tur. Ea maxime tolerabilis est simplex, trans-
uersa: peior, ubi fragmēta, atq; ubi obliqua: pes-
simum ubi eadē acuta. Nonnunquam aut fracta
in his ossa in suis sedibus remanent: multo sæpius
excidunt, aliudq; super aliud effertur. Idq; ante
omnia considerari debet, & sunt notæ certæ. Si
suis sedibus mota, resima, pūctionisq; sensum re-
presentant, tactu inequalia sunt. Si verò non
aduersa, sed obliqua iunguntur, quod fit ubi loco
suo non sunt, membrum id altero latere breuius
est, & muscoli eius tument. Ergo si hoc depres-
sum est, protinus id mēbrum oportet extendere.
Nam nerui, musculiq; intenti per ossa contra-
huntur, neq; in suū locum veniunt, nisi illos per
vim aliquis intendit. Rursus, si primis diebus id
omissum est, inflammatio oritur. Sub qua &
difficile & periculose vis neruis adhibetur. Nam
distentio

disfentio neruorum, vel cancer sequitur, vel certum, vt ^{mitissimè} diutissime alatur, pus. Itaq; si antè reposita ossa non sunt, postea reponenda sunt. In-
tendere autem digitū vel aliud quoq; membrum, si adhuc tenerū est, etiam vnus homo potest, cum alteram partē dextra, alteram sinistra prendit. Valentiū membrum duobus eget, qui in diuersa contendunt. Si firmiores nerui sunt, vt in viris robustis, maximeq; eorum feminibus & cruribus euenit, habent quoq; vel linteis fasciis vtrinq; capita articulorum deliganda, et per plures in diuersa ducenda sunt. Vbi paulò longius quàm naturaliter esse debet, membrum vis fecit: tum demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt, indiciumq; ossis repositi est, dolor sublatus. Et membrum alteri parti equatum inuoluendum duplicibus triplicibusve pannis, & in vino & oleo tinctis, quos linteos esse commodius est. Ferè verò fasciis sex opus est. Prima breuissima adhibenda, quæ circa fracturam ter voluta sursum versum feratur, & quasi in cochlea serpat, satisq; est eam ter hoc quoq; modo circuire. Altera dimidio longiore, eaq; qua parte os eminet, ab ea si totum æquale est, vndelibet super fracturam debet incipere priori aduersa, deorsumq; tendere, atq; iterum de fractura reuersa in superiore vltra priorem fasciam destinere. Super has injeciendum latiore linteo ceratum est, quod eas contineat, ac si qua parte os eminet, triplex ea pannis obuciendus, eodem vino &

no & oleo madens. Hac tertia fascia comprehendenda sunt, quartaq; sic ut semper insequens priori aduersa sit, & tertia tantum in inferiore *faciant parte, tres in superiore *finiant, quia satius est saepius circuire, quam adstringi. Siquidem id quod adstrictum est, alienatur, & cancro opportunum est: articulum autem quamminime vincire opus est. Sed si iuxta hunc os fractum est, necesse est. Deligatum verò membrum in diem tertium continendum est. Eaq; iunctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit, non tamen laxa visa sit, secundo laxior, tertio iam penè resoluta. Ergo tum rursus id membrum deligandum, adyiciendaq; prioribus quinta fascia, iterumq; quinto resoluendum est, et sexto fasciis inuoluendum, sic ut tertia & quinta infra, cetera supra finiantur. Quotiescunq; autem soluitur membrum, calida aqua fouendū est. Sed si iuxta articuli fractura est, diu instillandū vinum est, exigua parte olei adiecta, eadēq; omnia facienda donec *ab eo inflammatio soluatur, vel leuius quoq; quam ex consuetudine id membrum fiat. Quod si septimus dies nō dedit, certè nonus exhibet. Tum facillime ossa tractantur. Rursus ergo si parum commissa sunt, committi debent. Si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponēda sunt. Deinde eodē modo membrum deligādū, ferulaq; superaccommodāda sunt, quae fissae circumpositaeq; ossa in sua sede contineant: & in quam partem fractura inclināt, ab ea latior, valentiorq; ferula impon

imponenda est. Easq; omnes citra articulum esse oportet resimas, ne hūc ledant, nec vltra astringi, quā vt ossa contineant: & cum spatio laxentur, tertio quoq; die paulū habenis suis coartari: ac si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere donec duæ partes eius temporis quod os quoq; conseruet compleantur, postea leuius aqua calida fouere, quia primo digeri materiam opus est, tum euocari. Ergo cerato quoque liquido id *leniter est vngendū, perfricandāq; summa cu- *pleniter tis est, laxiusq; id deligandum est. Tertio quoq; die soluendum sic, vt remota calida aqua, cetera eadem fiant. Tantummodo singulæ fasciæ quoties resolutæ fuerint, subtrahantur.

De fracti humeri curatione.

Hæc communia sunt. Illa propria. Siquidem humerus fractus, non sic, vt mēbrum aliud intenditur. Sed homo collocatur alto sedili, medicus autem humiliore aduersus. Vna fascia brachium amplexa ex ceruice ipsius qui læsus est, id sustineat. Altera ab altera parte super caput data, ibi accipit nodū. Tertia iuncto imo humero deorsum demittitur, ibi quoq; capitibus eius inter se iunctis. Deinde ab occipitio ipsius, minister sub ea fascia quam secundo loco posui, correpto: si dexter humerus ducendus est, dextro: si sinister, sinistro brachio, demissum inter femina eius qui curatur baculum tenet: medicus super eam fasciam de qua tertio loco dixi *pal- *planam mam inijcit dextrā: si sinister, sinistrā: si dexter humerus

humerus sumatur, simulq; alteram fasciam minister attollit, alteram premit medicus: quo fit, ut leniter humerus extendatur. Fasciis verò, si medium aut imum os fractum est, brevioribus opus est: si summum, longioribus, ut ab eo sub altera quoq; ala per pectus & scapulas porrigantur. Protinus verb brachium cum deligatur, sic inclinandum est id quod afficit, ut ante fascias quoq; sic figurandū sit: ne postea suspensum aliter, aliter cum deligabatur, humerū inclinet. Brachioq; suspenso, ipse quoq; humerus ad latus leniter deligandus est. Per quæ fit, ut minime moveatur, ideoq; ossa sic se habēt, ut aliquis composuit. Cum ad ferulas ventum est, extrinsecus esse earum longissimæ debent, à lacerto breviores, sed sub ala brevissimæ. Sæpius eæ resoluendæ sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est, ne ibi nervi rigescant, & inutile brachium efficiant. Quoties solutæ sunt, fractura manu continenda, cubitus aqua calida fovendus, & mollicerato perfricandus, ferulæq; vel omnino non imponendæ cōtra eminentia cubiti, vel aliquanto breviores sunt.

De brachij fracti curatione.

AT si brachium fractum est, in primis considerandum est, alterum os, an utrunque comminutum sit, non quòd alia in eiusmodi casu curatio admouenda, sed primū, ut valentius extendatur, si utrunq; os fractum est: quia necesse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosq;

eosq; intendente. Deinde, ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. Nam ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fascijs, ferulisq; est. Deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato. Siquidem is maxime brachij naturalis habitus sit, idq; involutum mitella commodissime excipitur, quæ latitudine ipsi brachio, per angustis capitibus collo inijcitur, atque ita commodè brachium ex ceruice suspensum est. Idq; paulum supra cubiti alterius regionē pendere oportet. Quod si ex summo cubito id factum sit, glutinare id vinciendo alienum est. Fit enim brachium immobile, ac si nihil aliud quam dolori occursum est, idem qui fuit eius usus est.

De crurum femorumq; fractorum curatione.

IN crure æquè ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. Commune verò ei femoriq; est, quod ubi deligatum est, in canalem coniiciendum est. Is canalis ab inferiori parte foramina habet, per quæ si quis humor excesserit, descendat: & à planta moram, quæ simul & sustineat eam, & delabi non patiatur: & à lateribus caua, per quæ loris datis mora quidem crus femurq; ut collocatum est, detineat. Esse etiam is debet à planta, si crus fractum est, circa poplite: si femur, usq; ad coxam: si iuxta superius caput femoris, sic ut ipsa quoq; ei coxa sit. Neq; tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri breuius, quia nunquam in antiquum statum

K reuert

reuertitur, summisq; digitis postea cruris eius insisti, sed multa tamen femori debilitas est, ubi fortune negligentia quoq; accessit.

De fracti digiti curatione.

• **furculū* **D**igitum satis est ad unum **furunculum* post inflammationem deligari.

Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosq; con fractos, pertinentes.

His proprie ad singula membra pertinentibus, rursus illa communia sunt: primis diebus fames: deinde tum, cum iam increfcere callum oportet, liberalius alimentum, longa à vino abſtinentia, fomentum aquæ calidæ, dum inflammatio eſt, liberale, cum ea deſit, modicum. Tum etiam longior vltioribus è liquido cerato membris, & mollis tamen vinctio. Neq; protinus exercendum id membrum, ſed ad antiquos uſus reducendum eſt. Grauius aliquanto eſt, cum oſſis fracturæ carnis quoque vulnus acceſſit, maxi- meq; ſi id muſculi femoris aut humeri ſenſerunt. Nam & inflammationes multo grauiores & promptiores caneros habent. Ac femur quidem, ſi oſſa inter ſe ceſſerunt, ferè præcidi neceſſe eſt. Humerus verò quoque in periculum venit, ſed facilius conſeruatur. Quibus periculis etiam magis id expoſitū, quod iuxta ipſos articulos ictum eſt. Curioſius igitur agendum eſt, & muſculus quidem per mediam plagam tranſuerſus præcidendus. Sanguis verò, ſi parum fluxit, mittendus: corpus inedia extenuandū, ac reliqua qui- dens

dem membra lentius intendenda, & lenius in
 his ossa in suam sedem reponenda sunt. His verò
 neq; intendi nervos, neq; ossa tractari satis ex-
 pedit. Ipsiq; homini permittendum est, vt sic ea
 collocata habeat, quemadmodū minime ledunt.
 Omnibus autē his vulneribus imponendum pri-
 mo linamentū est vino madens, cui rosæ paulum
 admodum adiectum sit: cetera eadem deligan-
 da fasciis sunt aliquanto quā vulnus latiori-
 bus, laxius scilicet, quā si ea plaga non esset,
 quanto facilius & alienari & occupari canero
 vulnus potest, * numeris potius fasciarum id * numero
 agendum est, vt laxæ quoque æquē contineant.
 Quod in femore humeroq; sic fiet, si ossa forte re-
 ctē concurrerint: sin aliter se habebunt, eatenus
 circumdari fascia debebit, vt impositum medica-
 mentū contineat. Cetera eadē quæ suprā scripsi,
 facienda sunt, præterquam quod neq; ferulis, neq;
 canalibus, inter quæ vulnus sanescere non potest,
 sed pluribus tantummodo & latioribus fasciis
 opus est, ingerendumq; subinde in eas est cali-
 dum oleum & vinum, magi q; in * principio fa- * primo
 me vtendū, vulnus calida aqua fouendū, frigusq;
 omni ratione vitandum est, & transeundum ad
 medicamenta, quæ puri mouendo sunt, maiorq;
 vulneri quā ossi cura agenda. Ergo quotidie
 soluendum nutriendumq; est. Inter quæ si quod
 paruulum fragmentum ossis eminet, id si retu-
 sum est, in suam sedem dandum: si acutum, antē
 acumen eius longius est præcidendum: si bre-
 uius,

uius, limandum, & vtrinque scalpro limandum,
tum ipsum recondendum est: ac si id manus fa-
cere non potest, vossella, quali fabri vtuntur, in-
ijcienda est, recte se habenti capite ab ea parte
quasima est, vt ea parte qua gibba est, eminens
os in suam sedē compellat. Si id maius est, mem-
branulisque cinguntur, sinere oportet ea sub medi-
camentis resolui, idque os, vbi iam nudatum est,
abscindere: quod maturius scilicet faciendum est,
prodestque ea ratione & os coire, & vulnus sa-
nescere. Illud suo tempore, hoc prout se habet.
Nonnunquam etiam in magno vulnere euenit,
vt fragmenta quaedam velut emoriantur, neque
cum ceteris coeant. Quod hic quoque ex modo
fluentis humoris colligitur. Quo magis necessa-
rium est, sepius vlcus soluere atque nutrire. Se-
quitur vero, vt id os per se post aliquot dies ex-
cidat, cum tam misera antea conditio vulneris sit,
tamen id interdum maius diutiusque facies. Saepe
enim integra cutis osse abrumpitur, protinusque
prurigo & dolor oritur. Quae soluere, si accidit,
maturius oportet, & fouere aqua per aestatē fri-
gida, per hyemem egelida: deinde ceratum myr-
teum imponere. Interdum fractura quibusdam,
velut aculeis carnem vexat, quo à prurigine &
punctionibus cognito, aperire id melius, eosque
aculeos praecidere necesse habet. Reliqua vero
curatio in vtroque hoc casu eadem est, quae vbi
ictus protinus intulit puro iam vlcere. Cibus hic
quoque vtendum est carnem producentibus, si
breuius

breuius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis quàm leuissimi generis inter ea demitti debet, sic vt capite paulum supra vlcus emineat, isq; quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. Tum paxillus remouendus, vulnus sanandum est, cicatrix inducta fouenda frigida aqua est, in qua myrtus, hederæ, aliæ'ue similes verbenæ sint: illinendumq; medicamentum quod siccet, et magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur. Si quando verò ossa non confervuerunt, quæ sæpe soluta, sæpe mota sunt, in aperto deinde curatio est: possunt enim coire. Si vetustas occupavit, membrum extendendum est, vt aliquid ledatur. Ossa inter se manu diuidenda, ut concurrente exasperentur, vt si quid pingue est, eradatur, totumq; id quasi recens fiat. Magna tamen cura habita, ne nerui musculi'ue ledantur. Tum vino fouendum est, in quo malicorium decoctum sit, imponendumq; id ipsum oui albo mistum. Tertio die resoluendum, fouendumq; aqua, in qua verbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. Quinto die idem faciendum, feruleq; circumdandæ. Cætera & antè & post eadem faciendæ, quæ supra scripsi. Solent tamen interdum diuersa inter se ossa * coherere. Eoq; * conferue & breuius membrum & indecorum fit: & si re: vel co- capite acutiora sunt, adsiue punctiones sentiuntur. Ob quam causam frangi rursus ossa & di- alescere rigi debent. id hoc modo fit: Calida aqua multa

membrum id fouetur, & ex cerato liquido perfricatur, intenditurq;: & inter hæc medicus pertractans ossa: vt adhuc tenero callo manibus ea diducit, compellitq; id, quod eminet in suam sedem: & si parum valuit, ab ea parte, in qua os se inclinat, inuolutam lana regulam obijcit. Atq; ita deligando assuescere iterum vetustæ sedi cogit. Nonnunquam autem recte quidem ossa cæperunt, superincreuit verò nimis callus, ideoq; locus intumuit. Quod vbi incidit, diu leniterq; id membrum perfricandum est ex oleo & sale & nitro, multumq; aqua calida salsa fouendum, & imponendum malagma quod digerat, astringensq; alligandum, oleribusq; & præterea vomitu vtendum. Per quæ cum carne callus quoq; extenuatur, confertq; aliquid de sinapi, quod cum ficu in alterum pariter membrum impostum, donec id paulum erodat, eoq; euocet materiam. Vbi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitæ reuertendum est.

De luxatis ossibus.

CAP. XI.

AC de fractis quidem ossibus hætenus dictum sit. Mouentur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modò quæ iuncta sunt inter se dehiscunt, vt cum latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito, & in crure tibia à sura, interdum à saltu, calcis os à talo, quod raro tamen fit. Modò articuli suis sedibus excidunt. Antè de prioribus dicam. Quorum vbi aliquid incidit, protinus is locus cauus est.

est, depressusq; digitus sinum inuenit. Deinde
grauis inflammatio oritur, atque in talis præci-
pua. Siquidem febres quoque & caneros &
neruorum vel distentiones vel rigores, qui ca-
put scapulis annectunt, mouere consuevit. Quo-
rum vitandorum causa facienda eadem sunt,
que in ossibus mollibus læsis: ubi aliquid inci-
dit, protinus his locis proposita sunt, ut dolor tu-
morq; per ea tollantur. Nam diducta ossa nun-
quam rursus inter se iunguntur, & ut aliquid
decoris eo loco sit, nihil usus admittitur. Maxil-
la verò & vertebra omnesq; articuli cum vali-
dis nervis comprehendantur, excidunt: aut vi
expulsi, aut aliquo casu nervis vel ruptis vel in-
firmatis: faciliusq; in pueris & adolescentulis,
quàm in robustioribus: hiq; elabuntur in prio-
rem & in exteriorem partem, quidam omnibus
modis, quidam certis. Suntq; quedam communia
omnium signa, quedam propria sunt cuiusq;. Si-
quidem semper ea parte tumor est, in qua os pro-
rumpit: ea sinus, à qua recessit. Et hæc quidem
in omnibus deprehenduntur, alia verò si in singu-
lis. Quæ simulatq; de quoq; dicam, proponen-
da erunt. Sed ut excidere omnes articuli non
possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim
nonnunquam compellitur, neque in spina verte-
bra, neq; ea maxilla quæ utraq; parte prolapsa
antequam reponeretur, inflammationem mouit.
Rursum qui neruorum vitio prolapsi sunt, com-
puli quoque in suas sedes iterum excidunt. At

quibus in pueritia exciderunt, neq; reposita sunt, minus quàm ceteri crescunt. Omniumq; quæ loco suo non sunt, caro ea increfcit, magisq; in proximo membro, quàm in vltiore. Vtputa si humerus loco suo non est, maior in eo ipso fit, quàm in brachio: maior in hoc, quàm in manus acie. Tum pro sedibus & pro casibus qui inciderunt, aut maior aut minor vsus eius membri relinquitur: quoq; in eo plus vsus superest, eo minus id extenuatur. Quicquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendum est. Si illa occupauit, tum conquiescat, laceffendum non est: vbi finita est, tentandum est in his membris, quæ id patiuntur. Multum autem eo confert & corporis & neruorum habitus. Nam si corpus tenue, si humidum est, si nerui infirmi, expeditius os reponitur. Sed & primo facilius excidit, & postea minus fideliter continetur. Quæ contraria his sunt, melius continent. Sed id quod expulsum est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem leuare, super succida lana ex aceto imposita. A cibo, si valentioris articuli casus est, triduo: interdum etiam quinque diebus abstinere debet. Bibere aquam calidam dum sitim finiat. Curiosiusq; hæc facere his osibus motis, quæ validis plenisq; musculis continentur: si verò etiam febris accessit, multo magis: deinde ex die quinto fouere aqua calida, remotaq; lana ceratum imponere ex cyprino factum, nitro quoque adiecto donec omnis inflammatio

matio finiatur. Tunc infriktionem ei membro adhibere, cibis vti bonis, vti vino modice, iamq; ad vsus quoque suos id membrum promouere: quia motus vt in dolore pestifer, sic aliàs saluberrimus corpori est. Hæc communia sunt, nunc de singulis dicam.

De maxillæ luxatæ curatione. CAP. XII.

Maxilla in priorem partem propellitur, sed modò altera parte, modò vtraque. Si altera, in contrariam partem ipsa, mentumq; inclinatur, dentes paribus non respondent, sed sub his qui secant canini sunt. At si vtraque, totum mentum in exteriorem partem promouetur, inferioresq; dentes longius quàm superiores excedunt, intentiq; super musculi apparent. Primo quoque tempore homo in sedili collocandus est, sic vt minister à posteriore parte caput eius contineat: vel sic, vt iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem & caput eius scorteo puluino duro: eoq; caput per ministrum vrgeatur, quo sit immobilius. Tum medici digiti pollices linteolis vel fasciis, ne dilabantur, inuoluti in os eius coniungendi: cæteri extrinsecus admo- uendi sunt. Vbi vehementer maxilla apprehensa est, si vna parte procidit, concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. Tunc simul & caput apprehendendum, & excitato mento maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est, sic vt omnia penè vno momento fiant. Si in vtraq; parte prolapsa est, ea-

K 5 dem

dem omnia facienda, sed equaliter retro maxilla agenda est. Reposito ossē, si cum dolore oculorum & cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. Cum omnibus verò quorum ossa mota sunt, primo liquidior cibus conveniat, tum his præcipue, adeo ut sermo quoque frequenti motu oris per nervos lædat.

De capite luxato.

CAP. XIII.

CAput duobus processibus in duos sinus summæ vertebrae demissis, super cervicem contineri in prima parte proposui. Hi processus interdum in posteriorem partem excidunt, quo fit, ut nervus sub occipitio extendatur, mentum pectori adglutinetur, neque bibere, neque loqui possit, interdum sine voluntate semen emitat. Quibus celerrime mors superuenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio eius rei vlla sit, sed ut res indicis cognosceretur, & non putaret sibi medicum defuisse, si qui sic aliquem perdidissent.

De spina luxata.

CAP. XIII.

Idem casus manet eos, quorum in spina vertebrae exciderunt. Id enim non potest fieri, nisi ex medulla, quæ per medium, & duabus membranulis, quæ per duos à lateribus processus feruntur, & nervis, qui continent, ruptis. Excidunt autem & in posteriorem partem, & in priorem, & supra septum transversum, & infra. Si in utranque partem exciderint, à posteriore parte vel tumor, vel sinus oritur. Si super septum

id

id incidit, manus resoluuntur, vomitus aut disten-
tio nervorum insequitur, spiritus difficulter mo-
uetur, dolor urget, & aures obtusae sunt. Si sub
septo, femina resoluuntur, vrina supprimitur, in-
terdum etiam sine voluntate prorumpit. Ex eius-
modi casibus, ut tardius quam ex capitis, sic ta-
men intra triduum homo moritur. Nam quod
Hippocrates dixit, vertebra in exteriorem par-
tem prolapsa, pronum hominem collocandū esse,
& extendendū, tum calce aliquem super ipsum
debere consistere, id intus impellere: in his acci-
piendum est, quae paulum excefferunt, non in
his, quae toto loco mutatae sunt. Nonnunquam enim
nervorum imbecillitas efficit, ut quamvis non
exciderit vertebra, paulum tamē in priorē par-
tem promineat. Id non iugulat, sed ab interiore
parte non contingit quidem posse: ab exteriorē si
propulsum est, plerunq; iterum redit: nisi, quod
admodum rarum est, vis nervis restituta est.

De humero luxato.

CAP. XV.

Humerus autem modò in alā excidit, mo-
dò in partem priorē. Si in alā delapsus
est, & victus cubitus recedit ab latere, rursus
iuxta eiusdem partis aurem cum humero porrigi
non potest, longiusq; altero id brachium est. Si
in priorē partem, summum quidem brachium
extenditur, minus tamen quam naturaliter, dif-
ficiliusq; in priorē partem quam in posteriorē
cubitus porrigitur. Igitur si in alā humerus ex-
cidit, & vel puerile adhuc est corpus vel molle,

certe

certe & imbecillibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili, & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput lati scapularum ossis leniter reducat, alteri ut brachium extendat: ipsum posteriore parte residentem humerum sub ala eius cogere, simulq; & latum os, & altera manu brachium eius ad latus impellere. At si vastius corpus nerviue robustiores sunt, necessaria est spathula lignea, & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos pervenit. In qua summa capitulum est rotundum, & leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit. In ea bina foramina tribus locis sunt inter se spatio distantibus, inq; ea lora mollia coniunguntur. Eaq; spatha fascia involuta, quo minus tactu ledat, ad alam à brachio dirigitur, sic ut caput eius summa ala subiiciatur. Deinde, loris suis ad brachium deligatur, vno loco paulum infra humeri caput, altero paulum supra cubitum, tertio supra manū. Cui rei protinus interuallatunc quoque foraminum aptata sunt. Sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum traicitur, ita alte, ut consistere homo ipse non possit, simulq; in alteram partem corpus demittitur, in alteram brachium intenditur. Eoq; fit ut capite ligni caput humeri impulsus, in suam sedem, modo cum sono, modo sine hoc compellatur. Multas alias esse rationes scire facile est vno Hippocrate lecto, sed non alia magis usu comprobata est.

ta est. At si in priorem partem humerus excidit, supinus homo collocandus est, fasciaq; aut habena media ala circumdanda est, capitaq; eius post caput hominis ministro tradenda, brachium alteri: præcipiendumq; ut ille habenam, hic brachium extendat. Deinde, medicus caput quidem hominis sinistra debet repellere, dextra verò cubitum cum humero attollere, & os in suam sedem compellere, faciliusq; id in hoc casu, quàm in priore reuertitur. Reposito humero, lana alæ subijcienda est. Si in interiore parte os fuit, ut ei opponatur. Si in priore parte, ut tamen commodius deligetur. Tum fascia primum sub ala obvoluta, caput eius debet comprehendere, deinde profectus ad alteram alam, ab eaq; ad scapulas, rursusq; ad eiusdem humeri caput tendere. Sæpiusq; ad eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. Vinctus hac ratione humerus commodius continetur. Si adductus ad latus sit, ad id quoque fascia deligatur.

De Cubiti luxati curatione. CAP. XVI.

IN cubito autē tria coire ossa, humeri, & radij & cubiti ipsius, ex his quæ prima parte huius voluminis posita sunt, intelligi potuit. Si cubitus qui innexus humero est ab hoc excidit, radius qui adiunctus est, interdum trahitur, interdum subsistit. In omnes verò quatuor partes excidere cubitus potest: sed si in priorem prolapsus est, extentum brachium est, neq; recuruatur. Si in posteriorem, brachium curuum est, neque
extend

extenditur, breuiusq; altero est. Interdū febrem vomitumq; bilis mouet. Si in exteriorē interiorēue brachium porrectum est, sed paulum in eam partem à qua os recessit recuruatum, quicquid incidit, reponendi ratio vna est. Neq; in cubito tantum est, sed in omnibus quoq; mēbris longis, quæ per articulum longa testā iunguntur. Vtrumq; membrū in diuersas partes extendere, denec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod excidit ab ea parte, in quā prolapsus est, in cōtrariam impellere. Extendendi tamen alia atq; alia genera sunt, prout nerui valent, aut ossa huc illucue sederunt. Ac modò manibus solis vtendum est, modò quadam alia adhibēda. Ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus, interdum etiam habenis iniectis satis est. Deinde rotundum aliquid à lateri parti ponēdum est, & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in alijs casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere, quæ fracto cubito suprā posita est, & tum ossa reponere. Reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. Celerius tantum & sepius id resoluendum est, multoq; magis aqua calida fouendum, diutius ex oleo & nitro ac sale perfricandum. In cubito enim celerius, quàm in vllō alio articulo, siue extra remansit, siue intus reuertit, callus circundatur, usq; si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

De Manu luxata.

CAP. XVII.

Manus

Manus quoque in omnes quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut pollicem, aut ad minimum digitum convertitur. Reponi non difficilime potest. Super durum locum & renitentem ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet, sic ut prona sit: si in posteriorem partem os excidit, supina: si in priorem, si in interiorem exteriorumve, in latus. Vbi satis nervi diducti sunt, si in alterutrum latus procidit manus, brachium in contrarium repellendum est. At his, quae in priorem posterioremve partem prolapsa sunt, superimponendum durum aliquid, idque supra prominens os manu urgendum est, per quod vis adiecta facilius in suam sedem compellit.

De Palma.

CAP. XVIII.

In palma quoque ossa interdum suis sedibus promouentur, modo in priorem partem, modo in posteriorem. In latus enim moveri paribus ossibus oppositis non possunt. Signum id solum est, quod omnium commune est, tumor ab ea, in quam os venit: finis ab ea, à qua recessit. Sed sine intentione digitorum, tantummodo bene pressum os in suam sedem reuertitur.

De digitis.

CAP. XIX.

At in digitis totidem ferè casus, eademque signa sunt, quae in manibus. Sed in his extendendis non aequè vi opus est, cum ex articuli breuiore

breuiiores, & nerui minus validi sint. Super mensam tantummodo intendi debent, qui vel in priorem, vel in posteriorem partem exciderunt, tum iam palma compelli, atque id quod in latus elapsum est, digitis restitui.

De Femore.

CAP. XX.

Cum de his dixerim, de his quoque quae in cruribus sunt, videri possum dixisse. Siquidem etiam in hoc casu quaedam similitudo est femori & humero, & tibiae & cubito, pedi & manui. Quaedam tamen separatim quoque de his dicenda sunt. Femur in omnes quatuor partes promouetur, sepiissime in interiorem, deinde in exteriorem, raro admodum in priorem, aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapsus est, crus longius altero & vastius est: extra enim pes ultimus spectat. Si in exteriorem, breuius rarumque fit, & intus inclinatur, calx ingressu terram non contingit, sed planta ima, meliusque id crus superius corpus, quam in priore casu fert, minusque baculo eget. Si in priorem crus extensum est, implicarique non potest, alteri cruri ad calcem par est: sed ima planta minus in priorem partem inclinatur, dolorque in hoc casu precipuus est, & maxime urina supprimitur. Vbi cum dolore inflammatio quieuit, commode ingrediuntur, totusque eorum pes est. Sed & si in posteriorem extendi non potest crus, breuiusque est, ubi constitit, calx quoque terram non contingit. Magnam autem femori periculum est, ne vel difficulter

ter reponatur, vel repositū rursus excidat. Quidā iterum semper excidere contendunt, sed Hippocrates & Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se restituisse memoriæ prodiderūt. Neq; tot genera machinamentorum quoque ad extendendum in hoc casu femur, Hippocrates, Andreas Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, Faber quoq; quidam reperissent, si id frustra esset. Sed vt hæc falsa opinio est, sic illud verum est. Cum ibi valentissimi nerui, musculiq; sint, si suum robur habent, vix admittere: si non habent, postea non continere. Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alterā à genu intendi. Si validius, melius adducent, qui easdem habenas ad valida bacula deligarint: tumq; eorum fustium imas partes oppositæ moræ obiecerint, superioresq; ad se vtraq; manu traxerint. Etiamnum valentius intenditur membrū super scamnū, cui ab vtraq; parte axes sunt, ad quos habenæ illæ deligantur, qui vt in torcularibus conuersi, rumpere quoq; si quis perseuerauerit, non solum extendere nervos & musculos possunt. Collocandus autem homo super id scamnum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus: sic vt semper ea pars superior sit, in quam os prolapsū est: ea etiam inferior, à qua recessit. Nervus extensis in priorem os venit, rotundum aliquid super inguen ponendum, subitoq; super id,

L genu

genū adducendum est eodem modo, eademq; de causa, qua idem in brachio fit, protinusq; si complicari femur potest, intus est. In ceteris verò casibus, ubi ossa per vim paulum inter se recesserunt, medicus debet id quod eminet, retro cogere, minister contrā inde coxam propellere. Posito osse, nihil aliud noui curatio requirit, quā ut diutius is in lecto detineatur, ne si motum adhuc nervis laxioribus femur fuerit, rursus erumpat.

De Genū.

CAP. XXI.

Genu quoq; & in anteriorem, & in interiorē, & in posteriōrē partē excidere notissimū est, in priorem non prolabi pleriq; scripserunt. Potestq; id verò proximū esse: cum idem opposita patella, ipsa quoq; caput tibiæ cōtineat. Meles tamen eum cui in priorem partē excidisset, à se curatum esse memoriæ prodidit. In his casibus intendi nervi rationibus iisdem quas in femore retuli, possunt. Et id quidem quod in posteriorem partē excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoq; eo crure reconditur. Cetera verò manibus simul, tamen ossa in diuersas partes compelluntur.

De Talo.

CAP. XXII.

Talus in omnes partes prolabitur. Vbi in interiorem partē excidit, ima pars pedis in exteriorē partē cōuertitur. Vbi huic contrarius talus, contrariū etiam signum extat. Si in priorē partē erūpit, à posteriore latus nervus durus & insanus est, minusq; is opus est: si
in

in posteriorem, calx penè conditur, plaga maior fit. Reponitur autem is quoq; per manus, prius in diuersa pede & crure diductis. Et in hoc quoq; casu diutius in lectulo perseverandum est, ne is talus, qui totum corpus sustinet, parum cōfirmatis nervis ferendo oneri cedat, rursusq; prorumpat. Calceamētis quoq; humilioribus primo tempore vtendum, ne iunctura talum ipsum ledat.

De Planta.

CAP. XXIII.

Planta ossa iisdem modis quibus in manu, prodeunt, iisdemq; conduntur. Fascia tantummodo calcem quoq; debet comprehendere: ne cum mediam plantam inuicemq; eius vinciri necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat, ideoq; suppuret.

De Digitis.

CAP. XXIIII.

In digitis nihil vltra fieri debet, quàm quod in his qui sunt in manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius aut summus canaliculo aliquo cōtineri. Hæc faciendæ sunt in his casibus, vbi sine vulnere ossa exciderūt. Hic quoq; & ingens periculum est: & eo grauius, quo maius membrum est, quo'ue validioribus nervis aut musculis continetur. Ideoq; humeris, femoribusq; metus mortis est, ac si reposita ossa sunt, spes nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculum est. Eoq; maior in vtroque timor est, quo propius vulnus articulo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse, præter digitos & plantas & manus dixit, atque in his quoq;

L 2

dilig

diligenter esse agendum, ne præcipitarent. Quidam brachia quoq; & crura reposuerunt. Et ne cancri, distentionesq; nervorum orirentur, sub quibus in eiusmodi casu fieret mors matura, sanguinem ex brachio miserunt. Verum ne digitus quidem in quo minimum ut malum, sic etiam periculum est, reponi debet ante inflammationem, aut postea cum iam vetus res est. Si reposito quoq; osse nervi distenduntur, rursus id protinus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neq; repositum est, sic iacere conuenit, ut maxime cubantem iuuat, tantum ne moueatur, neue dependeat. In omniq; tali morbo magnum ex longa fame præsidium est. Deinde ex curatione eadem quæ proposita est, ubi ossibus fractis vulnus accessit. Si nudum os eminet, impedimento semper futurum est. Id quod excedit, abscindendum est. Imponendaq; super arida linamenta sunt & medicamenta non pinguia, donec quæ sola esse in eiusmodi re sanitas potest, veniat. Nam & debilitas sequitur, & tenuis cicatrix inducitur, quæ necesse est facile noxa postea pateat.

FINIS.

Q. SERENI
SAMONICI
VITA.

533

Q. Serenus Samonicus Gordiani iunioris præceptor fuit: cuius meminit Spartianus in Caracalla, his verbis: Occisi sunt & in balneis plures, & in cœnis: inter quos Samonicus Serenus, cuius libri plurimi ad doctrinam extant. Macrobius quoq; Saturnalium tertio, carmina quadam de urbibus deuouendis in libro quinto Reconditorum Samonici Sereni reperisse se ait. Supersunt hodie hi hexametri, præcepta Medicinæ continentēs.

L 3

Q. SERENI SA-
MONICI DE ME-
DICINA PRAE-
CEPTA SALV-
BERRI-
MA,

Antonij Molinij Matifconensis opera, di-
ligenter emaculata.



MEMBRORVM series certo de-
ducta tenore

Vt stet, & assimilis medicina de-
fluat ordo,

Principio celsa de corporis arce loquamur.

Phæbe salutiferū, quod pangimus, asserte carmē,

Inuentumq; tuum prompto comitare fauore.

Tuq; potens artis, reduces qui tradere vitas

Nosti, & in cælum manes reuocare sepultos,

Qui colis Aegeas, qui Pergama, quiq; Epidaurū,

Qui quondam placidi tectus sub pelle draconis,

*tecta Tarpeias arces, atq; inclyta*templa petisti,

Depellens tetros praesenti numine morbos,

*locutus Huc ades, & quicquid cupido mihi saepe*rogati

Firmaſti, cunctum teneris expone papyris.

Capiti medendo.

Balsama si geminis instillans auribus ad-
dis,

Tum poteris alacrem capitis reparare vigorem.

Vel

Vel quæ septenis censentur gramina nodis,
 Ut iliter rectis, vel corno ex arbore fertum,
 Pulegium' re potens vna super aure locabis,
 Aut illud misto*recoquens clementer aceto, *coctum
 Cantanare trahes: seu visco lintea nexo
 Induces fronti: seu trita gramina mentæ.
 Spōgia cum tepidis annexa liquoribus hymbris
 Profuit: aut hedera ex oleo*colata vetusto. *decocta
 Profuit & cochleis frontem tractare minutis.
 Si nocuit cerebro violentia solis aperto:
 Sæpe chelidonia ex acido perducta liquore
 Sanauit: prosunt & amica papauera somno,
 Si prius in lento madefacta*terantur oliuo. *coquantur

Hemicranio medendo.

Portio si capitis morbo tentetur acuto,
 Allia diuersam lana contacta per aurem
 Inducta prosunt, & eodem balsama pacto.
 Allia vel ternis piperis terna addita granis,
 Trita lines: certam dabit hæc tibi cura salutem.

Porrigini depellendæ.

Est insensibilis morbus, sed noxia forma,
 Cum caput immesa pexu porrigine ningit,
 Copia farris vti frendentibus edita saxis.
 Hanc poterit malue radix decocta lenare.
 Aut tu fœniculum, nitrumq;, & sulphura viua
 Contere, deinde caput permistis ablue cunctis:
 Fursuribus' re nouis durum miscebis acetum,
 Ut varios crines tali des vngvine pueros.
 Prodest & tarda demptus testudine sanguis,

L 4

Et

*Et prodest cedro demissus ab arbore succus.
Desinet interea glomerari farrea nubes,
Cessabitq; grauis crebrae porriginis hymber.*

Capillo tingendo.

Q*Vos pudet etatis longa, quos scilicet senectus
Offedit, cupiunt properos abscondere canos,
Et nigrum crinem fucō simulare dolofo,
His prodest acri contrita cupressus aceto,
Vel frons lentisci, vel tristia poma sabuci:
Lumbrici quoq; terre stes miscentur oliuo,
Et iuuenem praestant rediuino flore capillum.
Praeterea niueum poterit depellere crinem,
Resina ex facili cara viscoq; coacta.
Ad rutilam speciem nigros flauescere crines,
Vnguento cineris praedixit Tullius autor.
Si praegnans artus captiui soricis edit,
Dicuntur foetus nigrantia lumina fingi.*

Phthiriasi arcendae.

N*Oxia corporibus quaedam de corpore nostro
Progeniunt natura, volens abrupte somnos
Sensibus, et monitis vigiles incendere curas.*

*Plin. li. 7. Sed quis non paueat Pherecydis fata tragædi,
cap. 31. Qui nimio sudore fluens animalia tetra
Eduxit, turpi miserum quæ morte tulerunt.*

*Plin. li. 7. Sylla quoq; infelix tali languore peresus
cap. 44. Corruit, et foedo se vidit ab agmine vinci.
Sapius ergo decet mordax haurire sinapi,
Vel nitro ac sale permixtis, acidoq; liquore
Laxatis (vt sint simul allia) tangere corpus,*

Aut

Aut lacrymis hederæ, aut succo*perducere cædri *perfun-
 Quin etiam furfur mīsto medicatur aceto. dere
 Vnda maris lendes capiti deducit iniquas,
 Et quicquid cerebri defendit sylua capilli.

Prurigini, papulis, ac scabiei arcendis.

Illothus sudor, vel copia nobilis escæ
 Sæpe graui scabie correptos asperat artus.
 Ergo lutum prodest membris adhibere fricatis,
 Quod facit ex asino siccatus corporis humor.
 Nec pudeat tractare finum, quem bucula fudit.
 Stercoris ex porco cinerem confundito lymphis,
 Sic pavidum corpus dextra parcente foueto.
 Proderit ox oleo puluis, quem congerit alte
 Dulcibus ex latebris patiens formica laborum.
 Conuenit hinc tepido lita tradere corpora soli.
 Feruentes papulas*oleo curato liquenti, *papyro
 Aut acido Baccho miscebis farra lupini,
 Atq; hinc in calido percurres membra lauacro,
 Pruritus autem salso leuat humor aceti,
 Siue maris*rabidi sudor, cochleæq; minutæ, *auidi
 Quarum contactu perimetur acerba libido.

Phrenesi, & capiti purgando.

EX vitio cerebri Phrenesis furiosa mouet,
 Amissasq; refert frendens amētia vires,
 Siue calens febris iactatos exedit artus,
 Siue meri gustus, seu frigoris efficit aura,
 Conueniet calidis pecudum pulmonibus aptè
 Tempora languentis medica redimire corona.
 Illotis etiam lanis suffire memento.

L 5

Cerituna

Ceritum saepe horrendi medicantur odores,
 Atq; ideo sanos etiam curarier est par.
 Purgatur cerebrum mansa radice pyrethri,
 Vngitur & succis, dederit quos parua sabucus,
 Expressusq; hedera mandatur naribus humor.
 Aut mistum ruta cerebro instillatur acetum.
 Non semper praesens dolor est sanabilis: ergo
 Cura magis prodest venturis obuia morbis.

De fluore capillorum, & maculis
 capitis tollendis.

D Efluit expulsus morbo latitante capillus,
 Si raro lauitur, seu vis epota veneni,
 Seu salamandra potens, nullisq; obnoxia flammis,
 Eximium capitis tactu deiecit honorem.
 Nonnunquam variant maculae, paruisq; parumper
 Orbibus aspersum ducit noua vulnera tempus,
 Viperae pellis cinerem his* addito rebus,
 Roboreas' ve pilas vsino iungito seuo,
 Vel testudineo mala permulceto cruore.

*apponi-
to

Humoribus, & perfriktionibus
 medendis.

S Aepe ita puadit vis frigoris, ac tenet artus,
 Vt vix quæsito medicamine pulsa recedat.
 Si ranam ex oleo decoxeris, abijce carnem,
 Membra foue: parili sanat ratione rigorem
 Vrticae semen, perceptaq; frigora vincit.
 Et ceruina potest mulcere medulla rigorem.
 Decoctum raphani semen cum melle vorabis,
 Siue fel vsinum tepefacta dilue lymphæ.
 Proderit

Proderit hoc potu, seu castis ostreate testis
 Vsta dabit cinerem, qui pro sale sumptus in escis
 Decutiet gelidum calefacto vertice virus.
 Nonnullus liquidum sumit mulsumq; sinapi,
 Atq; palato agitat retinensq; vomensq;.
 Allia nonnulli mandunt, olei'ue liquore
 Perfundunt calido cerebrum, nasiq; latebras.
 Quidam lactucae credunt prodesse sapes,
 Curandi modus hic & suavis & utilis idē est.

Elephantiasis propellendae.

Est elephas morbus tristi quoq; noīe dirus,
 Non solum turpans infandis ora papillis,
 Sed cita praecipitans funesto fata veneno.
 Huic erit aduersus cedri de cortice succus,
 Musteleq; cinis, vel fusus sanguis ab illa.
 Nonnulli dixerē serum prodesse bibendo.
 Mentastri folium potu, apposituq; salubre est.
 Nec frustra bulbos & sulphura iungis aceto.
 Praeterea nitrum debes cum melle iugatum
 Spargere lacte bouis, varias sic ungere frontes.
 Cerussam, & chartā, quā gens Aegyptia mittit,
 *Thure simul misceq; oleū, quod flore rosarum *Tunde
 Conditum est: line sic faciem, sic redde salutem.

Cutis & faciei vitijis propellendis.

Inuida si maculet faciem lentigo decoram,
 Nec prodesse valent naturae dona benignae,
 Erucam atq; acidum laticem simul illine malis.
 Proderit & bulbis mellis dulcedine victus,
 Cruda'ue dulcacido miscebis rapa liquori.

Sanguis

Sanguine vel leporis morbus delabitur oris.
 Frons salicis cum flore suo contrita medetur.
 *sanant Sepiola cineres ex ossibus omnia*tollunt.
 Cygneos adipēs, hilari misceto Lyæo,
 Omne malum propere maculoso ex ore fugabis.
 Horrebit si liuor atrox, aut nigra cicatrix,
 Attrito sapone genas purgare memento
 Rugarum sulcos lentisci mastice tendens.
 Si verò vitiū est quod ducit ab impete nomen,
 Hoc matutina poteris cohibere salina,
 Seu folio platani, quod mansum mane vorabis.
 Fæda fluunt curui quæ purgamenta cameli,
 Vrentur, cineremq; dabunt, iungentur aceto
 Mascula thura simul, diuinaq; cura valebit.

Aurium vitijs succurrendis.

Cvm saeuus teneras dolor alte sauciat aures,
 Fraxinea in flāmis fundit quē talea succū
 Instilles, siue obscænos ex virgine rores,
 Aut succum ex folio, dederit quē populus alba.
 Sæpe chelidonia rapidum sociatur acetum,
 Adiunctoq; nitro procedit cura salubris.
 Mentastri liquor expressus conducere fertur,
 Infectum violis oleum bene consulit auri.
 Annosa rubros si legeris arbore vermes,
 Ex oleo tere, sic tepidos infunde dolenti.
 *moriēt Si verò obtusa sensus*remoretur in aure,
 Lumbricos terræ, seuumq; ex ansere rauco
 Excoque: sic veterem poteris depellere morbum.
 Felq; bonis surdis etiam prodesse loquuntur,
 Si iuss

Si iungas olidæ graue quod minxere capellæ.

*Si vero*incautas animal penetrauerit aures,*

**in patu-
las*

Proderit admisto pauidi fel muris aceto.

At si lymphæ nocens peruasferit, anseris aptus

Immittetur adeps ceparum non sine succo:

Qui grauius est oculis, sensum tamē auribus auget.

Vs & Phæbigenæ diuinam discere curam,

Sitq; vel annosis confecta doloribus auris,

Allia tum septem numero, septemq; lupinos

Cretaceam dabis in testam: tum delphica frondis

Addatur, misto totum feruescat aceto,

Doclus eris tepidos illinc immittere rores.

Oculorum dolori mitigando.

S*umma boni est alacres hoī cōtingere visus,*

Quos quasi costodes, defensoresq; pericli

Prospiciens summa natura locauit in arce:

Sic tamen vt nullos paterentur desuper ictus,

Atq; supercilio pauidi tegerentur opaco.

Sed dolor immeritum lumen si forte laceßit,

Lana madens oleo noctu connectitur apte,

Viuentis' ve nepæ lumen gestatur amicum.

Ex folio caulis cineres, confractaq; thura

Et laticem Bacchi fætæ cum lacte capellæ

Desuper induces, atq; vna nocte probabis.

Hyblæi mellis succi cum felle caprino

Subueniunt oculis dira caligine pressis.

Vettonicæ mansus siccabit lumina succus.

Si tenebras oculis obducit pigra senectus,

Expressæ marathro guttæ cum melle liquenti

Deter

Detergere malum poterunt, vel vulturis atrī
 Fella, chelidonia fuerint quīs gramina mista,
 Hec etiam annosis poterunt succurrere morbis.
 Fel quoq; de gallo molitum simplice lymp̃ha
 Exacuet puros dempta caligine visus.
 Sive columbarum finus miscetur aceto,
 Seu fel perdiciis parili cum pondere mellis.
 Vina Chelidonia simili ratione iugantur,
 Efficiuntq; suo præclaros vngvine visus.
 Aspera quinetiam mulcent & rupta reducunt.
 Si genus est morbi, miserū quod lumen adurit,
 Hic calor infuso mitescit lacte canino.
 Anguibus ereptos adipēs ærugine misce,
 Hi poterunt ruptas oculorum iungere partes.
 *plūbum Si verò horrēdum ducent glaucomata *peplum,
 Spiritus alterius prodest, qui grana cumini
 Pallentis mandens visus exhalat in ipsos.
 *infestat, Si tumor *insolitus typho se tollat inani,
 rufos & Turgentes oculos vili circumline cæno.
 gliscit in
 orbes,

Dentium vitio, & oris fœtori
 medendo.

H Aud facile est acrē dentis tolerare dolorē,
 Quo magis ē æquū medicā p̃noscere curā.
 Cum Baccho violas decoxeris, ore teneto,
 Mansus item prodest succis oleaster acerbis:
 Hinc oscedo fugit, lingue quoq; vulnera cedunt.
 Cum vino piper & nitro tepidum inde dolenti.
 Sæpe chelidonia succo vel lacte capellæ
 Saneſcunt dentes, aut tauri felle iuuantur.

Aut

Aut acidi latices clauso voluntur in ore.
 Manditur apta rubus gingiuis, & bona labris.
 Lentiscus myrtusq; emendant oris odorem.
 Quod verò assumpsit nomen de dente fricando,
 Ceruino ex cornu cinis est, aut ungula porce.
 Torrida, vel cinis ex ouis, sed non sine vino,
 Muricis aut tostis, vel bulbi extincta fauilla.
 Ambitiosa putas, sunt ista salubria cunctis.
 Exesos autem dentes si forte querêris,
 Vre finum muris, patulis & hiatibus adde,
 Vel cinerem dentis ceruini extinguere aceto
 Conuenit, atq; canis immittere partibus apte.
 Prodest & puluis lumbrici corpore tosto.
 Ora ambusta cibo sanabis lacte canino.
 Sæpe etiam gelida gingiuas collue lymphæ,
 Dentibus ut firmum possis seruare vigorem.
 Si verò infandum proserpit ad intima vulnus,
 Permisceto salem parili cum pondere thuris,
 Hinc tractato locū, miram experiere medelam.
 Aut tu sume pilam quæ candis hæret ouinis:
 Hæc siccata dabit molles, & fracta farinas,
 Huius & attritu tetrum mulcebitur vlcus.

Vuæ, faucibus, collo, & quæ mollien-
 da sunt, medendis.

A Egrescunt teneræ fauces, cū frigoris atræ
 Vis subijt, vel cum ventis agitabilis ær
 Vertitur, atq; ipsas flatus grauis inficit undas:
 Vel rabidus clamor fractio cum forte sonore
 Planum radit iter sic est Hortensius olim.

Absump

Absumptus causis. etenim confectus agendis
 Obtulit, cum vox domino viuento periret,
 Et nondum extincti moreretur lingua disert.
 Ergo omni studio quæres inhibere dolorem.
 Simplicibus lymphis confunditur aërium mel,
 Additur excussus niuea similagine furfur,
 Decocta hæc clauso simul exercentur in ore.
 Præterea fauces extrinsecus ungere prodest
 Ursino & tauri seuo cerisq; remissis,
 Omnia quæ geminis equabis lancibus antè.
 Disce etiã miram ex humili medicamine curã.
 Actiaco melli iungas agreste papauer.
 Decoctumq; simul mandes, mansumq; vorabis.
 Crinitæ porri radices quinq; coquantur,
 Hinc aqua non feruens voluatur fauce sonora,
 Nec tamẽ in stomachũ descendat gutta patentẽ.
 Si verò adflitam langor deiecerit ruam,
 Tunc horas aliquot pronus recubare memento,
 Aut illam pulvis tostĩ releuabit anethi,
 Aut cinis ex cochlea, vel torrida brassica flãmĩs,
 Verum angina sibi mistum sale poscit acetum,
 Quod refert clauso versatum agitare palato.

De rigore ceruicis.

AT si ceruices, duratãq; colla rigeant,
 Mira loquar, geminus mulcebit vngvine
 Hic lögũ pariter nervos medicina seqt, (poples,
 Anseris aut pingui torpentia colla fouebis.
 Illinitur valido multum lens cocta in aceto,
 Aut capræ fimus, et bulbi, aut ceruina medulla,
 Hoc

Hoc etiam immotos flectes medicamine nervos.
 Quos autem vocitant tolles, attingere dextra
 Debebis, qua Gryllus erit pressante peremptus.

Tussi, & choleribus medendis.

NOxia si penitus cholerum seuire venena
 Perspicias, cocta lactucæ fronde leuabis.
 Proderit & caules assumere sæpe madentes.
 Interdum fauces tussi quatiuntur atroci,
 Alliatum sumes decocta, & melle peruncta,
 Semina vel raphani permisto dulcia melle.
 Aut si fraxinea semen de fronde reuellis,
 * Interiora vora vetitus contingere dente. * Integrio
 Ouum melle teres domitum feruentibus vndis, ra
 Marrubiū ue potēs, hæc faucibus optima sumes,
 Franabisq; grauem facili medicamine tussim.

Digestioni, & stomacho medendo.

Qui stomachum regem totius corporis esse
 Contendunt, vera niti ratione videntur.
 Huius enim validus firmat tenor omnia mēbra:
 At contrā eiusdem franguntur cuncta dolore.
 Quin etiam (nisi cura iuuat) vitiare cerebrum
 Fertur, & integros illinc auertere sensus.
 Lactucæ semen nigræ quod lignea pila
 Triuerit, admisto ieiunus sumito melle,
 Sed cochlear trinum gustu tibi sufficit vno,
 Aut tritum semen raphani, mulsumq; iuuabit:
 Sine due partes absynthi, & tertia rutæ
 Decoctis potantur aquis, siliquæq; madentes,
 Semina vel marathri fœta cum lacte capellæ.

M Puleg

Pulegium quoq; decoctum curabit amicè.
 Et potu, & fottu stomacho conducit acetum.
 Seu cochleas vndis calefactas ac propè victas
 Suppositis torre prunis, vinoq; garoq;
 Perfusas cape, sed prodest magis esse marinas.
 At male digestis si crapula scuiet escis,
 Ex pipere, & calida florem de rore marino
 Ebibe, seu salibus piper adde, & tenue cumini.

*tanges Quæ coctis*tinges epulis, & raptâ vorabis.
 *aceti Aut cubitum pergens succû cape tristis*anethi.
 Ventriculis mergi raptus saltritibus & vstus
 Tosto pane super, piperis quoq; puluere multa
 Miscentur, capies diuinum munus in istis.
 Proderit hoc stomacho, victas & cōcoquet escas,
 Grana peregrini piperis diffundito quinq;
 Niliaco melli, quæ mane inserta capeffes.

Felli, vomitui, vel phthisi arcendis.

L Vitea si crescunt, & cunctis noxia fella,
 Allia parua nouè, piperis tot pmole grana,
 Quæ cyatho diluta gari mandesq; bibesq;
 Hæc iterum septena capis, pòst deniq; quina.
 Præterea caules, frondet si parua sabucus,
 Decoctos sale permisces, ac iungis oliuo.
 Tunc capis, ac tali auxilio fella horrida purgas.
 Prosunt & pelagi latices, quos pondere iusto
 Dulcibus associas lymphis, melliq; liquenti.
 Et niueus prodest ex vberis succus asellæ,
 vinum Si tepido vino infundas, ac mella piperq;
 At vomitum radix narcissi pota mouebit.
 Si verò phthysis annoso sedet improba morbo,
 Intritas

Intritas vino cochleas hausisse iuuabit.
 Proderit & veteris seui pila sumpta suilli.
 Carne asinae seuoq; caprae medicina salubris.

Mammis fanandis, vel stringendis.

Vbera fecundo multum lactantia succo
 Sape sibi noxae nimium manando fuerunt:
 Fece igitur valida duri reprimuntur aceti.
 Post partum tumidas iniuste assurgere mammas
 Interdum aspicias, harum mala commemoratur
 Murinus fumus ex pluuiis sedare liquore.
 Sin autem clausas penitus dolor angit acerbus,
 Lumbricis terrae turgentes unge corymbos.
 Si castigatas studium est prestare papillas,
 Ex hedera sertis ambas redimire memento
 Protinus, & raptas fumis mandare coronas,
 Anseris aut seuum pariter cum lacte tepenti,
 Aut ouum* illinito tulerit quod garrula perdix. *alias, im
 Præterea pluuiis decocta papauera rore positum
 Hærescunt multis post* dissoluenda diebus. *absoluenda
 Vis & Phœbigenæ cælestia sumere dona, da
 Vbera cum tetræ laniata doloribus* horrent? *urgens
 Nautis rametum, et quæ nomine præstion herba est,
 Et quæ vulgari sermone Insana vocatur,
 Græcos hyoscyamon propria scito dicere lingua,
 Nec non & calami radix, lapathiq; legumen
 Mixta dabunt miras (experto crede) medelas.

Reiectioni cibi, aut sanguinis
 *restringendæ.

SI stomachus nondum cōcoctas expuit escas, dæ.
 Et magis atq; magis vitium* reuomendo ualescit, *recolendo
 M 2 Allia

Allia cedemus, crebrumq; trahemus odorem.
 fertur de Sin etiam rutulus confertur pectore sanguis,
Sorbitium mentæ, raphanus vel cocta iuuabit.
Sæpe lapis teritur (Specularem nomine dicunt)
Et mistis hauritur aquis, sistitq; cruorem.
 robore Vritur interdum raptus de subere cortex,
Et cinis ex calido prodest epota Lyæo,
 *pellis Ouorum cinis, aut cochlearum, aut deniq; *melis,
 *Aut ci- *Aut mansus salicum fructus prodesse putatur,
 nis salicū Aut platani pilulis acri infundemus aceto,
 ramis Nullus erit sanguis, quæ non cibus iste moretur.

Iecoris, & lateris vitijis medendis.

Ελελίσ-
 φανθ
 salvia. **S**I molles iecoris fibras dolor hauriet acer,
 Protin^o ex mulsa potāda elelispacus herba
 Sumitur et semē, qđ fraxinus alta pfudit, (est:
Vulturis atq; iecur vel ius perdicis apricæ.
Præterea simili drachma pix dura piperq;
Franguntur, sic in mollito pulvere iuncta
Egelidis miscentur aquis, recreantq; bibentem.
Absynthi quoq; decocti potabitur humor,
Si latus immeritum morbo tentatur acuto,
Accensum tinges lapidem stridentibus vndis,
Hinc bibis, aut aceris radicem tundis, & vnā
Cum vino capis. hoc præsens medicamē habetur.
 *cilonia Quid referam multis composta *Philonia rebus?
 Quid loquar antidotū varijs? quis ista requirat?
 At nos pauperibus præcepta feramus amica.
 Nec non & iecoris quæretur fibra lupini,
 Iungenturq; simul coctum, foliumq; piperq;
 Quæ diluta mero dantur potanda Lyæo.

Est

*Est & vis morbi, quod telum commemoratur,
Cum subito dolor insanus furit incitus ictu,
Persicon huic potum è nuce traditur interiore,
Quæ mihi cura satis casu monstrante probata est.*

Spleni curando.

Q*uædo lien tumido circūligat ilia uinclo,
Et plenus splenis demonstrat mēbra rigore,
Mollibus ex hedera tornantur pocula lignis,
Hinc trahet assuetos æger quoscunq; liquores,
Aut viridis coctorum holerum potabitur vnda.
Proderit exusto fluuiialis hirudo cruore,
Siue myrica potens, seu ros cum pane marinus,
Aut hederae succus potu appositusq; iuuabit.
Nec non intactam ferro quam videris alnum,
Huic liber eripitur ferro sine, decoquiturq;
Donec victarum pars tertia subsit aquarum.
Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.
Nonnulli memorant consumi posse lienem,
Eruum si semper ieiuno sumpserit ore.
Arida ficus item feruente domatur aceto,
Et trita illinitur, vel splen apponitur hædi.
Marrubium in vino potum prodesse loquuntur,
Præterea piper, ac nepetæ cum flore et anethum,
Capparis atq; apium, buglossaq; iungitur vnâ:
Morum decoctos latices potare salubre est.
Pulegium, abrotonū nitida cum mastiche coctum
Ac thymbræ speciē (quam cōmemorat cephalotē)
Prædixit spleni Deus Idæ posse mederi.
Dulcia, Plautus ait, grandi minus apta lieni.
Splen tumidus nocet, et risum tamē addit ineptū,*

M 3 Vt

Vt mihi sardois videatur proximus herbis,
 Irrita quæ miseris permiscet gaudia fati.
 Dicitur exectus faciles auferre cachinnos,
 Perpetuoq; auo frontem præstare seweram.

Præcordijs sanandis.

Languida si duro turgēt præcordia morbo,
 Miscetur mulsæ farris sextarius unus,
 Nec non & lini tunsum, siliquaq; legumen.
 Hæc decocta simul, nondumq; tepentia nectes.
 Aut quæ poma Cydon Cretæis misit ab oris
 terres Cocta lines, durum ut possis mollire tumorem.
 Ocyma præterea, bulbi uel linuntur amari.
 Proderit & lymphis corpus mersare marinis.
 Quin etiam catulum lactantē apponere membris
 Conuenit, omne malū transcurrere fertur in illū.
 Cui tamen extincto munus debetur humandi.
 Humanos quoq; contactus mala tanta sequuntur,
 Et iunctus vitium ducit de coniuge coniunx.
 trita iun Quod superest thridaci iunges ramenta carinae,
 ges Quod decem ex rebus* confit simul atq; uocatur,
 *decator- Mastichis addentur fractæ iam mollia farra.
 thoma ri- Talibus auxilijs præcordia tuta resident.

te uocatur

Lumbis, & renibus sanandis.

Cum seuit penitis hærens iniuria lumbis,
 Igne lapis candēs datur exultatibus undis,
 Hoc poteris potu tristem superare dolorem,
 Aut pice cum melli nitrum sulphurq; et acetum
 Succida lana rapit contacta calentibus ijsdem,
 Proderit hanc ægris crebro perducere membris.
 Aut caput asparagi cum vino sume vetusto,

Sen

Seu maior appone, modus conducit uterq;
 Aut adipi mistum lumbis inducito sulphur.
 Sæpe chelidonium cum succo Palladis addes,
 Farraq; quæ tremulis prosunt sudantia flammis.
 Fertur amygdalina succus nucis esse bibendus:
 Pinsitur, ac tepidis sorbebitur addita lymphis.
 Aut tres ex vino cochleas feruescere coges,
 Cumq; suis domibus franges, piperis quoq; grana
 Ter quinq; adicias, potuq; iuuaberis illo.
 Furfur item parca fuerit cum feruidus unda,
 Post oleo madidus* succis immittitur aptis, *saccis
 Quæ vix passuris* vrentes addito membris. *vrentia
 Prodest ceruinæ* vehemens natura medullæ, iungito
 Nec nocuit ciceris cocti potasse liquorem: *medicâs
 Aut mistam teneris* malua contundito porris, *madi-
 Contritumq; simul cum mastiche cõfer anethum, damq; ele
 Quodq; decẽ rebus componi ex nomine clarũ est, lisphacora
 His cõtinge locũ. Deus hac mihi certa probauit. vndis

Ventris dolori mitigando.

SI dolor insanus tota deseuit in aluo,
 Heminis tribus in lymphæ tu decoque tritũ,
 In vino prius hyssopum, validam quoq; rutam,
 * Aut apium, donec pars duplex desit aquarum. * Atq;
 Potus erit medicus non detractante palato.
 Præterea niuei sterilis tosta vritur oui.
 Quæ postquàm in tetrã fuerit conuersa farinam,
 Ex calidis potatur aquis, & pota medetur.
 Nec non iungenda est vtero noua virga myricæ,
 Illæsa hæc ferro terraq; intacta teratur.
 Aut medio ventris prodest aspergere terram,

M 4

Quam

Quam signauerunt vestigia pressa rotarum.
 Proderit & puluis facili sub cardine raptus.
 Quin etiam ex lymphis tritum potare cuminum
 Conueniet, quod iam nobis documenta probarunt.
 Menta quoq; hoc pacto medicos dabit hausta sa-
 Cœliacos autē recreabis pane salubri, (pores.
 Quem madido farre efficies, ac mollibus ouis:
 Quorum testa fero prius euanescere aceto
 Refert, & teretes bulbos mollire terendo,
 Cumq; his Lenæi durum potare fluentum.

Hydropisi depellende.

Corrupti iecoris vitio, vel splenis, acerbus
 Crescit hydrops, aut cū siccata febre medul-
 Atq; auidæ fauces gelidū traxere liquorē, (le
 Tum lymphæ interius vitio gliscente tumescit,
 Secernens miseram proprio de viscere pellem.
 Conueniet teneræ radix decocta sabuci
 In geminis calidi cyathis potanda Lyæi.
 Nec non & tepidis conuolues corpus arenis.
 Apposituq; lenes nepetæ, gustuq; iuuabunt.
 Helleboro quoq; purgatur lymphaticus error.
 Aut huius vice quod fert semen lenta genista
 Miscetur, mulsis & cautis ducitur vndis.
 Sæpe & scyllino pelluntur noxia Baceho.

nitro Est qui præualidum frixo sale miscet acetum.

turgētia Atq; olei succo refricant albertia membra.

Fraxineum semen cum Bacchi rore bibendū est.

Nec non apposito curantur dropace membra,

filicis Aut calido salicis radicem mollit Iaccho,

Qui subito raptos ventos, succosq; reuellit.

Vingvine

Vinguine quo frangit vires languoris aquosi.

Ventri molliendo.

Saepe cibi specie, vitio vel corporis ipso,
 Potibus aut duris restricta morabitur aluus. Specie, id
est quali-
tate.
 Vincetur talis mora gramine Mercuriali,
 Cuius aquam cocti minimo cum melle bibemus.
 Prunaq; conueniunt, quae mittit clara Damascus.
 Multos praterea medici componere succos
 Assuerunt: pretiosa tamen cum veneris emptum
 Fallêris, frustra q; immensa nomismata fundes.
 Quin age, & in tenui certam cognosce salutem.
 Aut igitur tectum lana supponis alumen,
 Aut edis in patinis teneræ decocta sabuci,
 Vel cum lacte caprae salsum mulsumq; capeßes.
 Crede tamen potum meliorem lactis equini.
 Dicitur hic validos asinae peruincere succos.
 Syluestris fici lacrymam prodesse loquuntur.
 Quodq; satis melius verbis dicemus Horati
 Mugilis, & viles pellant obstantia conchæ.
 Sed cochleas prius est vrtica aut fursure pasci,
 Purior hinc gustus noxa sine mouerit aluum.
 Sæpe thalassomeli* iunctum cumulauius hymbri, *adieceto
 Hæc purgant, parili fuerint si pondere mista.

Solutioni ventris, & dysenterię
 compescendę.

TAm varij casus mortalia secla fatigant,
 Vt sint diuersis obnoxia corpora morbis.
 Sæpe etenim nimio cursu fluit impetus alui,
 Frenat commisto cum feruet brassica vino.
 Aut cerasi victum longo iam tempore pomum,

M S Succus

*Succus amineæ vitis cum pane medetur,
 Vel bene permistum calida potatur acetum.
 Vile quidem, facile factu, tamen vtile opinor.
 Si ledunt medica data purgatoria dextra,
 Adiecto piperis medicatur pulvere calda.
 Sin autem longo decurrent intima fluxu,
 Atq; immane malum multo iam tempore gliscit,
 Torridus ex vino cortex potabitur oui.
 Ramentum niuei credunt prodesse elephantis.
 Arbore Pyramea cortex direpta coquetur
 Axe sub athereo, sic nigro mista Lyæo
 Immensum poterit potu retinere fluorem.
 Numinis aut iussu cedrum cum mastiche misces,
 Mollitamq; picē, & rasum de nauibus vnguen,
 Languida quo fidens medicamine mēbra fouebis.
 Proderit & pueris quos dentis origo fatigat,
 Castaneas coxisse nuces, & sorba vetusta,
 Atq; apium, caulesq; rubus quos fundit acuta,
 Potio quæ fluidam consumpta morabitur aluum.*

Lumbricis & tineis purgandis.

Quid nō aduersum miseris mortalib. addit
 Natura, interno cū uiscere tinea serpens,
 Et lumbricus edax uiuant inimica creanti?
 Quod genus assiduo laniat præcordia morsu.
 Sæpe etiam scandens oppletis faucibus hæret,
 Obsessasq; vias vitæ concludit anhelæ.
 Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus,
 Vel nepetæ tritum ex vino vel lacte capellæ,
 Nec non & succus medici potatur aceti.
 Prodest præterea cum Baccho persica frondis.

Demos

Democritus memorat mentæ conducere potum.
 Sumitur abrotonum, nec non et vile melanthum,
 Allia per sese sanant, aut ius coriandri.
 Quin & marrubiū decoctū haustumq; iuuabit,
 Pulegium'ue potens, & agreste iugatur anethū,
 Synthesis hæc prodest vnda mollita calenti.

Colo sedando.

CUm colus inuisū morbi genus itima carpit,
 Mande galeritā volucrē quā noīe dicunt,
 Aut pauidi leporis madefacta coagula pota.
 Siue apio nepetas tereti cum mastiche iunges,
 Nec non & species ambas redolentis anethi,
 Quarum decoctos patiens haurito liquores.

Vesicæ, & calculo purgando, & vrinæ
 prouocandæ.

SI cui vesicæ tardus cunctabitur humor,
 Hæc mora rumpetur vino peruicta vetustæ,
 Prodest ex paruis acinos potare sabucis,
 Aut hederæ succum, aut lacrymosi trita sinapis.
 Nec non resinas ex oricia terebintho
 In speciem eruiiæ paruos glomerabis in orbes,
 Quos ternos tepida mistos hausisse medela est.
 Quondam etiam nimio præceps vrina fluento
 Irrigat exuias, obscænoq; inficit hymbri:
 Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus.
 Vel nepetæ ex vino tritum vel lacte capellæ.
 Tum leporis cerebrum ex vino potare* decebit. *iuuabit
 Si dolor internam vesicæ concoquit aluum,
 Subueniet radix frondosæ epota cypressi,
 Pulegium'ue potens domitū feruentibus vndis.

Si

Si vero in lapides densus conuertitur humor,
 Qui retinet cursus, gemitumq; dolore frequētat,
 *sphōgite Saxifragam seu*fontigenā succurrere credunt.
 Præterea semen myrti syluestris laccho,
 Atq; oleo mistum bibitur, nec desit acetum,
 Vinaq; sumantur fricō condita cumino,
 Siue palumborum capitur finus acre ferorum
 Dulcacidis sparsum succis trituq; solutum,
 Necnon obscænus capræ potabitur humor.
 Obruit hic morbum, labefactaq; saxa remittit.

Conceptioni, & Partui.

IRrita coniugij sterilis si muncra languent,
 Et sobolis spes est, multos iam vana p annos,
 Fæmineo fiat vitio res, nec'ne, silebo:
 Hoc poterit quartus magni monstrare Lucreti.
 Sed natura tamen medicamine victa potenti
 Sæpe dedit fœtus studio curante paratos.
 Aut igitur leporis consumit fœmina vuluam,
 Aut ovis in stabulis fractas cū ruminat herbas,
 Pendentem spumam molli deducit ab ore,
 Atq; illam meminit misto potare falerno.
 Mercurialis item capitur communiter herba:
 Sic cubitum noctu coniunx festinet vterq;
 Atq; vbi iam certum spōdet prægnatio fœtum,
 Vt facili vigeat seruata puerpera partu,

Qui, subau-
 di partus.

*Pulegio
 admixto ve-
 nit em-
 bryo nec
 aceto.

Dictamum bibitur, cochleæ manduntur edules,
 At qui olim mēses minus octo moratus in aluo,
 Irrumpit thalamos, & nexus soluit inertes.
 *Pulegij quoq; purgati tunc conuenit hymber,
 Cuius opem veram casus mihi sæpe probarunt.

Quin

Quinetiam stercus supponunt vulturis atri,
 Sētiat vt minime partus quā proximus vrget. Sētiat; sub
 audi fœmi
 na.
 Oua etiam rutæ & fragili miscentur anetho,
 Quæ diluta simul vino, atq; exhausta medentur.

Profluuiio cuiusq; sanguinis, & ma-
 trici subueniendæ.

SI modicus pleno manat de corpore sanguis,
 Subuenit: at nimius cū vita funditur ipsa.
 Quapropter multo naris completa cruore
 Cum fluit, attritus cimex conducit odore.
 Lana oleo madefit, sed nondum lauta rosato,
 Hæc datur in nares, vel claudet densius aures.
 Contritis prodest cochleis * perducere frontem, * obduce-
 Aut galli cerebro, vel sanguine tinge columbæ. re
 Quòd nisi supprimit sanguis, potādus et ipse est.
 Præterea Pharijs caput emetire papyris.
 Detrahe quod superest, aliò genitalia neſte.
 Fæmineas prodest illinc vincire mamillas,
 Menſtruus immenso si profluit impete sanguis.
 Succida lana malos remoratur subdita cursus,
 Mortua quinetiam producit corpora partu.
 Sed quacunq; fluit vis immoderata cruoris,
 * Subereus cortex calidis potatur in vndis * Suber-
 Antè minutatim studio vincente terendus. nus
 Pulegiū calido purgatur fœmina potu.
 Sed si forte cruor clauſa cunctabitur aluo,
 Aut molles nepetæ, aut rutæ quæcūq; bibentur,
 Aut si puniceos fundit vesica liquores,
 Marrubium ex passo tritum perfunditur vndis,
 Hi poterunt haustis rutilum purgare colorem.

Reliq

*dictami Reliquias partus * eadem tibi detrahit herba.
 detr. Quod si faeminei properabit sanguinis hymber,
 Est qui frustra mole percussu decutit vno,
 Quorum aliquot lanis tectū ad praeordia neſcit,
 Hæc simul incantans ſiſti debere cruorem,
 Vt lapis ille viæ ſolitos iam deſtitit orbes.

Internecandis, quæ oculos impediunt.

Mobilis hirsutas horret laſciuia ſetas,
 Et gaudet raptō nudari flore pilorum.
 Sed bona nonnunquam vellendi cauſſa videtur,
 Corpora cum releuat, ratio manifeſta ſalutis.
 Namq; oculos infeſta pilorum tela laceſſunt,
 Quodq; illis dederat vallum natura tuendis,
 Inde inimica ſeges proprios deſauit in orbes.

Ergo locum crinis vulſi continge cruore,
 Quæ dat auis, tremulis ſimulat quæ pellibus alas.

Præterea quaſcunq; voles auertere ſetas,
 * obduce- Atq; in perpetuum rediuiua* occludere tela,
 re Corporibus vulſis ſaniam perducito rane,
 Sed quæ parua ſitu eſt, & rauco garrula queſtu.
 Necnon quæ ſtagnis ceſſantibus hæſit hirudo
 Sumitur, & viuens ſamia torretur in olla,
 Hæc acidis iungit permiſta liquoribus artus,
 * procre- Auulſamq; vetat ruruſus* percreſcere ſyluam.
 ſcere

Omnibus obſcœnis medendis.

Dicēdū, et quæ ſit mēbris medicīa pudēdis.
 Languidus antiquo purgāt penis Iaccho,
 Ac ſuper illinitur fœcundæ felle capellæ.
 Mane nouo myrti frondes commandere prædeſt
 Cui dolet, atq; illas in vulnus deſpuat ipſum.

Fecit

Fece etiam vini genitalia lauta leuantur,
 Et tumidos testes nereia lymphæ coërcet,
 Vel bulbi ex mulso, vel cæra immista cupresso.
 Aut fuba cum tepidis Bacchi decocta fluentis.
 Ramicis immensum fertur cohibere tumorem
 Far madidum lymphæ, et ferali fronde cupressi,
 Vnde etiam potu frons hæc memoratur amica.
 Sin autem existit durū tibi glandibus inguen,
 Proderit induci cochleas cum melle minutas.
 Obscenos si pone locos noua vulnera carpent,
 Horrentum mansa curantur fronde ruborum.
 At si iam veteri succedit fistula morbo,
 Mustela cinere immisso purgabitur vlcus,
 Sanguine seu ricini quem bos gestauerit antè.
 Herba chelidonia fertur cum melle mederi,
 Herbaq; cum seuo folijs de mille vocata.

Ischiæ, & articulari morbo.

Sæpius occultus victa coxendice morbus
 Perfurit, & gressus diro languore moratur,
 Populus alba dabit medicos de cortice potus,
 Necnon & teneræ gracili de fronde genista.
 Arreptos caules, acidoq; liquore madentes
 Sumere conueniet, rubiam quoq; ducere potu,
 Aut in * amineo cochleas haurire Lyæo.
 Si verò articulos tabes inimica per omnes
 Hæserit, ex ficu betas ac melle ligabis,
 Vel pelagi latices simul & baccheia dona
 Sumere curabis, nimio sed parcito vino.
 Ennius ipse pater dum pocula siccant iniqua,
 Hoc vitio tales fertur meruisse dolores.

* aliàs
 Bithynæ
 vel, irina

Furunc

Furunculo medendo.

CV'm sanguis nimius puri cōmixtus atroci
Aestuat, & papulas altè sustollit acutas,
Resinam miscēs, & saxis ordea fracta.

Consperfa hæc tepidis apponere conuenit vndis.

* hyoscya *Vis & * hyoscyamum caræ seuoq; iugatum*
mi semen *Nectere, nō minus hæc poterit medicina iuuare.*
seuumq; *Pratereaq; fimum ex gallo quod legeris albo.*
Hymbribus ex acidis fidens appone dolenti.
Auribus aut pecudum molles expromito sordes,
Vngvine quo fotis dabitur medicina papillis.

* tollendo

Carboni * medendo.

HOrrēdus magis est, pimit q corpora, carbo:
Vrit hic inclusus, vitalia rumpit acerbus:
Hunc veteres quōdam varijs pepulere medelis:
Tertia nanq; Titi simul & centesima Liui
Charta docet ferro talem candente dolorem
Exectum, aut poto raporum semine pulsum:
Infecti dicens vix septem posse diebus
Vitam produci: tanta est violentia morbi.

* laticem *Dulcacidum * laticemq; cumini semine iunges,*
cum lini *Atq; fimum pariter Paphiæ compone columba.*
Hinc line diruptas partes, & clausa venena.

* adoper- *Praterea triti reserant * & operta lupini.*
ta *Nonnullus calcem viuam dissoluit aceto,*
Fumantemq; niuem papulis apponit acerbis.
Est qui gallina perducatur stercore corpus.
Allia vel piperi parce commista liuuntur
Pythagoræ cognata leui condita cumino.
Proderit & madida fermenti polline turgens.

Pani,

Pani, vomica, & strumæ depellendis.

Sunt alij quos dura^{*} mouet natura tumores ^{*vomit}
 Non minus horrendi, sed non ita perniciosi.
 Vomica qualis erit, vel eidem proxima quædam:
 Simplice resina miscebimus hordea tusa,
 Et mulso amnes, & purgamenta columbe,
 His bene decoctis languentia membra fouentur.
 Mollis odorato faba iungatur coriandro.
 Proderit appositum, mollitq; aperitq; tumorem.
 Aut de phasgano radix decocta palustri,
 Quæ salis admisto tundetur condimento.
 Proderit & māsūm quod traxeris arbore visci.
 Gramen hyoscyami ceræ seuoq; vetusto
 Concilia, mistisq; locos perduce dolentes.
 Exercere etiam corpus medicina potens est.
 Ouum defundes in fictile, deinde putamen
 Marrubij succo implebis, post melle liquenti
 Omnia consociata tepenti prospera potu
 Sumuntur, reserantq; malum purgantq; leuantq;.

Igni sacro demouendo.

Est etiam morbi species, quæ dicitur ignis, ^{ἔγυσι πέλαις}
 Læguida quo multo torretur mēbra calore, ^{Græcis dici}
 Vel tu vicino seuum bouis igne remittis, ^{tur, vulgo}
 Mollitumq; lines, vel oloris fecibus oua, ^{ignis diui}
 Sed non cocta dabis, sic torrida membra fouebis. ^{Antonij.}
 Lumbricus terræ misto inducetur aceto, ^{Fecibus, id}
 Aut parili noua ruta modo, sed iungis oliuum, ^{est, excre-}
 Ouaq; cum betis prosunt sæpe illita tritu, ^{mētis, siue}
 Allia dant cinerem sociato oleoq; geroq; ^{pinguibus,}
 Vngvine quo gliscens deponet flamma furorem. ^{hoc est ad}
 N Sape ^{pe.}

Sape chelidonia pars candida iungitur oui.
 Quae modico potu sed vili trita capeffes,
 Admiscere memor lymphas amnemq; falerni.

Podagra depellende.

*trigemi
 23.45

Queda: ut rabidae medicamina digna poda
 Cui ter*tricenae spes Epidauri ipe (gra,
 Dixit inesse deus, requiem tamen indere morbo
 Fas erit, & tristem saltem mulcere dolorem.
 Ergo age & arreptu salicis frondemq; librumq;
 Cum vino tere, sic contractos perline nervos.
 Aut cum prima mali sese ostentabit origo,
 Feruida non timidis tolera cauteria plantis,
 Seminecis'ue hirci referato pectore calces
 Insere, sic dirae reprimes primordia pestis.
 Aut si corruptus persederit altius humor,
 Trita cupressus ibi Baccho iungetur acerbo
 Panibus & teneris, cohibebitq; addita quae
 Parua sabucus item hircino collita seuo,
 Triticeaq; acido manantes amne farinae,
 Aut nitidum ranae decoctum viscus oliuo,
 Siue chelidoniae succus sale mistus aceto.
 Sunt quibus apposita siccatur hirundine sanguis.
 Non audita mihi sit fas, sed lecta referre,

*ravidus

*mersit

Vide Plin.
 lib. 22. cap.

25.

Hoc quidam *raptus morbo per tempora mesis
 Vicino plantis frumenti *presit acervo,
 Euasitq; grauem casu medicante dolorem.

Vulneribus ferro, aut verberibus factis.

Natura vitij medicas obiecit artes,
 Nunc & fortunae iaculis obsistere par est.
 Si cui forte lapis teneros violauerit artus,

Necte

Nec te adipēs vetulos & tritam chamæcisson,
 Nec pudeat luteæ sterco perducere porcæ.
 Sin autem seuo laceratum est verberē corpus,
 Tum lixiua cinis ceras dissoluit & ova,
 Admixtoq; oleo vibices comprimit atras.
 Si verò infrenus manat de vulnere sanguis,
 Purpura torretur conchyli perlita * succo,
 Huius & atra cinis currentem detinet undam.
 Verrucæ quoq; defectæ frenare cruorem
 Dicitur ambustus tyrio de vellere pulvis:
 Præterea nimios reſerati vulneris amnes
 Peniculi cinis astringit vel fimbria porri.
 Siue finus manni cum testis vritur oui,
 Et reprimat fluidos miro medicamine cursus.

Vulneribus quibuscunque casibus
 factis.

TAm varia humane sūt vulnera cōditioni,
 Ut nequeā proprias cunctis ascribere curas.
 Iisdem igitur monitis casus* armabimus omnes, * sanabi-
 Sic tamen ut nullus medicinam clauſerit error. mus
 Ergo modus quicumq; obtingit vulneris atri,
 Contritus cum melle dabit medicamina bulbus:
 Herbaq; quæ folijs nomen de mille recepit,
 Appositu prodest adipi permixta vetusto.
 Succida cum tepido neſtetur lana Lyæo.
 Ambusta'ue cinis complebit vulneris ora.
 Concludit verò vel frons vel ramus ab ulmo,
 * At succis hedera pulchreſcit fæda cicatrix. * V

Hominis ac Simiæ morſui.

Siue homo, seu ſimilis turpiſſima beſtia nobis
 Vulnera dēte dedit, virus ſimul intulit atri,

*puro Betonicam ex *duro prodest assumere Baccho.
 Necnon & raphani cortex decocta medetur,
 Si trita admorsis fuerit circumlita membris.

*venenis

Serpentium moribus, & * viperinis
 excludendis

Cuspide nō quisquā lōge neq; cade carissae,
 Fulmīe nō gladij, volucris nec felle sagittae
 Quā cito vipereo potis est affligier ictu.
 Quare aptam dicamus opem, succosq; medētes.
 Quem nocuit serpens, fertur caput illius apte
 Vulneribus iungi, sanat quem sauciat ipsa:
 Utq; Larissaea curatus Telephus hasta.

Proderit & caulem cum vino haurire sabuci,
 Aut coctum raphanilibrum tritumq; ligare,
 Siue etiam excelsa folium de mole cupressi,
 Aut tithymallus atrox vulnus cōtrita pungit.
 Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,
 Ex illo radix tepido potatur in ammi.

Ceruino ex faetu commista coagula vino
 Sumuntur, quae res membris agit atra venena.

Aut ferulae radix potatur in hymbre Lyaei
 Betonicaeue leues, gallinae aut iura vetustae.

Si verò horrendum vulnus fera fecerit aspis,
 Urinam credunt propriam conducere potu,

Varronis fuit ista senis sententia: necnon

Plin. 28.
 cap. 6.

(Plinius ut memorat) sūpti iuuat hymbre aceti.

Dicendū, et quae sit praecox medicina timēti,
 Cautio: nanq; potest diros praeuere morsus,
 Si iecur exectum tardo de vulture portes.

Erucis aut si totos perduxeris artus,

Quas

Quas prius attritas vehementi spargis aceto.
 Aut tu ceruina per noctem in pelle quiesces,
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.
 Toxicæ praterea qua sint pellenda medela,
 Expediam: sanguis poterit prodesse caninus,
 Qui facili potu antidotos imitatur honestas.
 Vis et mirificos cautus prædiscere odores,
 Accensis quibus arcetur teterrima serpens,
 Aut styracem torres, aut diri vulturis alam,
 Vel nepetâ, aut frondē rigida stirpemq; myrica.

Ictibus Scorpii, & moribus Muris
 cæci, vel Aranei.

Sunt minima species, sed diræ vulnere pestes,
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallât,
 Scorpium ut grauis est et araneus, hæc mala semper
 Captant securos multa iam nocte sopores,
 Et documenta dedit nobis prostratus Orion,
 Magna quod exiguis perimatur * sæpe venenis. * membra
 Et quum vulnus atrox incussit scorpium ardēs,
 Continuo capitur, tunc digna cade retusus,
 Vulneribusq; aptus, fertur reuocare venenum.
 Aut calidis pelagi lymphis loca lesa fouentur,
 Siue meri potu dissoluitur improba pestis.
 Ad cunctos autem morsus ictusq; minorum
 Caseus aptus erit * sima de lacte capellæ, * pauida
 Cumq; hoc absumi debet origanus herba:
 Hæc duo mirificis curabant icta medelis.
 Nec non * peniculo calidum annectetur acetum, * foenica -
 Aut vinum sulphur sicci cum fece Lyæi. lo
 Exiguo piperis cerebrum conspergito * galli, * melis

Quo lita sanescunt depulso membra dolore.
 Sin autem muris nocuit violentia caci,
 Quæ sola signavit voluendis orbita plaustis,
 Illinc, mira datur vili de pulvere cura.

Subitaneo dolori, feбри, atque
 ostocopo.

Nonnāquā existit subiti noua causa doloris
 Cuius origo latet, veris reprimēda medelis.
 Nanq; chelidonium misto sale neclere prodest,
 Velleraq; infuso recalentia sulphure sanant.
 Ostocopo lento conducit melle perungi.
 Sin autem calidæ depascent corpora febres,
 Tunc apij succus leni sociatur olino.
 Membra lines, fotuq; ferus mulcebitur ignis.
 Nec spernendus adeps, dederit quæ bestia melis.
 Seminecis cerui lacrymam miscere liquori

*dolentes Conuenit, atq; artus illinc mulcere*calentes:
 Sic lacerat morbum, bilemq; reuoluit in aluum.
 Præterea chymum stomacho deficcat iniquum,
 Quæ magis atq; magis promittūt corpora claudi.
 Febribus aut longis galli noua iura vetusti
 Subueniunt, etiā tremulis medicantia membris.

Quartanæ typo mediando.

NEc tu crede leuem dilato tēpore febrem,
 Quæ spatium sibi dat, magis vt cessando
 Letali quæ grassat quartana calore, (calescat,
 *discam⁹ Ni medicas adhibere manus*curem⁹ et herbas.
 Allia non pudeat terno cum cimice trita,
 Et diluta mero medijs haurire diebus.
 Aut facilem iecoris murini ducere fibram,

Quat

Quattuor vt duri iungantur scrupula Bacchi.
 Mira est absynthi cum simplice potio lymphæ.
 Sume tribus digitis apprensū semen anethi,
 Tantundem marathri, mulsū nec desit aceti,
 In cuius cyatho prædicta salubriter hauris.
 Meonie Iliados quartum suppone timenti.
 Aut leporis trepidi diluta coagula trade.
 Prodest & potus, * sed mulsus doris humor. * vel
 Quidam etiam miranda ferunt veniente calore,
 Iurantes ludum Veneris munusq; petendum.
 Sed prius est oleo partus feruescere ranae,
 In triujs, illoq; artus perducere succo.

Tertianæ typo medicando.

Est etiam alternis febris rediuiua diebus,
 Tēpora discernēs quasi iusta pōdera libræ.
 Vt possis igitur talem prohibere furorem,
 Inuolues cæra pallentis grana cumini,
 Puniceaq; indes pelli, colloq; ligabis.
 Pulegij ramus lanae velatus amictu
 Tempore suspecto medicos præbebit odores.
 Præterea tritus cimex potatur in ouo
 Horridus attractu, sed gustu commodus apto.

Puniceæ
 pelli, hoc
 est, malico
 rio, quæ
 testa ē ma-
 li punici.

Quotidianæ typo medicando.

At qui continuis non cessat adire diebus,
 Sed tātū certas morb⁹ discriminat horas,
 Triticum metuit granū (si credere dignum est)
 Quod latitans fracto fuerit sub pane repertum,
 Nec non ossa iuuant septis inuenta domorum.
 Conuenit hæc tereti pendentia subdere collo.
 Multaq; præterea verborum monstra silebo:

N 4 N.m

*Nam febrem vario depelli carmine posse
Vana superstitio credit, tremulaq; parentes.*

Hemitritæo depellendo.

Figes hoc
videlicet
modo, atq;
ordine:

Abracadabra
abracadabr
abracadab
abracada
abracad
abraca
abrac
abra
abr
ab
a

Mortiferū magis est, qđ Gracis hemitritæū
Vulgatur verbis, hoc nostra dicere lingua
Non potuere vlli, puto, nec voluere parentes.
Inscribis chartæ, qđ dicitur Abracadabra,
Sæpius, & subter repetis, sed detrahe summā,
Et magis atq; magis desint elementa figuris
Singula, quæ semper rapies, & cætera figes,
Donec in angustum redigatur littera conum.
His lino nexis collum redimire memento.
Nonnulli memorant adipem prodesse leonis.
Coralium atq; crocum corio connectito felis,
Coralium verò si collonectere velles,
Nec dubites illis virides miscere smaragdos.
Talia languenti conducent vincula collo,
Letalesq; abigent (mirāda potentia) morbos.

Fracturis, & luxis sanandis.

Infandum dictu cunctis procul absit amicis,
Sed Fortuna potens omen cōuertat in hostes.
Vt indigna nouo si sparserit ossa fragore,
Conueniet cerebrum blandi canis addere fractis,
Lintea deinde superq; inductasnectere lanæ.
Sæpius & succos conspergere pinguis oliui,
Bis septem credunt coalesceere cuncta diebus.
Aut veteri Baccho capræ finus inde petulcæ,
Hoc aperit clausum, trahit hærens, sanat apertū.
Si verò caput infestus colliserit ictus,
Ex oleo necti vestis debet arachnes,

Nescies

Nesciet hac illinc (nisi cum sanarit) abire.
 Quod si luxa suo decedant membra tenore,
 Vrere fœmineos crines, ac iungere seuum
 Congruet, ac tali medicamine mota ligare.
 Aut malum ex pingui tritū apposuisse iuuabit.
 Aut si conclusum seruauit tibia vulnus,
 Stercus ouis placide iunges adipēsque vetustos,
 Pandere quæ poterunt ulcus, patuloque mederi.

Neruis incisis, & dolentibus, atque
 contractis.

H Aud q̄s q̄ credet disiectos vulnere neruos
 Ad solitū rursus reuocari posse vigorem.
 Sed prodest terræ lumbricos indere tritos,
 Quis vetus & *rancia sociari axungia debet. *rancens
 Si verò occultus neruos dolor vrit inertes,
 Vulturis excisos adipēs rutamque remitte,
 Aut caram, & tali recreabis languida fotu.
 Conuenit & pelagi calidis persundier vndis.
 Carica, vel betis lento cum melle iugatur.
 Aut Baccho madesacta Ceres cum fronde cupressi,
 Quo poteris *potu recreare rigentia membra. *fotu
 Sin autem subito replicantur corpora morbo,
 Contractos reuocat neruos caro sumpta colubæ.

Aegris somno adsciscendo.

N On solū miseros teterrima febris adurit,
 Sed super optato pergit viduare sopore,
 Ne profint placidi cœlestia munera somni.
 Charta igitur, varijs quam pinxit litera verbis,
 Vritur, inde cinis calido potatur in amni.
 Proderit & magnū capiti subternere fulcrum,

N 5 Prodest

Prodest & mistam lymphis potare cupressum,
 Palladijs itidem succis, quos flore rosarum
 Iungis, & immisces madidū tritumq; papauer.
 Quo lita frons facilem præbebit nocte quietem.
 Necnon mandragoræ gustu sopor additur altus.
 Dilue præterea glomeramina, quæ gerit intus
 Clausa aries inter gemina coxendicis umbras,
 Inde soporati ducentur gutture potus.

Lethargiæ expellendæ.

Diximus hæc sortē miseris mortalibus esse,
 Ut sint sæpe mala inter se cōtraria morbi,
 Deniq; nōnunquā somno sic mēbra grauantur,
 Ut coniungatur leto sopor altus acerbo.

Ergo leui flamma torrentur cornua capræ,
 Quo nidore grauem depellent lumina somnum.
 Aut veneris labrum quæ dicitur herba, bibetur,
 Quæ teritur prius, & vino confusa liquefcit.
 Conueniunt acidis euphorbia mista fluentis,
 Gramina vel rutæ gemina si nare trahantur.
 Quidam dira iubent, septeno cimice trito,
 Ut vitientur aquæ, cyathusq; bibatur earum.
 Hæc potiora putant, quàm dulci morte perire.

Comitali morbo.

Est subiti species morbi, cui nomē ab illo est,
 Quod fieri nobis suffragia iusta recusant.
 Sæpe etenim membris atro languore caducis,
 Consilium populi labes horrenda diremit.
 Ipse deus memorat dubiæ per tempora lunæ
 Conceptum, talis quem sæpe ruina profudit.

*atri Prodest cum veteri Baccho fel vulturis *ampli,
 Sed

Sed cochlear plenum gustu tibi sufficit vno.
 Aut cruor ex progne mistus cum polline thuris,
 Aut apium elixum, aut cōditum melle fel agni,
 Marrubium' ve pari confusum pondere mellis,
 Cui tu terna dabis gustu cochlearia in vno.
 Aptus mustela cinis est & hirundinis vna.
 Præterea pluuias hominis quas calua supina
 Excepit proiecta sinu, consumere prodest.
 Aut lapis ex nido, vaga quæ congescit hirundo,
 Vellitur, & nexu fouet attoliturq; iacentem.
 Pellitur (vt fama est) gustu quoq; lāguor anethi.

Regio morbo pellendo.

Regius est verosignatus nomine morbus,
 Molliter hic quoniam celsa curat in aula.
 Huic rubia ex mulsa fertur conducere lymphæ.
 Allia trita dabis vino madefacta calenti.
 Vellera cum viuo suffiri sulphure prodest.

Infantibus dentientibus, vel strige
 inquietatis.

N Vdū hoīem primū *mater natura pfudit, *mandā
 Insup excruciat, niueis cū dētibus armat.
 Collo igitur molli dentes neētentur equini,
 Qui primi fuerint pullo crescente caduci.
 Aut teneris cerebrum gingiuis illine porci.
 Aut leporis niueum bibitur cum lacte caprino.
 Præterea si forte premit strix atra puellōs
 Virosa immulgens exertis hubera labris,
 Allia præcepit *Titini sententia necli,
 Qui veteri claras expressit more togatas.

*alias:
 tundi sen-
 tentia Ve-
 eti

Combu

Combusturis igne, vel frigore.

Sunt diuersa quidē mala frigoris atq; caloris,
Sed tamē amborū simili nocet vlcere virus.
Illa quoq; vsta putes, quæ sunt niue læsa rigente,
Conuersa in cinerem platani pila curat vtrunq;
At verò ambustum flammis qui candidus oui
Succus inest, penna inductus sanare valebit.

Aut tu succosæ cinerem perducito lanæ,
lini Aut viuam ex oleo veteri composito calcem,
Ordea vel franges atq; oui candida iunges,
Adsit adeps porcæ (mira est hæc forma medelæ)
Iunge chelidonijs, ac sic line vulnera, succis.
Quodq; recens vssit glacies axungia simplex
Molcet, et ex facili grata est medicamine cura.

Venenis prohibendis.

Vt tutus fias infestæ fraude nouercæ,
Vel quicumq; tuo carpetur liuidus auctu,
Non expectatis eat obuia cura venenis,
Ante cibos igitur iuglandis fœtus edatur,
*variâtia Produnt electri*rorantia pocula virus.
Præterea coctæ querno cum cortice lymphæ
Conueniunt potu, dimersa' ve ficus oliuo.
Sæpe etiam raphanū prædixit numen edendum,
Antidotus verò multis mithridatica fertur
Consociata modis, sed Magnus scrinia regis
Cum raperet victor, vilem deprendit in illis
Synthesin, & vulgata satis medicamina risit.
Bis denum rutæ folium, salis & breue granum,
*terno Iuglandesq; duas, *totidem cum corpore ficus,
Hæc oriente die parco conspersa Lyæo,

Summa

Sumebat metuens, dederat quæ pocula mater.

Venenis datis.

SI nequit infandū præuerrere cautio virus,
Proximus ille gradus data pocula pellerè
Lac asinæ placidèq; bouis pdesse loquunt. (cura.
Betonicam ex paruo sumunt pleriq; Lyæo.
Quod si hederæ succos, q̄ truncos implicat altos,
Instilles pateris, poterunt haud vlla nocere
Pocula, quæ quisquam sæuis vitiauerit herbis.
Si quis hyoscyamum gustarit, lacte capellæ
Exhausto, rabidos poterit mulcere furores.

Vulneribus ex re dubia curandis.

Vulnera tabescunt spatio vitata dierum,
Curaq; nil prodest, nec ducit vlla cicatrix.
Sed tamen herbarum tam mira potentia pollet,
Vlceris annosi sinus vt coalescere possit,
Marrubium si *tu recoquis, illoq; liquore *elure co-
Vulnus atrox foveas, cineres vel hirundinis altæ quas
Inducas, leporis' ve aspersa coagula vino,
Aut hederam Baccho decoctâ, et semen anethi,
Aut cineres alni tardo cum melle ligentur.
Lumbrici terræ poterunt conducere vulnus,
Aut facilis lapathi* cumulatîo vulnera purgat, *coma la-
Et commistus adeps, sed nonnulla sale tactus. tior vlce-
Pinæ præterea viuo cum sulphure cortex, ra purg.
Et pice cum spissa iam perdita membra reponit.

Verrucis tollendis.

INterdum existit turpi verruca papilla,
Hinc quondâ Fabio verū cognomen adhesit,
Qui solus patriæ cunctando restituit rem.

Id po

Id poterit vitium sanguis curare lacertæ,
 Aut vrina canis cum terra inducta madenti.
 lichen Aut herbæ succus, quæ fertur nomine lathyri,
 Et tithymallus item tali satis apta medela.
 Si rupta immensos fundit verruca cruores,
 Purpureo triti cineres de vellere profunt,
 Quod fuerit vero conchyli sanguine tinctum.

Hæmorrhoidibus medendis.

EXcruciant turpes anum si forte papillæ,
 Agrestis prodest radix superaddita porri.
 Ni violet, sanat iuglandis fragmine clausa.
 Sal niueum fumes, beticum quod nomine dicunt,
 Dulcia cumq; nigra iunges fuligine mella.
 Apponesq; super, pellit medicina dolorem.

Quæ sequuntur, ex Aldino codice huc trans-
 ferre libuit: etsi videantur non esse Sereni.

P A R A L Y S I D E P E L -
 L E N D A E.

Prima die ita agendum.

Hinc quicq; cupis citius depellere morbum,
 Protinus antidotum studio tu perfice mirum,
 Scilicet ut valeas languenti ferre medelam:
 Castoreas filiquis bis sex perquirere cura,
 Tristis item digitis lympham metire duobus:
 Deniq; tunc capies phialam quæ inferior extat,
 Aut equidem flamas: sed prunas subijce solers:
 Proderit interea tepidum potantibus illud:
 Ieiunis sed enim potius præbere memento.

Secunda ita medendum est.

Cumq; secunda dies orbi perucnerit omni,
 Haud

*Haud alijs rebus prudens adiungere cures.
Castoris atq; nomen siliquas appendito statim,
Atq; duos semis digitos metire memento
In calice atq; probo lympham miscere duobus:
Qui patitur tepidus languens hinc sorbeat ipse.*

Tertia die ita curandum est.

*Gratior atq; dies ternus cum venerit imo,
Rursus in agroto constanter fer medicamen,
Castoreus siliquas iterum quæ pondere sint sex:
Hinc etenim binos digitos metire memento
De lymphâ liquida: sed enim subiungere cura
Et simili debes tepidum præbere modo tunc.*

*Ita peragendum est à quarta die vsq; ad sex-
tam, & à septima vsq; ad nonā, à decima vsq;
ad duodecimam, & mirifice prodest.*

Quid quarta die, & reliquis peragendum sit.

*Quartus & ille dies consentit: nec ne priori
Quintus & est similis percellens nanq; secundo:
Sextus itemq; simul concordat deniq; terno:
Septimus vsq; nonum percurritur ordine primo:
Sic decimas currens conscenditur ad duodenum.*

F I N I S.

Q. R H E M N I I
FANNI PALAEMONIS
DE PONDERIBVS
ET MENSVRIS
LIBER.

Sunt, qui
huiusopu-
sculi Pri-
scianū au-
torem esse
potenti sed
reclamat
erudito-
rū maior
pars.



ONDERA Peonijs veterum me-
morata libellis

Nosse iuuat: pondus rebus natura
locauit

Corporeis, elementa suum regit omnia pondus,
Pondere terra manet, vacuus quoq; poderis aether
Indefessa rapit voluentis sydera mundi.

Ordiam à minimis, post hæc maiora sequentur.
Nam maius nihil est aliud, quàm multa minuta.

Semioboli duplū est Obolus, quē pōdere duplo
Gramma vocāt, Scrupulū nostri dixere priores.

Semina sex alij siliquis latitantia curuis,
Attribuunt scrupulo, lentes veraciter octo,

Aut totidē speltas numerant, tristes' ve lupinos
Bis duo: sed si par generatim his pondus inesset,

Seruarent eadem diuersæ pondera gentes,
Nunc variant: etenim cuncta non fœdere certo

Natura, sed lege valent, hominumq; repertis,
In scrupulis ternis Drachmā, quo pōdere doctis

nūmus Argenti facilis signatur pondus Athenis.
Holceq; à drachma non re, sed nomine differt.

Drachmā si gemines, aderit quē dicier audis,
Siciliquis: drachmæ scrupuli si adiectio fiet,

Sextula

Sextula quæ fertur, nam sex his vncia constat:
 Sextula cum dupla est, ueteres dixere Duellam.
 Vncia fit drachmis bis quattuor: unde putandum
 Grāmata dicta, quod hæc viginti quattuor in se
 Vncia habet: tot enim formis vox Græca notatur,
 Horis quot mundus peragit noctemq; diemq;.
 Vnciaq; in Libra pars est, quæ mensis in anno.
 Hæc maior Latio libra est, gentiq; togatæ.
 Attica nā minor est, ter quinq; hæc deniq; drach
 Et ter vigenis tradunt explerier vnam. (mis,
 Accipe præterea, paruo quam nomine Grai
 Minam vocitant, nostriq; Minā dixere priores,
 Centū hæ sunt drachmæ. quod si decerpseris illis
 Quattuor, efficies hanc nostram deniq; libram.
 Attica quæ fiet, si quartā dempseris hinc, Minā.
 Cecropium superest post hæc docuisse Talentum
 Sexaginta minas, seu vis, sex millia drachmas,
 Quod summū doctis perhibetur pōdus Athenis,
 Nam nihil his Obolo'ue minus, maius'ue Talēto.
 Nunc dicam, solidæ quæ sit diuisio libræ
 Siue Asis, nam sic legum dixere periti.
 Ex quo quod soli capimus perhibemur habere,
 Dicimur aut partis domini pro partibus huius:
 Vncia nam libræ si deest, dixere Deuncem:
 At si sextantem retrahas, erit ille Decuncis:
 Sed nullum reliquo nomen Semuncia certum
 Dēpta dabit, neq; enī est huius Sescūcia triplex:
 Dodrantē reliquū vocitant quadrante retracto:
 Cumq; triens desit, Bessē dixere priores.
 Idem Septuncem dempto quincunce vocarunt.

Decuncis,
 prodecūx,
 qui & Dex
 tās dicitur,
 positum vi
 detur.

O

Post

Post hæc Semissis solidi pars maxima fertur.
 Nam quæ dimidium superat, pars esse negatur,
 Vt docuit tenui scribens in puluere Notusa.
 Cetera dicta prius quibus est semuncia maior.

De ponderibus, siue mensuris humidorum, & frugum.

ET de pōderibus, superest pars altera nobis
 Humida metiri, seu frugum semina maius
 Cuius principio nobis pandetur origo.
 Pes longo spatio latoq; notetur in anglo,
 Angulus vt par sit, quem claudit linea triplex.
 Quattuor ex quadris medium cingatur inane.
 Amphora sit Cubus, quam ne violare liceret,
 Sacrauere Ioui Tarpeio in monte Quirites.
 Huius dimidiū fert Vrna, vt & ipsa Medimni
 Amphora, terq; capit modium, Sextarius istum
 Sex decies haurit, quot soluitur in digitos Pes,
 At Cotylas quas, si placeat, dixisse licebit.
 Heminas recipit geminas Sextarius vnus,
 Qui quater assumptus fit Graio nomine Chaenix.
 Adde duos, Chus fit vulgo, qui est Congius idē,
 A quo sextarij nomen fecisse priores
 Crediderim, quod eos capiat sex congius vnus.
 At Cotyle cyathos bis ternos vna receptat,
 Sed de abaco nobis id pondus sæpe notatur,
 Bis quinq; hūc faciūt drachmæ, si appēdere tētes:
 Oxybaphus fiet, si quinq; addantur ad illas.
 At Mystrium cyathi quarta est, ac tertia mystri,
 Quam vocitāt Cyanē, capit hæc cochlearia bina.
 Quod si mensuræ pondus componere fas est,
 Sextarij

Sextarij Cyathus pars est, quæ est uncia libræ,
 Nec non oxybaphi similis Sescuncia fiet.
 Sicilicquumq; tibi mystro simulare licebit.
 Cochlear extremum est, Scrupuliq; imitabit instar.
 Attica præterea dicenda est Amphora nobis,
 Seu Cadus, hanc facies, nostræ si adieceris urnæ.
 Est & bis decies quem conficit amphora, nostris
 Culleus, hac nulla est maior mensura liquoris.
 Est etiam terris (quas aduena Nilus inundat)
 Artaba, cui superat modij pars tertia post tres,
 Namq; etiam modijs explebitur Artaba triplex.

De ponderibus variorum liquorum,
 & aquarum.

Illud præterea tecum cohibere memento,
 Finitum pondus varios seruare liquores.
 Nam libræ (ut memorat) besse Sextarius addet,
 Seu puros pendas latices, seu dona Lyæi.
 Addunt semissem libræ* labentis oliui,
 Selibramq; ferunt mellis superesse bilibri. *liuentis
 Hec tamen assensu facili sunt credita nobis:
 Namq; nec errantes vndis labentibus amnes,
 Nec merfi puteis latices, aut fonte perenni
 Manantes par pondus habent: non deniq; vina,
 Quæ campi aut colles nuper'ue aut antè tulere,
 Quod tibi mechanica proptum est depromere musa.
 Ducitur argenti, tenui'ue ex ære cylindrus,
 Quantum inter nodos fragilis producit arundo,
 Cui cono interius modico pars ima grauatur,
 Ne totus sedeat, totus'ue supernatet vndis,
 Lineaq; à summa tenuis descendit ad ima

O 2

Ducta

Ducta superficie, tot quæq; in frusta secatur,
 Quot scrupul' grauis est argenti æris'ue cylindrus.
 Hoc cuiusq; potest pondus spectare liquoris.
 Nam si tenuis erit, maiori mergitur vnda:
 Sin grauior, plures modulos superesse notabis:
 Aut si tantundem laticis sumatur utrinq;
 Pondere præstabit grauior: si pondera secum
 Cõueniunt, tunc maior erit, quæ tenuior vnda est.
 Quod si ter septem numeros texisse cylindri
 Hos videas latices, illos cepisse ter octo,
 His drachma grauius fatearis pondus inesse.
 Sed refert æqui tantum conferre liquoris,
 Ut grauior superet drachma, quantum expulit vn-
 Illius aut huius teretis pars mersa cylindri. (da,
 Hæc de mensuris, quarum si signa requires,
 Ex ipsis veterum poteris cognoscere chartis.

Maiori,
 subaudi
 pōdere.
 Modulos,
 id est par-
 tes, in quas
 cylindr' in-
 telligatur
 diuisus.

De inuentione argenti, auro in vna
 massa permisti.

Nunc aliud partium ingenio trademus eodẽ.
 Argentum fuluo si quis permisceat auro,
 Quantum id sit, quo'ue id possis deprendere pacto,
 Prima Syracusij mens prodidit alta magistri.
 Regẽ nanq; ferunt Siculam, quam vouerat olim
 Cœlicolum regi, ex auro statuisse coronam,
 Compertoq; dehinc furto, nam parte retenti
 Tantundemq; argenti opifex immiscuit auro,
 Orasse ingenium ciuis, qui mente sagaci
 Quis modus argenti fuluo latitaret in auro,
 Repperit, ille sum quod dijs erat antè dicatum.
 Quod te quale fiet, paucis (aduerte) docebo.

Lancib.

Lancibus aequatis quibus hæc appēdere mos est,
 Argenti atq; auri, quod edax purgauerit ignis,
 Impones libras, neutrum vt præponderet: hasq;
 Submites in aquam, quas pura vt ceperit vnda,
 Protinus inclinat pars hæc, quæ sustinet aurum.
 *Pensius hoc nanq; est, similari crassius vnda. *Densius
 At tu siste iugum, mediūq; è cardine centri
 Interualla nota, quantum discerpserit illinc,
 Quotq; notis distet suspensio pondere filum.
 Fac drachmis distare tribus: cognouimus ergo
 Argenti atq; auri discrimina, deniq; libram
 Libra trib. drachmis superat cū mergitur vnda.
 Sume dehinc aurum, cui pars argentea mista est,
 Argentiq; meri par pondus, itemq; sub vnda
 Lancibus impositum specta: propensior auri
 Materies* subsistit enim, furtumq; docebit. *aliàs,
 Nam si ter senis superabitur altera drachmis, sub aquis
 Sex solus libras auri dicemus inesse, fiet
 Argenti reliquum, quia nil in pondere differt
 Argentū argento, liquidis cum mergitur vndis.
 Hæc eadem puro deprendere possumus auro,
 Si par corrupto pondus pars altera gestet.
 Nam quoties ternis pars illibata grauarit
 Correptā drachmis sub aquam, totidē esse notabis
 Argenti libras, quas fraus permiscuit auro.
 Pars etiam libræ quæuis si forte supersit
 Hæc quoq; drachmarū simili tibi parte notetur:
 Nec non & sine aquis *

FINIS.

O 3

INDEX OMNIVM,

QVAE IN CELSO CON-

tinentur. Et primus numerus li-
brum, secundus caput
designat.

*

| | | |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| <i>A</i> | | 1. proæ. |
| A Bdomen lib. 4. | Adolescentia quibus | |
| cap. 1. | morbis magis obno- | |
| Abdominis ruptura | xia sit | 1. 1 |
| quomodo curanda sit | Adurentia | 5. 8 |
| lib. 7. cap. 17 | Aduſta quomodo cu- | |
| Abditæ cauſſæ lib. 1. | rari debeant | 5. 26 |
| in proæ. | Aegilops | 7. 7 |
| Absceſſus quibus ſi- | Aeſtas periculosa | 2. 1 |
| gnis indicentur fu- | Aeſtas quos pariat | |
| turi | morbos | 1. 2. 1 |
| Abortus periculũ qua- | Aeſtate quæ ad vi- | |
| do lib. 1. cap. 7 | elũ magis condu- | |
| Abſtinẽtia nimia ſæ- | cant | 1. 3 |
| pe inutilis ibidem | Aeſtuanti in balneo, | |
| Acceſſiones in feбри- | quid opus ſit face- | |
| bus | re | 1. 3 |
| Acetina natura & uſus | Aetatis differentia ui- | |
| 5. 27 | elũ & curatione | 1. 3 |
| Acopa | Aetatum differentia, | |
| 5. 2. 3 | quantum ad bonam, | |
| Acrochordones lib. 2. | malam'ue valetudi- | |
| cap. 14. & lib. 5. ca. | nem | 2. 1 |
| 28 | Aeſculapius in deo- | |
| Aetiões naturales quæ | rum | |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|--------|
| rum numerum rela- | Andro medicus | 6.18 | |
| tus | 1. proæ. | Angina | 4.4 |
| Agamemnon | 1. proæ. | Angina subito finita, | |
| Agricolam vsu fieri, | | quid portendat | 2.5 |
| nō disputatione ibid. | | Animalium quadru- | |
| Ajax quo genere in- | | pedum differentia | |
| saniz laborauerit | 3. | | 2.17 |
| 18 | | Angues in Italia, & | |
| Alentia | 5.14 | in frigidis regioni- | |
| Alopecia | 6.4 | bus minus terribi- | |
| Alphos lib.5.ca.vlt. | | les | 5.26 |
| Aluū stringentia | 1.5 | Ani uitia quomodo cu | |
| Aluum soluentia ibid. | | rari debeant | 7.30 |
| Aluus que mala | 1.3 | Anodina | 5.25 |
| Aluus soluta, quibus | | Antidoti, & eorum | |
| remedijs coërceatur | | compositiones | 5.23 |
| 1.6 | | Antheræ | 6.11 |
| Alui iudicatio | 2.7 | Antigonus rex | 3.22 |
| Ambrosia Antidoti no | | Apollonius medicus | |
| men | lib.5.23 | 1. proæ. | |
| Ammonius lithotom. | | Apoſtemata | 2.1 |
| 7.20 | | Aphthæ | ibidem |
| Anatomice, id est, in- | | Apollonius, qui Mlys | |
| sectio corporum ne- | | cognominatus est | 5. |
| cessaria | 1. proæ. | proæ. | |
| Ancyloblepharos | 7.7 | Aperientia | 5.3 |
| Andreas medicus | 5. | Aqua frigida quibus | |
| proæ. | | proſit | 1.9 |
| Andreae collyrium | 6.6 | Aque differentia in | |
| | | O 4 | pos |

I N D E X.

| | | |
|------------------------|--------|-----------------------|
| potionibus | 2.17 | Aristonis malagma |
| Aque bonitatis pro- | | ibidem |
| batio | ibidem | Articulorum curatio- |
| Aqua in qua candens | | nes |
| ferrum tinctum sit | | 5.26 |
| 4.9 | | Asclepiades |
| Aqua inter cutē quan | | 1.proœ. |
| do minime terribi- | | Ascites |
| lis | 2.7 | 3.21 |
| Aqua quomodo hy- | | Asthma |
| dropicis emittatur | | 4.4 |
| 7.13 | | Asius lapis |
| Aquilonis flatus quos | | lib.4. |
| generet morbos, & | | cap.vlt. |
| quid boni sanis cor- | | Aduersus aspidis icth |
| poribus adferat | | 5.26 |
| 2.1 | | Athenio |
| Area | 6.4 | 5.25 |
| Arquatus morbus | 3. | Atheroma |
| 24 | | 7.6 |
| Arteriaces compositio | | Attoniti qui dicantur |
| 5.26 | | 3.26 |
| Articulorū vitia | 2.7 | Atrophia |
| Arteria aspera, eiusq; | | 3.22 |
| descriptio | 4.1 | Attalicum emplastrū |
| Articulorum dolores | | |
| 4.vlt. | | |
| Ad articulos malagma | | |
| 5.18 | | |
| | | Auium differentia in |
| | | cibo |
| | | 2.17 |
| | | Aurium vitium |
| | | 6.7. |
| | | & lib.6.c.18 |
| | | Aurium morbi |
| | | 7.8 |
| | | Aurium fractarum cu |
| | | ratio |
| | | 8.6 |
| | | Autumnus periculo- |
| | | sissimus |
| | | 2.1 |
| | | Autumnus quos mor- |
| | | bos pariat |
| | | ibidem |
| | | Autum |

I N D E X.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>Autumni tēpore quæ</i> | <i>Calor quid corporibus</i> |
| <i>ad victū magis con-</i> | <i>adferat</i> 2.1 |
| <i>ferant</i> 1.3 | <i>Calculo quomodo suc-</i> |
| <i>Auster quos morbos</i> | <i>curratur</i> 7.26 |
| <i>generet</i> 2.1 | <i>Cancer in ore</i> 6.15 |
| <i>Autopyron</i> 2.17 | <i>Cancer in cole</i> 6.18 |
| <i>B</i> | <i>aduersus Cantharidas</i> |
| <i>Basilicon empla-</i> | 2.27 |
| <i>strum</i> 5.19 | <i>Capitis dolores quibus</i> |
| <i>Bæthus</i> ibidem | <i>leuentur</i> 2.7 |
| <i>Brachij fracti curatio</i> | <i>Capitis longus dolor si</i> |
| 8.10 | <i>sine causa est, &c.</i> |
| <i>Brachium</i> 8.1 | <i>ibidem</i> |
| <i>Bronchocele</i> 7.13 | <i>Capitis descriptio</i> 4.1 |
| <i>Bubonocèle</i> 7.18 | <i>Capitis morbi, & eo-</i> |
| <i>C</i> | <i>rum curatio</i> 4.2 |
| <i>Cachexia</i> 2.1. | <i>Caput quibus infirmis</i> |
| <i>&</i> 3.22 | <i>est, quid facere con-</i> |
| <i>Cacoëthes</i> 5.28 | <i>ueniat</i> 1.4 |
| <i>Calefacientia</i> 1.3 | <i>Caput quod firmissi-</i> |
| <i>Calculosi quibus indi-</i> | <i>mum</i> 8.1 |
| <i>cijs cognoscantur</i> | <i>Caput luxatum</i> 8.13 |
| 2.6 | <i>de Capillis fluentibus</i> |
| <i>Calculus quibus signis</i> | 6.1 |
| <i>cognoscatur</i> 7.26 | <i>Carbunculus in oculis</i> |
| <i>Caluaria</i> 8.1 | 6.6 |
| <i>Caligatio oculorum</i> | <i>Carcinodes</i> 6.8 |
| 6.6 | <i>Carbunculi in cole cu-</i> |
| <i>Calor quibus profit</i> 1.9 | <i>ratio</i> 6.18 |
| | o 5 ad |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|------------|
| ad Carcinodas mala- | 8.cap.5. | | |
| gma | 5.18 | Chirurgus | Sostratus |
| Cardiacus morbus quis | | 1.proæ. | |
| dicatur | 3.19 | Casarianum collyrium | |
| Carcinoma | 5.28 | 6.6 | |
| Casus quid inuenerit | | Cercis | lib.8.c.1. |
| 5.26 | | Chiragra | 2.6. |
| Cassius medicus | 1.pr. | et 4.24 | |
| Catapotiorum descri- | | Chirurgica | lib.1. |
| ptio, siue varia com- | | in proæ. | |
| positio | 5.25 | Chironium vlcus | |
| Catapotium ad somnũ | 5.28 | | |
| ibidem | | Chirurgus qualis esse | |
| Catapotium Athenio- | | debeat | 7.proæ. |
| nis | ibidem | Chœnicion | 8.3 |
| Catapotium Heraclidis | | Cholera | 4.11 |
| ibidem | | Chordapfos | 4.13 |
| Causse abditæ quæ sint | | Chordion | ibidem |
| 1.proæ. | | Chrite tuberculum | 7.6 |
| Causse euidentes quæ | | Chrysippus | 1.in |
| eodem | | proæ. | |
| Causse obscure quæ | | Chrysippi discipulus | |
| eodem | | medicus | 2.21 |
| Cephalea | 4.2 | Chrysippi malagma | |
| Cerebri vel membra- | 5.18 | | |
| ne eius percussæ cu- | | Cibus à quibus rebus | |
| ratio | 5.22 | melius incipiat | 1.2 |
| Chirurgus Tryphon | | Ciborum potionumq; | |
| lib.7. in pro. et lib | | differentiæ | 2.17 |
| | | Cibus | |

I N D E X.

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cibus quomodo & | eius curatio | 4.12 |
| quando in febribus | Comitialis morbus | |
| dandus lib.3.cap. | 3.23 | |
| 4.5 | Concoctio cibi in sto- | |
| Cibi varij eduntur fa- | macho | lib.1. |
| cilius quam conco- | in proæ. | |
| quuntur | 3.6 | Concoctio quibus fit, |
| Cibus febricitantibus | quomodo se gerere | |
| dandus, qualis esse | debeant | 1.2 |
| debeat ibidem. ad- | Concubitus qualis esse | |
| uersus cicutam | 5.27 | debeat |
| | | 1.1 |
| Cirfocele | 7.18 | Concubitus in fæmi- |
| Circulatores | 5.26 | nis, si per naturam |
| Clauus | 5.28 | prohibitus, quomodo |
| Clauus oculorum | 7.7 | restitui debeat |
| Cleonis collyrium | 6.6 | 7.28 |
| Coli dolor quibus re- | Condita duab. de caus- | |
| medijs inueter | 1.7 | sis inutilia |
| | | 1.2 |
| Coles | 4.1 | Condylomata |
| Colicon medicamenti | | 5.28 |
| genus, ex quibus | Condylo-matum cura- | |
| rebus constet | 4.14 | tio |
| | | 7.30 |
| Collyriorū variae com- | Coquentia & matu- | |
| positiones | 6.6. | rantia pus |
| & | 4.28 | 5.3 |
| Coëuntia in aliqua cor- | Cordis descriptio, & | |
| poris parte dissoluen- | ubi situm sit | |
| tia | 4.1 | |
| 5.11 | Cordis percussi signa | |
| Cæliacus morbus, & | 5.22 | |
| | Coryza | 4.2 |
| | Corpus integrum quod | |
| | natur | |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------|-------|------------------------|-------|
| nam habeatur | 1.2 | Craſſiſſimum os in ca- | |
| Corporum incifio | 1. | pite | 8.1 |
| proæ. | | Cubitus | ibid. |
| Corpus gracile quale | | Cubitus luxatus quo- | |
| 2.1 | | modo reſtitui de- | |
| Corpus qua extenuent | | beat, & quot in eo | |
| 1.3 | | offa coëant | 8.16 |
| Corporis humani de- | | Curta in auribus quo- | |
| ſcriptio | 8.1 | modo ſarciri debeât | |
| Corpus quodnam habi | | 7.9 | |
| liſſimum | 2.1 | Cutem purgantia | 5.16 |
| Corporis noxæ quinq; | | Cucurbitularum gene- | |
| 5.28 | | ra duo | 2.10 |
| Coſtæ, & earum ſitus | | Curatio morborū quot | |
| atque differentia | | modis fiat | 2.8 |
| 8.1 | | Curationum duo gene- | |
| Coſtarum fracturariū | | ra | 7.7 |
| curatio | 8.9 | Cucurbitulis quomodo | |
| Coxarum dolores | 4. | ſanguinis detractio | |
| 22. | | fiat | 2.10 |
| Coxarum dolor, quid | | Cynicus ſpaſmus | 4.2 |
| portendat | 2.5 | D | |
| Coxarum os | 8.1 | Emocritus lib. | |
| Crato medicus | 6.7 | 1.proæ. | |
| Cruſtas vulneribus in- | | Deiectio | 1.3 |
| ducentia | 5.10 | Deiectio quando ſine | |
| Cruſtas vlcerum re- | | vlla noxa ſit | 2.4 |
| ſoluentia | eodem | Defruti differentia in | |
| Cremaſteres | 7.18 | potionibus | 2.17 |
| | | Denarij | |

I N D E X.

| | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|----------|
| Denarij pondus | 5. | Difficilime curationē | |
| 17 | | admittentia | 5.22 |
| Dentium situs & or- | | Diocles | 1.proæ. |
| do & numerus & | | Disciplina corpori in- | |
| nomina | 8.1 | mica | ibidem |
| Dentium dolor | 6.7 | Dionysij collyrium | |
| Dentium curatio | 7.12 | 6.6 | |
| Dentes quomodo ex- | | Dyspnæa | 4.4 |
| trahendi sint | ibid. | Dysenteria | 4.15 |
| Destillatio, eiusq; cu- | | E | |
| ratio | 4.2 | E ctropium oculo- | |
| Destillatione laboran- | | rum | 7.7 |
| tibus quid opus sit | | Elaodes | 5.26 |
| 1.5 | | Elcodes | 5.28 |
| Desidia lib.1.in proæ. | | Elephantia | 3.25 |
| Detractio materie à | | Empyricus unde di- | |
| corporibus, quot mo- | | ctus sit | lib.1.in |
| dis fiat | 2.8 | proæ. | |
| Dexij malagma | 5.18 | Empyrici qui sint | |
| Diaphragma | 1.proæ. | ibidem | |
| Dietetica medicina | | Empedocles | ibid. |
| ibidem | | Emplastrorum variæ | |
| Dies critici | 3.4 | cōpositiones, & de- | |
| Digitus lib.8.cap.1. | | scriptiones | 5.17. |
| 19 | | & deinc. | |
| Digitorum coheren- | | Emprosthotonos | 4.3 |
| tium curatio | 7.32 | Enchanthis | 7.7 |
| Digitorum vlcera | | Enterocèle | 7.18 |
| 6.19 | | Enneapharmacij em- | |
| | | plast | |

I N D E X.

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------|
| <i>plastrum</i> | 5.19 | <i>Exercitatio quibus fiat</i> | |
| <i>Ephesium emplastrum</i> | | <i>modis</i> | 1.2 |
| 5.19 | | <i>Exercitationis finis,</i> | |
| <i>Epinyctis</i> | 5.28 | <i>quisnam esse debeat</i> | |
| <i>Ephelis</i> | 6.5 | <i>ibidem</i> | |
| <i>Epiploce</i> | 7.13 | <i>Exercitationem que</i> | |
| <i>Epipaſtica</i> | 5.18. & | <i>sequi debeant ibid.</i> | |
| 19 | | <i>Exedentia</i> | 5.7 |
| <i>Eraſiſtratus</i> | 1. in | <i>Expletus cibo potu'ue</i> | |
| <i>proæ.</i> | | <i>quid facere debeat</i> | |
| <i>Errorrem ſuum de fu-</i> | | 1.2 | |
| <i>turis in capite, inge-</i> | | F | |
| <i>nue cōfeſſus eſt Hip-</i> | | <i>Acies in homine</i> | |
| <i>pocrates</i> | 8.4 | 8.1 | |
| <i>Eryſipelas lib. 5. ca.</i> | | <i>Fatigato quotidianum</i> | |
| 26. & 28 | | <i>cubile tutiſſimum</i> | |
| <i>Evidentes cauſſe</i> | 1. | 1.3 | |
| <i>proæ.</i> | | <i>Fatigatum inter ambu-</i> | |
| <i>Euocantia & educen-</i> | | <i>landum quæ reficiāt</i> | |
| <i>tia</i> | 5.12 | <i>ibidem</i> | |
| <i>Euticleus</i> | 5.18 | <i>Febrium differentiæ</i> | |
| <i>Euelpidis collyrium</i> | | 3.5 | |
| 6.6 | | <i>Febrem ſæpe præſidio</i> | |
| <i>Euelpiſtus chirurgus</i> | | <i>eſſe</i> | 2.7 |
| 7. proæ. | | <i>Fel & eius ſitus</i> | 4.1 |
| <i>Exagitatio quid fa-</i> | | <i>Ferarum differētie in</i> | |
| <i>ciat</i> | 4.15 | <i>cibis</i> | 2.17 |
| <i>Exanthemata</i> | 5.28 | <i>Femur</i> | 8.1 |
| <i>Experientia</i> | 1. in pro. | <i>Fiſtulæ in homine ibid.</i> | |
| | | <i>Fiſtul</i> | |

INDEX.

- Fistularum curatio* 5.28
Fluxus ventris, eiusq; 4.19
curatio 4.19
Fœmina 8.1
in Fœminis secunde 7.30
Foramina in capite 7.25
ibidem 7.25
Frigus quibus inimi- 1.9
cum 1.9
Frigus quibus proſit 1.9
ibidem 1.9
Frigus quid mali cor- 2.1
poribus adferat 2.1
Frigus in febribus 3.3
quid dicatur 3.3
Fruſtum arboreorum 2.17
differentie in cibis 2.17
Fruſtūtorum differen- 1.5
tia in cibis 1.5
Furunculus 5.28
G
G *Angræne cura-* 7.33
tio 7.33
Ganglion 7.6
Gargariſationes 5.22
Genuum dolores, & 4.23
eorum curatio 4.23
Genu luxatum 8.21
Gingivarum vlcera 5.13
Glaucias 1. proœ.
Glandule 4.1
Glande coles quo pa- 7.25
ſto tegendus 7.25
Glans colis ſue penis 5.2
contecta, quomodo 5.2
aperienda ſit 5.2
ibidem 5.2
Glutinantia 5.2
Glutination vulnerrum 5.26
Gorgias medicus 2.
14. & libro 7. in 2.
proœ. 2.
Grauedines quomodo 4.2
curentur 4.2
Grauedine laboranti- 1.5
bus quid conueniat 1.5
Gubernatorem vſu fie- 1. pro.
ri non diſputatione 1. pro.
H
H *Ammonius me-* 7. proœ.
dicus 7. proœ.
Hapsus

I N D E X.

| | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| Hapsus | 7.26 | Homo sanus, nullis |
| Hecatæi emplastrum | | se medicorum legi- |
| 5.19 | | bis obligari debeat |
| Hepaticus morbus | 1.1 | |
| 4.7 | | Hominem sanum, va- |
| Hæmorrhoids | 6.18 | rium vitæ genus ha- |
| Herbarum differentiæ | | bere oportet eod. |
| in cibis | 2.17 | Horror in febribus |
| Heraclides | 1. proæ. | 3.3 |
| Herophilus | libr. 1. | Humectantia 1.3 |
| in proæ. & libr. 5. | | Humerus 8.1 |
| cap. 25 | | Humerorum dolores |
| Hecatæus | 5.23 | quibus tollantur |
| Hermonis collyrium | 2.7 | |
| 6.6 | | Humeri fracti curatio |
| Hernia | 7.18 | 8.10 |
| Heron siue Hieron me- | | Humerus luxatus quo |
| dicus | 7. proæ. | modo restitui debeat |
| Herpes | 5.28 | 8.15 |
| Hippocrates | 1. proæ. | Humor spissescens, ace- |
| Hippocrates omnisme- | | to intus sumpto dis- |
| dicinæ parens | 7. | cutitur 5.26 |
| proæmio | | Hyeme quæ magis con- |
| Hireneus | 5.25 | ueniant 1.3 |
| Hieracis collyrium | | Hyems salubris est 2.1 |
| 6.6 | | Hyems quos morbos |
| Hieræ compositio | 5. | pariat ibidem |
| 27 | | Hydrocelle 7.18 |
| Homerus | 1. proæ. | Hydrops, ac eius spe- |
| | | cies |

INDEX.

| | | | |
|------------------------|------|------------------------|-------|
| cies tres | 3.21 | ria que | 2.17 |
| Hydropis curatio | ibi- | Implentia | 5.14 |
| dem | | Insanabilia que sint | |
| Hydrocephalon | 4.2 | 5.26 | |
| aduersus Hyoscyamum | 5.27 | Infibulatio quomodo | |
| | | fiat | 7.25 |
| Hyposarca | 3.21 | Inedia si cui eueniat, | |
| Hypochysis | 6.6 | quid faciendum | |
| I | | 1.2 | |
| I Chor | 5.26 | Inguen quomodo inci- | |
| I lecur, & eius si- | | dendum sit | 7.20 |
| tus | 4.18 | Intemperantia qua in | |
| ad Iecur dolens ma- | | re tolerabilior | 1.2 |
| lagma | 5.18 | Intemperantie exem- | |
| Ieiuni hominis vis ad- | | plum | 3.21 |
| uersus serpētis ictum | 5.26 | Insania quibus signis | |
| | | denuntietur futura | |
| Ignauia quid faciat | 2.5 | | |
| 1.1 | | Insaniæ species | 53.18 |
| Ileos | 2.1 | Insanientium commu- | |
| Ileon | 4.13 | nia remedia | 3.18 |
| ad Infantem mortuum | | Intestinum ieiunum, | |
| expellendum | 5. | & cur ita dictum | |
| 25 | | 4.1 | |
| Ilia, & eorum situs | | Intestinum tenuius | |
| 4.1 | | ibidem | |
| per Imbres qui morbi | | Intestinum crassius | |
| oriantur | 2.1 | ibidem | |
| Imbecillissima mate- | | Intestimorum nomina | |
| | | P diuer | |

I N D E X.

diuersa, & differen tia 4.8
tia & situs ibid. L

Intestinum cecum & **L** Abor quid fa-
rectum ibid. ciat I.I

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Intestini tenuioris mor- | Laborantibus ex par- |
| bi curatio 4.14 | tu remedium 5.25 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----|
| <i>Iocinoris morbus</i> | <i>Lagophthalmos</i> | 7.7 |
| 4.8 | <i>Lateris dolor</i> | 4.6 |

in Iocinoris morbo quæ ad Laterum dolores
periculosa 2.7 malagma 5.18

| | | |
|----------------------|-----------|-----|
| Intestinorum percus- | Lauatio | 1.3 |
| forum signa §.26 | Lenticula | 6.5 |

| | | |
|---------------------|-----------|------|
| Intestina vulnerata | Lepis | 8.3 |
| quomodo curari de- | Lethargus | 3.20 |

beant 7.16 Lenitas intestinorum,
Iolle medici compoſi- à quibus etatibus

tio 5.22 depellitur 2.7
 Iocinoris percussu si Leguminum differen-

Indaei compositio 5. Leuce lib. 5. ca. vlti.

22 *Lenia ingenia* qualia
Indei emplastrum 5. 8.4

19 *Leuitus intestinorum*
Inegale lib. 8. & eius curatio

cap. 1 4.16
Inguli fracti cura- Leucophlegmati 3.2

Lewan

I N D E X.

- | | | | |
|----------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Leuantia siue leuigan-</i> | | <i>Luxuria</i> | <i>lib. 1. in</i> |
| <i>tia</i> | 5.13 | <i>procermio</i> | |
| <i>Lienteria</i> | 2.1 | <i>M</i> | |
| <i>Lien siue lienis</i> | 4.1 | <i>M</i> | <i>Achaon lib. 1.</i> |
| <i>Lienes quibus magni</i> | 2.5 | <i>M</i> | <i>in proce.</i> |
| <i>sint</i> | | <i>Malagmatum compo-</i> | |
| <i>Lienis malum quando</i> | | <i>sitiones variae</i> | 5.17 |
| <i>periculosum</i> | 2.7 | <i>Mala</i> | 8.1 |
| <i>Lienis morbi curatio</i> | 4.9 | <i>Manus luxata quo-</i> | |
| | | <i>modo restitui debeat</i> | |
| <i>ad Lienem malagma</i> | 5.18 | | 8.17 |
| <i>Lienis vulnerati signa</i> | 5.26 | <i>Materia extrahenda</i> | |
| <i>Linguae resolutio, eiusq;</i> | | <i>per malagmata</i> | 5.18 |
| <i>curatio</i> | 4.2 | <i>Materiae genere &</i> | |
| <i>Linguarum ulcera</i> | 6.12 | <i>modo utendum pro</i> | |
| <i>Lippitudine laboran-</i> | | <i>viribus cuiusq;</i> | 2.17 |
| <i>tibus quid opus sit</i> | 1.5 | <i>Maxilla</i> | 8.1 |
| <i>Litterarum disciplina</i> | | <i>Maxillae fractae cura-</i> | |
| <i>animo necessaria,</i> | | <i>tio</i> | 8.7 |
| <i>corpori inimica</i> | 1. | <i>Maxilla luxata cura-</i> | |
| <i>proce.</i> | | <i>tio</i> | 8.12 |
| <i>Lucubrandum quando</i> | | <i>Medicina nusquam non</i> | |
| <i>potissimum</i> | 1.2 | <i>est</i> | 1. proce. |
| <i>Luxata membra quo-</i> | | <i>Medicina quid pro-</i> | |
| <i>modo restitui debeat</i> | 8.11 | <i>mittat</i> | ibidem |
| | | <i>Medicina multiplex</i> | |
| | | <i>ibidem</i> | |
| | | <i>Medendi scientia, sa-</i> | |
| | | <i>pientiae pars</i> | ibid. |
| | | <i>F 2</i> | |
| | | <i>Med</i> | |

I N D E X.

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <i>Medicina triplex ibi-</i> | <i>Meliceria</i> | 5.26 |
| <i>dem</i> | <i>Meliceria siue melice-</i> | |
| <i>Medicina que victu</i> | <i>ris lib.5.cap.28. &</i> | |
| <i>curat in duas partes</i> | <i>lib.7.cap.6</i> | |
| <i>diuisa</i> | <i>ibid. Meningophylax</i> | 8.3 |
| <i>Medicinae quae pars</i> | <i>Mlenophilus medicus</i> | |
| <i>difficilima</i> | <i>ibid.</i> | 8.7 |
| <i>Medicinā artem con-</i> | <i>Mlenemachus</i> | 6.9 |
| <i>iecturalem</i> | <i>ibidem</i> | |
| <i>Medicina quid</i> | <i>Mensa secunda</i> | 1.2 |
| <i>ibid.</i> | <i>Metrodorus medicus,</i> | |
| <i>Medicorum officium,</i> | <i>Epicuri discipulus</i> | |
| <i>quodnam sit in cu-</i> | | 3.20 |
| <i>rando ex Asclepia-</i> | <i>Mentum</i> | 8.1 |
| <i>dis sententia</i> | <i>Mithridatis antidotū</i> | |
| <i>3.4</i> | | |
| <i>Medici periti officium</i> | | 5.23 |
| <i>circa egrum, cuius-</i> | <i>Modiolus</i> | 8.3 |
| <i>modi esse debeat</i> | <i>Mollientia</i> | 5.15 |
| <i>3.6</i> | <i>Morbos in deorū iram</i> | |
| <i>Media materia</i> | <i>2.17</i> | |
| <i>Medulla percussa si-</i> | <i>relatos</i> | 1.in proæ- |
| <i>gna</i> | <i>5.26</i> | <i>mio</i> |
| <i>Meges chirurgus lib.</i> | <i>Morbos non eloquen-</i> | |
| <i>5.cap.28. & lib.7.in</i> | <i>tia, sed remedijs cu-</i> | |
| <i>proæmio</i> | <i>rari</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Melas lib.5.ca.vlt.</i> | <i>Morborum tria gene-</i> | |
| <i>Melancholia</i> | <i>2.5</i> | <i>ra</i> |
| <i>Mellis natura in medi-</i> | <i>ibid.</i> | |
| <i>cina</i> | <i>Morbi per singulas</i> | |
| <i>3.9</i> | <i>tempestates</i> | 2.1 |
| <i>ad Melicertas mala-</i> | <i>Morbus comitialis,</i> | |
| <i>gma</i> | <i>5.18</i> | <i>qua etate egre cu-</i> |
| | | <i>retur</i> |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------|------|-------------------------|----------|
| retur | 2.7 | Motatio per vite cur- | |
| Morborum diuifio & | | sum quomodo mode- | |
| differentie | 3.1 | randa | 1.3 |
| Morbus increfcēs qui- | | Mycon | 5.18 |
| bus fignis dinofca- | | Myron | 5.28 |
| tur | 3.2 | Myrmecia | 4.28 |
| Morbi decedentis quæ | | Mydriafis oculorum | |
| note fint eodem | 6.6 | | |
| Morbus fi acutus fue- | | N | |
| rit quomodo ager | | Narium morbi | |
| tractandus fit eo- | | 6.6 | |
| dem | | Narium fractarum cu | |
| Morbus fi longus fit | | ratio | 8.5 |
| quomodo ager tra- | | Naturales cauffæ quæ | |
| ctandus fit eod. | | fint | 1. proæ. |
| Morbus comitialis | 3. | Nauiganti & naufea | |
| 23 | | preffo, quid facere | |
| Morfus omnis quo- | | opus fit | 1.3 |
| dam modo veneno- | | Negotiofi hominis pri- | |
| fus | 5.26 | ma curatio, exerci- | |
| Mortis indicia quæ | | tatio eft | 1.2 |
| 2.5 | | Neruorum dolore la- | |
| Mos magnorum viro- | | borantibus, quid ob- | |
| rum qui fit | 8.4 | feruandum fit | 1.9 |
| Mulierigranuide quæ | | Neruorum diftentio, | |
| incommoda euenire | | quibus futura depre- | |
| poſſint | 2.5 | hendatur | 2.5 |
| Mulſi differentia in | | Nileus, ſiue Nilei col- | |
| potionibus | 2.17 | lyrium | 6.5 |
| | | P 3 | |
| | | Note | |

I N D E X.

| | | | |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|
| Notæ in singulis mor- bis obseruandæ | 2.6 | curari debeant | 7.11. et 6.11 |
| Notæ | 8.1 | Orthopnoea | 4.4 |
| Numenij malagma | 5. | Ossis fracti curatio | 8.7 |
| 18 | | | |
| Nymphodorus medi. | 8.20 | Os quot modis excida- tur | 8.3 |
| O | | Ossa vitiata | 8.1 |
| O Bscenarum par | | Oscheos | 7.18 |
| tiū vitia quo- | | Ὠσεία | 6.8. et 7.8 |
| modo curanda sint | | Ὠσ | 5.11 |
| 6.18 | | | |
| Oculorum varij morbi | | P | |
| 6.6 | | Alma | 8.1 |
| Oculorum nature indi- | | Partusemortuus | |
| catio | 7.7 | in vtero quomodo | |
| Oculorum vitia, et | | excutiendus | 7.29 |
| eorū curationes | 6.6 | ad Panum malagma- ta | 5.18 |
| Olerum differētiæ | 5.17 | Paralysis | 2.1 |
| Omentum, eiusq; offi- | | Paralysis oculorum | |
| cium | 4.1 | 6.6 | |
| Omenti curatio | 7.21 | Parasynanche | 4.4 |
| Omoplate | 8.1 | Periculum in tabe quæ | |
| Opisthotonos | 4.3 | denuntient | 2.7 |
| Ὠπίσσις | 6.4 | Parodontides | 6.13 |
| Orestes, quo genere | | Parotides | 6.16 |
| insanie laborauerit | | ad Parotidas mala- gmata | 5.18 |
| 3.18 | | | |
| Oris vlcera, quomodo | | Partium animalium dif- ferent | |

INDEX.

| | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------|--------------|
| feretia in cibis | 2.18 | Phacos | 6.5 |
| Panificia | eodem | Phagedene in cole na- | |
| Pasti differetia in po- | | scentis curatio | 6.18 |
| tionibus | eodē | Philippus Epirotes me- | |
| Pastillorum descriptio- | | dicus | 3.21 |
| nes, & variae com- | | Philocratis emplastrū | |
| positiones | 5.20 | | 5.19 |
| Pastillus Polybij | ibid. | Philocrates | 5.26 |
| Pastillus Andronis | | Philon | 6.6 |
| ibidem | | Philothis collyriū eodē | |
| Parotides arteriae | 4.1 | Philoxenus medicus | |
| Patella | 8.1 | | 6.19 |
| Pecten | ibidem | Philotimus | 8.20 |
| Pediculi in palpebris o- | | Phlegmone | 1. in pro. |
| culorum | 6.6 | Phrenesis siue phrene- | |
| ad Pedum dolores ma- | | tidis genera plura | |
| lagma | 5.18 | | 3.18 |
| Peripneumonia | 4.7 | Phthisis | 2 c.1. & |
| Pessi compositio | 5.21 | lib. 3. c. 22 | |
| Pessi alia compositio | | Phrygethon | 5.18. & |
| eodem | | | 6.28 |
| Pessi Numenij | eod. | Phrymata | 2.7. & |
| Pestilentia unde fiat | | | 5.18. & 5.28 |
| 1.2 | | Piscium differentie in | |
| in Pestilentia quae sint | | cibis | 2.17 |
| obseruanda | 1.3. | Pituita oculorum quo- | |
| ca 10 | | modo curada sit | 7.7 |
| Petro medicus | 3.3 | Planta | 8.1 |
| Pharmaceutica | 1. pro. | Plistonicus Praxagorae | |
| | | P 4 | discip |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------|------------|-------------------------|------|
| discipulus | 1.in pro. | Pterygion | 6.19 |
| Podagra | li.2.c.6.& | Ptolemæus rex | 5.23 |
| | 4.24 | Ptolemæus chirurgus | |
| Podagræ calidæ cura- | | | 6.7 |
| tio, per malagma | | Pueritia quibus mor- | |
| | 5.18 | bis periclitetur | 2.1 |
| Polypus | 6.8 | Pulmo ubi situs sit, & | |
| Polypus in naribus | | qualis sit | 4.1 |
| | 7.10 | Pulmonis morbus, quæ | |
| Ponderum ratio | 5.17 | pericula portendat | |
| Porrigo | 6.2 | | 2.7 |
| Potionum differentia | | Pulmonis percussæ sig. | |
| | 2.17 | | 5.26 |
| Potiones in febris, | | Purgantia | 5.5 |
| quando & quomo- | | Purgationes reiectæ ab | |
| do dari debeant | 3.6 | Asclepiade | 1.2 |
| Praxagoras | lib. 1. | Purgationes interdum | |
| in proæ. | | necessariæ, interdum | |
| Prandium quid requi- | | inutiles | 1.3 |
| rat | 1.3 | Pustulæ in oculis | 6.6 |
| Protarchus | 5.28 | Pustulariû genera | 5.28 |
| Proptosis | 6.6 | Pus, eiusq; differentia | |
| Prudens medicus quis | | | 5.26 |
| habeatur | 5.26 | Puris significatio | 2.7 |
| Psforici descriptio | 6.6 | Pus coquætia siue ma- | |
| Psydraton | 5.28 | turantia, & mouen- | |
| Psylli, quibus medica- | | tia | 5.3 |
| mentis vtuntur ad- | | Pyloros | 4.1 |
| uersus venena | 5.26 | Pyrites | 5.18 |
| | | Pyth | |

I N D E X.

Pythagoras 1.pro. gna 5.26

Q

Quartana memi- Resolutio stomachi 4.5
nem iugulat Resolutio oculorū 6.6
3.15 Rhagadia 6.18
Rhys 7.7

in Quartana veteri, Rhypodes emplastrum
quid observare profit 5.19

3.15

Quartanae febris cura- Rodentia 5.6
tio ibidem cina 3.9

R

Radix 8.1
Rationalis me- **S**acer ignis 5.28
dicus quis & unde Sanguis ex nari-
dicatur 1.pro. 2.5 bus, quibus saepe fluit

adversus Rabidi canis Sanguinis detractio,
morsum 5.26 quot modis fiat 2.9

Ramex 7.18 Sanguinis natura &
Ramici curatio 7.22 proprietates 4.3

Recidiva quando ti- Sanguinem supprimen-
menda 3.4 tia 5.1

Refrigerantia que 1.3 ad Sanguinem suppri-
Regius morbus, et cur mediū malagma 5.18

ita dictus sit 3.24 Sanguis, atq; eius disse-
Renes, & eorum situs rentia 5.26

4.1 adversus Sanguinis pro-
Renum curatio 4.10 fusionem in vulneri-

Renum percussorum si- bus eodem
ue vulneratorum si- Adversus Sanguisu-

P S gam

INDEX.

| | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|------------|
| gam | ibidem | cap.1 | |
| Sanies, & eius diffe- | | Septi trāsuerſi percuffi | |
| rentia | ibidem | ſigna | 5.26 |
| de Sanitate tuenda li- | | Septicum | 7.21 |
| brum ſcripſit Aſcle- | | Serapion | 1.in proœ. |
| piades | 1.3 | Siccitas quid mali in- | |
| Satietas nimia nunquā | | ferat corporibus | 2.1 |
| utilis | 1.2 | Signa in egrotantibus | |
| Sarcophagus | 4.c.vlt. | bona quæ ſint | 2.2 |
| Sarcocèle | 7.18 | Signa in egrotantibus | |
| Saſagoras | 5.8 | mala quæ ſint | 2.3 |
| Scapula | 8.1 | Signa longæ valetudi- | |
| Scoptula | eodem | nis quæ ſint | 2.4 |
| Scorpio ſibi ipſe me- | | Signa membrorū per- | |
| detur | 5.26 | cufforum | 5.26 |
| aduerſus Scorpionis i- | | Silanus | 3.18 |
| ctum | ibidem | Siligo | 2.7 |
| Scrotum, quod et ſcor- | | Singultus frequēs quid | |
| tum quidam dicere | | indicet | 2.5 |
| malunt | 7.18 | Singultus ſternutamē- | |
| Secundæ quæ ſint | 7.29 | to finitur | 2.7 |
| Secunda menſa | 1.2 | Spaguites venæ | 4.1 |
| Seminis profuſio, & e- | | Spasmos | 2.1 |
| ius curatio | 4.21 | Spina luxata quomo- | |
| Senectus, quibus mor- | | do reſtitui debeat | |
| bis magis obnoxia ſit | 7.14 | | |
| 2.1 | | Sputum quid ſignificet | |
| Septū tranſuerſum li.1. | 2.7 | | |
| in proœ. & lib.4. | | Staphyloma | 7.7 |
| | | Statu | |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------|------|------------------------|--------|
| Statura longa | 2.1 | periculosissima est | |
| Steatomata | 7.6 | 1.3 | |
| Sternutamenta quomo | | Suffusio oculorum | 6.6 |
| do excitanda | 5.22 | Sumpturis cibum post | |
| Stercus animalium | 5. | fatigatione, quæ ob- | |
| 5. & 8.12 | | seruanda | 1.3 |
| Stomachum infirmum | | Suppurationes | 3.27 |
| indicantia | 1.8 | Supprimentia sangui- | |
| Stomacho laborantibus | | nem | 5.1 |
| quæ agēda sint eod. | | Suture in capite quot | |
| Stomachi infirmitas | | sunt | 8.1 |
| quibus signis cogno- | | Sycosis | 6.3 |
| scatur ibidem | | Synanche | 4 4 |
| Stomachus nonnunquā | | T | |
| pro gula accipitur | | Abes | 2.1. & |
| 4.1 | | 4.7 | |
| Stomachi duplex signi | | Tabes, eiusque species | |
| ficatio ibidem | | 3.22 | |
| Stomachi curatio | 4.5 | Tali | 8.1 |
| Stomachi percussi sig. | | Talus luxatus, quomo- | |
| 5.26 | | do restitui debeat | |
| Stomachus studiosorū | | 8.22 | |
| qualis plerūq; sit | 1.2 | Telum latum, quomodo | |
| Stomoma | 6.6 | educendum | 7.5 |
| Stranguria | 2.1 | Telis extrahēdis reme- | |
| Struma | 5.28 | dium eodem | |
| Strophos | 2.6 | Tempora anni consti- | |
| Sudanti ex labore & | | deranda | 1.3 |
| itinere frigida potio | | Tempestates quæ opti- | |
| | | ma, | |

I N D E X.

[illegible]

INDEX.

- Ventriculus ex quibus constet, & eius situs* 4.1
Ventriculi vulnerati signa 5.26
Venarum ora subito suppressa, alioqui sanguinem fundere consueti, quid indicent 2.5
Venere abstinendum quando, & quando non sit 1.3
Venti qui nã salubres, & qui non sint 1.1
Venenis omnibus contrarium quid aduersus Venenosorum animalium ictus eodem 5.26
Ver saluberrimum 2.1
Vere quæ ad victum magis conueniant 1.3
Vere qui morbi fiant 2.1
Vertebræ 8.1
Vesica, & eius situs 4.1
Vesicæ vulneratæ signa 5.26
Vinere elatum Asclepiades funeri obuius intellexit 2.5
Viuorum corpora incidere, crudele & superuacuum esse 1.
proœmio
Vmbilici prominentis curatio 6.17
Vmbilici vitia quomodo curari debeant
Vngues 8.1
Vnctio 1.3
Vomitus quando, & quibus utilis aut inutilis eodem
Vomitus si post cibum fieri debeat, quomodo prouocandus eod.
Urina sana quæ 1.2
Urinæ reddendæ difficultati, quomodo succurratur lib. 7. ca. 26. & lib. 1. ca. 25
Urina parum liquida, in sano homine quid signi

N D E X.

| | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| significet | 2.5 | Vulsella | 7.3. |
| Urina quæ mala | 2.3 | Vulua & eius situs | |
| Ureteres | 4.1 | 4.1 | |
| Uti synanche | 4.4 | Vulue percussæ signa | |
| Uua morbus intra fau- | | 3.26 | |
| ces | 6.14. & 7.12 | Vulue natura mirabi- | |
| Vulnera quomodo glu- | | lis | 7.21 |
| tinanda | 5.26 | | |
| Vulnerum signa eodẽ | | Z | |
| Vulnerum differentie | | | |
| ex ipso morsu eodẽ | | Z Enon | lib.5. |
| Vulnus glutinantia | 5.2 | Z in proæ. | |
| Vulnera aperiencia | 5.4 | Zopyrus | li.5.ca.25 |

F I N I S.

